

Ent GH
w. 100

FLORA PERUVIANA, ET CHILENSIS,
SIVE DESCRIPTIONES, ET ICONES
PLANTARUM PERUVIANARUM,
ET CHILENSIUM,
SECUNDUM SYSTEMA LINNAEANUM DIGESTAE,
CUM CHARACTERIBUS PLURIUM GENERUM
EVULGATORUM REFORMATIS.

AUCTORIBUS
HIPPOLYTO RUIZ, ET JOSEPHO PAVON,
REG. ACAD. MEDIC. MATRIT. SOCIIS.

*Bory de Saint-Vincent
de l'Institut de France.*

TOMUS I.



SUPERIORUM PERMISSU.
TYPIS GABRIELIS DE SANCHA.
ANNO M. DCC. XCVIII.

*Nos CAROLI REGIS, Peruae qui Regna videre,
Naturaeque dedit gazas, haecserta libentes
Augusto capiti peregrinis teximus herbis.*

P R A E F A T I O.

Variis eventibus, rerumque humanarum vicissitudinibus, quae ab anno M. DCC. XCIV, quo in lucem prodiit *PRODROMUS*, Nova Genera Plantarum Peruvianarum et Chilensium complectens, insperatò contigerunt, intermissa fuit Specierum editio. Anno tandem M. DCC. XCVII. studio praesertim et iteratis D. D. Antonii Porcel, hoc negotium eo tempore procurantis, officiis effectum est, ut Exc. D. Eugenius de Llaguno, Indiarum Administer, reliqua Florae volumina continenter evulgare nobis ex Regis decreto injungeret, cujus decreti executionem cunctis praesidiis juvandi et promovendi cura demandata est D. D. Zenoni Alonso, viro humanissimo, et rerum naturalium, omniumque elegantiorum litterarum apprime studioso, cui novos stimulos addit pro suo effuso in scientias, quarum patronus, et aequus judex est, amore Exc. D. Casparus Melchior de Jovellanos, D. Llaguno in Indicarum rerum, aliorumque munerum supremo Ministerio successor.

Cùm itaque in memoratâ jam *Prodromi Praefatione* Botanices inter Hispanos fata, et quaecumque ad Expeditionem nostram spectare quammaxime visa sunt, exposuerimus; ea nunc subjungemus, quae ad Specierum primi voluminis, et eorum, quae hunc excipient, usum magis necessaria existimamus.

Quamquam ibidem indicavimus, Specierum descriptiones MM. CCCC., Icones autem M. DCCC. numerum exaequare; conjicimus tamen, illas MMM., has MM. excedere, accedentibus praesertim plantis, quas Alumnus noster, nobisque suffectus Joannes Tafalla, modo jam Academiae Limensis Botanices Professor, ejusque pictor Franciscus Pulgar in dies è Peruvia mittunt, ubi in Hispaniam discessuri eosdem, Regis jussu, eo consilio reliquimus, ut nova detegerent, jacturam plantarum, quam Navis Alcantarensis naufragio, et Macorae incendio feceramus, sarcirent, et dubiis, de quibus inter opus edendum illos consulere nobis necesse foret, satisfacerent; quibus omnibus functi sunt, plurimas descriptiones, et icones mittentes, quas sensim Operi inseremus, aut opportune non acceptas in Appendicem relegabimus*. Cuncta haec abundestrarum Specierum numerum supplebunt, quas alii Botanici evulgarunt speciminibus siccis usi, quae sodalis noster Cl. Josephus Dombeyus in Galliam detulit; quemadmodum etiam stirpibus per Europae hortos è seminibus propagatis, quae adhuc peregrinantes cùm ille, tum nos ipsi saepius misimus.

Monuimus quoque in *Prodromo*, nihil mirum esse, si ob librorum commercium saeviente bello interceptum, nonnullis ex Operibus botanicis destitueremur, quae post ipsius belli initium edita sunt, in quibusstrarum plantarum aliquas alii Scriptores fortasse evulgaverint. Quamobrem, si quas in hac Flora iteratas Lector offenderit, neque incuriae, neque oscitantiae tributurum speramus; siquidem quantum in nobis fuit, id maxime pro virili studuimus, in id diligentiae nervos

* Vix nobis è Peruviâ digressis Tafalla sibi Joannem Manzanilla, optimae spei Adolescentem, ad peregrinationes et reliquos Botanicarum observationum labores adjungendum, et Josephum Rivera

in pictoris Pulgar locum subrogandum curavit; qui omnes Regis impensis fructuosam in Huayaquil feracissimas regiones expeditionem jam jam suscepturi sunt.

intendimus, ut nullas stirpes jam notas tanquam novas objiceremus, quantumvis eadem à nobis primum detectae fuissent.

Cùm igitur ad plantas determinandas, et cum stirpibus ab aliis auctoribus jam in lucem emissis conferendas, libri botanici, qui ad manus erant, aegrè sufficerent; Reg. Horti Botanici libros et plantas, quae in eo coluntur, consulere, Rege ita jubente, nobis licuit, atque etiam opera botanica, quae in Indiarum intimi Ministerii bibliotheca asservantur.

Liberaliter quoque ex sua collectione nobis commodavit quaecumque petiimus, primarius ejusdem Horti Professor, et utriusque nostrum studiosissimus Botanicus olim praeceptor, Medicus Reg. honorar. Casimirus Ortega, cujus consilio, et amicissimis admonitionibus in rebus dubiis ad Opus perficiendum saepius usi sumus: ad quod humaniter quidem ipse, et alacri animo facilem semper se prae-buit. Aditum quoque ad suam bibliothecam nobis patere ultro declaravit Cl. Botanicus D. Antonius Josephus Cavanilles, ut Scriptores, qui nobis deessent, pro-re natâ evolveremus.

Communi autem Expeditionis pecuniâ nobis comparavimus quaecumque opera Matriti venalia prostrabant, aliaque ab exteris regionibus ad nos transmitti sat-egimus. Porro nullum non movimus lapidem, ne stirpes ab aliis Botanicis jam publici juris factas denuo obtruderemus.

Qui soli Botanici in Peruviae, et Chilensis Regni littoribus varia vegetabilia investigarunt, fuere Josephus Jussieus, P. Fewilleus, et è Societate Jesu Ignatius Molina; sed illorum nemo Andium fertilissimos et spatiosissimos montes pervasit, in quibus nos maximum plantarum nostri Operis numerum decerpimus.

Plumierius autem, Jacquinus, et Aubletius, qui Americen, Martinicam, Dominicensem Insulam et Guyanam illustrarunt, de nonnullis quoque nostrarum Specierum, quas in illis tractibus observaverant, in suis operibus egerunt. Forsterus itidem, Vandellius, L'Heritierius, Jussieus (A. L.), Smith, Cavanilles, Lamarck, Vahl et Ortega aliquas etiam plantas, quas nos hîc sistimus, à se descriptas in suis nuperrimis operibus evulgarunt.

Clarissimi Viri è Societate Jesu, Philippus Ludovicus Gilli et Casparus Xua-rez, qui Prodromum nostrum, doctissimis commentariis à se illustratum, recu-dendum Romae curavit, de variis etiam Peruvianis et Chilensibus plantis ob no-tum usum et vires insignibus in *Observationibus phytologicis* diligentissimè agunt.

Novimus à D. M. Josepho Coelestino Mutis mirabilem prorsus et pene incredi-bilem Iconum et Descriptionum plantarum Collectionem per novum Regnum Granatense comparatam esse, quarum permultae eadem fortasse erunt cum nos-tris Speciebus in Tarma, Huanuco et Panatahuarum montibus collectis.

Verisimilius etiam est, inter copiosa detecta à M. D. Martino Sesseo, Prae-fecto et M. D. Josepho Moziño, ceterisque Expeditionis Mexicanae Botanicis aliquas nostrarum stirpium reperiri. D. Ludovicus Nee plures absdubio posside-bit inter eas, quas per Peruviae et Regni Chilensis littora congessit in itinere, quod post nostrum in Hispaniam reditum circum orbem sub D. Alexandro Ma-laspina, Expeditionis maritimae Praefecto, et D. Antonio Pineda, strenuo, Bota-nico suscepit.

Plures praeterea curiosi peregrinatores nonnullas stirpes Peruvianas et Chilenenses memorarunt : sed quoniam nullam methodum adhibuerunt , vix locum ullum merentur illorum narrationes , descriptionesque apud naturae Mystas.

Quae cùm ita sint ; non dubitamus , pleraque hujus Florae vegetabilia Lectoribus nova adhuc se se proditura , utpote maximam partem in locis asperis montuosisque detecta , ad quae paucissimi Botanici et rerum naturalium Scrutatores , qui Peruviam peragrarunt , nunquam penetravere ; quò etiam faciet illorum Icones , quae ex speciminibus siccis , aut plantis in hortis consitis evulgatae sunt , consultò nos omisisse , si eas excipias , quas mancas et imperfectas esse comperiimus ; tunc enim inter ceteras interposuimus , scriptorum synonyma differentiis specificis adnectentes , quas in locis natalibus adumbraveramus.

Ad Generum classificationem , quemadmodum etiam ad reliquas subdivisiones eundem ordinem , quem Cl. Linnaeus in CLAVIBUS , quas Systematis Vegetabilium Classibus praemisit , mordicus servavimus.

Quotiescumque Gen. Plant. absque Auctoris nomine , aut alio additamento in nomine Generico allegamus ; Linnaei Genera ex editione Schreberianâ anni M. DCC. LXXXIX. allegari intelligendum est : quemadmodum etiam in Specierum mentione Linnaei Species Plantar. per Reichard editas anno M. DCC. XCVIII.

Ceterum , ne tam Generum , quàm Specierum descriptiones longiores justo essent , sed potius simplices et perspicuae ; vocabula turgentia , loquendi circuitus et oratorium stylum vitare conati sumus , ut in Philosophia Botanica immortalis Carolus Linnaeus faciendum praecepit ; *nihil* , inquiens , *oratorio stylo in caractere magis abominabile ; nomen specificum tropis rhetoricis figurari non debere , descriptionesque non nisi artis terminis confici.*

Ne etiam in singulis ejusdem Generis Speciebus iterentur , quod alii fecerunt , notae illis omnibus communes , quae ipsius characterem naturalem constituunt ; hunc Speciebus praemittere studuimus , et tantummodo in his , quarum aliquae fructificationis partes aberrant , aut anomaliis obnoxiae sint , eas iterum expressimus.

In Generibus , quae plurimis Speciebus constant , habitualement Characterem post naturalem adjecimus. In illis autem à Linnaeo , seu ab aliis auctoribus rite descriptis , Characterem genericum naturalem omisimus , et habitualement specificis descriptionibus praecedere fecimus.

Trivialia nomina imposituri Canones prae oculis habuimus , quos Andreas Murray primus statuit , quosque Philosophiae Botanicae Matrili anno M. DCC. XCII. recusae et annotationibus illustratae inseruit praelaudatus D. Ortega : et notas insigniores praetulimus , à plantarum caulibus , foliis , fulcris et inflorescentiâ petitis ; sed cùm Species nimium plures fuerunt , atque adeo hujusmodi praesidia impedita et interclusa experti sumus ; tunc ad alia magis vulgaria , vel etiam ad radices , rarissime tamen , confugimus.

Ad Differentias pariter specificas , seu Characteres Specierum differentiales formandos notis distinctioribus et constantioribus usi sumus , quas ipsae partes exhibebant , ex eisdem partibus , quae ad primae Speciei distinctionem adhibitae fuerant , notas ad omnium reliquarum differentiam assumentes ; in quo quidem à ratione illâ discessimus , quam alii secuti sunt , in his Speciebus scilicet notas caulis et fo-

liorum adhibendi, in aliis vero inflorescentiae et fulcrorum. Postremo in Definitionibus specificis quam minimum fieri potuit, vocabulorum numerum usurpavimus, sufficientem tamen ad distinguendas à se invicem Species; et quamquam longius interdum praeter votum excurrimus, nunquam, neque in Generibus copiosioribus, duodecim vocabulorum terminos à Linnaeo praescriptos praetergressi sumus.

Quamquam in Philosophia Botanica idem Linnaeus admonuerit, in Generibus *Nomen specificum nullum speciei in suo genere solitariae imponi posse, et erronea esse nomina specifica, quae differentias imposuere plantis in suo genere solitariis*; nobis tamen utile admodum consilium ab hac doctrina recedere visum est, et definitionem specificam à principio condere, non tantum, ut inde formetur idea plantae, si aliquis auctor in suo specierum Systemate insereret, sed etiam ad praecavenda frequentissima dubia, quae Botanicis subeunt, quotiescumque ipsam speciem, cui superstructum fuit Genus, aut aliam novam inventoris descriptione destituti offendunt: quin idcirco differentiam deinceps variare non liceat, prout oporteat, quoties aliae ejusdem Generis species innotescant.

Singulis descriptionibus subjunximus regionem, et solum, ubi unaquaeque Species sponte crescit, tempus, quo illam florentem observavimus, nomen vernaculum ab incolis usitatum, vires tum medicas, tum oeconomicas, siquibus praedita sit, et varias denique aberrationum observationes, quas nonnullae plantae, aut earum partes subeunt. Quibus omnibus sperare fas est, nos duplicem botanices scopum attigisse, Specierum scilicet distinctionem, et usum, utilitatumque, quas homines inde percipere possint, cognitionem, quo omnia beneficentissimi Regis consilia in hac Expeditione decernenda collimarunt.

In Opere adeo longo opportunum visum est, Specierum illorum Generum Icones in praesens praetermittere, quorum aliae in Europa Species etiam veniunt; eas Appendicis loco cum Graminibus seorsim evulgaturi post praecipui Operis editionem, quod rariora tantum, et pretiosiora vegetabilia, arbores scilicet ut plurimum, frutices et suffrutices continebit.

Ut plurimum verò ex DCCC figuris jacturam in Navi Alcantarensi factam, earum scilicet, quas Expeditionis Peruviana Alumni supplendi occasionem nondum nacti sunt, suppleremus; speciminibus siccis, quae in nostris collectionibus possidemus, et nonnullis, quae Cl. Dombėjus redux in Hispania reliquit, uti coacti sumus: verum quoniam autographae descriptiones penes nos erant, et figurae ipsae à dexterrimo pictore D. Isidoro Galvez, qui earum permultas in America è plantis vivis, nobis hîc, ut illic accurantibus, quam maximâ fieri potuit diligentia delineatae sunt; eâdem ferme concinnitate et venustate, ac si è vivis plantis expressae fuissent, apparituras confidimus.

In hoc primo volumine praeter tria nova Genera suo loco inserta, Descriptiones CCLXXVII. Specierum complectimur et Icones CVI cum CCXIX plantarum figuris, ad quatuor priores Linnaei Classes spectantium, à variis sculptoribus summa dexteritate et nitore aeri incisis, in quarum plerisque picturas autographas adhibuerunt à D. D. Josepho Brunete, Isidoro Galvez, et Francisco Pulgar in Peruvia delineatas, quas aliquibus ramis et foliis rescissis, seu suppressis Ma-

triti ad majorem simplicitatem redegimus , ut unaquaeque Icon duas aut tres plantas caperet , atque adeo Opus minus voluminosum minori etiam pretio comparari posset. Nonnullae quidem Icones plantam unicam exhibent : tres sunt , quarum singulae quatuor continent , neque tamen ullius magnitudinem naturalem minuimus , si Generis *Sancheziae* species duae excipiantur. Cui labori incumbunt praefatus D. Isidorus Galvez , et D. Josephus Rubio , ipsi adjunctus.

In fructificationum partibus seorsim exhibitis magnitudinem naturalem retinuimus , ut in reliquis plantarum partibus , ni illarum exiguitate eandem ad distinctiorem demonstrationem augere coacti fuerimus : quod quidem suo loco in Iconum Explicationibus annotavimus.

In Speciebus , quarum fructificationes in plantae figurâ satis perspicuè repraesentatae sunt , earum partes seorsim ostendere negleximus , et tantummodo exhibemus unam alteramve ad Generis distinctionem necessariam , exceptis tamen Speciebus Generum nimis numerosorum , quarum habitus ad distinguendum Genus sufficere potest , ut in *Salviis* , *Calceolariis* , *Piperibus* , et *Peperomiis*.

Iconum Sculptorum laboribus una nobiscum praefuit Pictor noster , D. Isidorus Galvez , utpote artis apprime peritus , quemadmodum ex quatuor hujus voluminis iconibus , ejus manu incisis , atque ex aliis in sequentibus voluminibus prodituris satis superque patebit.

In variis Classium Iconibus eundem ordinem ac in descriptionibus servare neutiquam potuimus , quoniam figurarum major aut minor magnitudo ad magnas cum exiguis aut mediocribus apte conjungendas nos coëgit ; sed cum descriptiones primum , deinde icones omnes continenti serie collocatae sint ; id nullum Lectori negotium facesset , qui in singulis descriptionibus iconis numerum , in iconibus plantae nomen , cui descriptio respondet , inveniet.

Quamvis novorum Generum Specierum descriptiones jam notorum Generum Specierum descriptionibus in secundo et sequentibus voluminibus praemittere , ut in Prodromo innuimus , statueramus ; magis è re visum est , eas suis locis inserere. Non secus à proposito recessimus plantarum americanarum , etsi jam cognitos , de novo tamen ex autopsia reformatos characteres genericos edendi ; quapropter eos suis quoque locis in hoc Opere interponere decrevimus proxime ante Specierum descriptiones , deinceps nihilominus seorsim edituri , ut Characterum acquisitio facilius his evadat , quibus in universum Opus sumptum impendere non liceat.

Interea prout volumina prodibunt , Compendium , seu Vegetabilium , quae in illis continebuntur , Systema in fasciculis separatim evulgabimus , in primo quidem omnium Specierum novorum Generum , simulque quatuordecim jam notorum , et in Prodromo comprehensorum differentias specificas praemittentes. Initium autem capiemus à singulorum characteribus differentialibus , quibus accedent eorundem Specierum differentiae , uniuscujusque absolutissima historia , et indicatio usuum praesertim et virium , quas ex Indorum , Medicae artis professorum , aliorumque peritorum et curiosorum hominum ore , aut nostris observationibus , et quibus interfuerimus , experimentis didicimus , et aliquas demum annotationes , prout opus fuerit , addemus.

Cunctas novorum Generum Species Generum notorum novae consequentur ,

eodem servato ordine ac in praecedentibus, suppresso tamen Characterе differentiali, qui in Linnaei et aliorum operibus invenitur; sed singulas novorum Generum, quae adhuc edenda, et quo pertinebunt, collocanda supersunt, Character differentialis praecedet.

Ad faciliorem hujus Operis Lectorum usum, adjungemus non modo Generum et Specierum Indicem Botanicum, sed etiam nominum vernaculorum Elenchum, illarum quidem plantarum, quae nomine sive ab Indis, sive ab Hispanis imposito praeditae sint. Posthaec Auctorum, quibus ad plantas comparandas determinandasque usi sumus, Catalogus adjicietur.

Postremo ne Operis voluminum numerus nimis excresceret, latino tantum sermone illa evulgare aequum existimavimus, quamvis Prodrumum edentibus utraque linguâ prodere, ut in ipso Prodrumo fecimus, animus erat.



C L A S S I S I.

MONANDRIA MONOGYNIA.

CANNA. LINN. *Gen. pl. p. 2.*CANNA PANICULATA. Icon. I. *Fig. a.*

1. C. foliis ovatis subtus lanatis argenteis, petalis interioribus brevioribus.

RADIX ramosa, fasciculata, fibrillosa.

CULMI plures, teretes, erecti, biorgyales.

FOLIA alterna, petiolata, ovata, lineata, nervosa, subtus lanata, argentea.

PETIOLI semivaginantes.

PANICULA terminalis, patens.

BRACTEAE lanceolatae, concavae, marcescentes.

PETALA sex, coccinea: *tria exteriora* majora, aequalia; *interiora* inaequalia.

CAPSULA obovato-oblonga, echinata, magna.

SEMINA subglobosa, nigricantia, nitidiuscula.

HABITAT in *Peruviae* hortis et silvis ad vicum *Chinchao*.

FLORET à Majo ad Augustum.

VERNACULE *Achira cimarrona*, id est, *Achira silvestrem* nuncupant.

USUS: RADICES edules sunt, sed ferè insipidae.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx supra germen. 3. Corolla, Nectarium et Stamen. 4 Nectarium cum Stamine. 5 Capsula transversim secta. 6 Semina.

CANNA INDICA.

2. C. foliis ovato-oblongis, laciniis corollae subaequalibus.

CANNA (*indica*) foliis ovatis utrinque acuminatis nervosis. LINN. *Sp. pl. p. 2.*

RADIX tuberosa, oblonga rotundaque, oculata.

CULMI plures, erecti, teretes, geniculati.

FOLIA alterna, petiolata, ovata oblongaque, utrinque attenuata, glabra, nitidiuscula, lineis parallelis inflexis striata: *tenera* convoluta.

PETIOLI convoluti.

RACEMUS terminalis, simplex.

BRACTEAE spathaeformes; *superiores* ovatae; *inferiores* longissimae, lanceolatae.

CALYX lutescens, rubescensque.

COROLLA coccinea: *laciniis exterioribus* subaequalibus.

CAPSULAE scabro-echinatae, trigonae, trisulcae.

SEMINA globosa, nigra, nitida.

COLITUR in *Peruvia*.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Achira* nominatur.

USUS. Peruviani plantae radices diversimodè conditas edunt.

Tom. I.

CANNA IRIDIFLORA.

3. C. foliis ovatis acuminatis, laciniis tribus corollae interioribus majoribus.

RADIX fasciculata, fibrillosa.

CULMI plures, triunares, erecti, teretes, articulati.

FOLIA alterna, petiolata, ovata, acuminata, acumine subspirali, nervosa, lineata, supra nitida, glabra, subtus lanata, albicantia.

PETIOLI à geniculo ad geniculum culmum involventes, margine superiori plicati.

RACEMI gemini, bipartiti.

PEDUNCULI compressi.

PEDICELLI curvati, uniflori, nutantes; *bracteolâ* spathaceâ, ovatâ, minimâ suffulti: ad basim singuli pedicelli *filum* unicum, aliquando duo, subulato-lineare, saepe bipartitum.

BRACTEAE spathaceae, lanceolatae, convolutae.

CALYX triphyllus, persistens.

COROLLA infundibuliformis; *Tubus* calyce triplò longior.*Limbus* sexpartitus; *laciniis tribus exterioribus* brevioribus, lanceolatis, convolutis, erectis, aequalibus, purpurascens: *interioribus tribus* oblongis, majoribus, latioribus, patentibus, rubris.NECTARIUM petaloideum, bipartitum, figurâ et longitudine petalorum interiorum, basi variegatum: *laciniâ*, cui *Anthera* insidet, lanceolatâ, revolutâ; *alterâ* longiore, bifidâ, reflexâ.

STYLUS linguaeformis, basi variegatus.

CAPSULA oblonga, trigona, maxima, muricata.

SEMINA globosa, fusca.

HABITAT in *Peruvia* ad vicum *Pillao*, ubi colitur.

FLORET à Majo ad Octobrem.

VERNACULE *Sumac-Achira*, id est, *Ach. formosam*.

USUS: Ad hortorum ornatum.

AMOMUM. LINN. *Gen. pl. p. 3.*

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* tubulosum, tridentatum: *denticulis* ovatis, erectis; superum, persistens.COR. infundibuliformis. *Tubus* calyce longior. *Limbus* tripartitus: *laciniis* ovatis, aequalibus, patentiusculis.*Nectarium* fauci corollae insertum, bilabiatum: *labium inferius* corollae longitudine, trifidum; *laciniis* subrotundis: *labium superius* corollâ brevius, antheram gerens, integrum, angustius.STAM. *Filamenti vices* gerit labium superius nectarii, cui *Anthera* oblonga, bipartita adnata.

A

PIST. *Germen* inferum, obovatum, trigonum. *Stylus* filiformis, altitudine antherae, quâ semicinctus. *Stigma* capitatum, emarginatum.

PERIC. *Capsula* obovata, trigona, trilocularis, trivalvis, coriacea, calyce coronata, angulis infernè dehiscens.

SEM. plura, trigona, pulpâ filamentosâ involuta.

AMOMUM RACEMOSUM. ICON. I. Fig. b.

1. A. Scapo spathis oblongis tecto, racemo composito oblongo.

RADIX ramosa, fasciculata, fibrillosa, tuberculata, oculata, odore saporeque grato.

CULMI plures, simplices, teretes, geniculati, erecti, biulnares.

FOLIA alterna, petiolata, oblonga, glabra, lineata, nervosa, erecto-patentia, 1-3pedalia, latitudine bipalmari.

PETIOLI convoluti.

SCAPI plures, teretes, striati, erecti, pedales; spathis oblongis, acutis, convolutis, nervosis vestiti.

RACEMUS compositus, oblongus.

PEDUNCULI sparsi, 2-4flori, spathis ovatis, concavis, marcescentibus suffulti.

PEDICELLI ad basim stipati spathâ tubulosâ, profundè bifidâ, marcescente; laciniis ovatis.

CALYX ruber.

COROLLA et *Nectarium* luteum.

CAPSULA nigra, leviter striata.

SEMINA grisea, fragrantia, acria, oleosa.

HABITAT copiosè in *Peruviae* silvis ad vicos *Cuchero*, *Chinchao*, *Muña* et *Pillao* locis umbrosis.

FLORET Aprili et Majo.

VERNACULE *Achira de monte*.

Explic. Icon. 1 Flos spathâ et bractea subjectis. 2 Capsula calyce coronata. 3 Eadem cum calyce dehiscens. 4 Semina.

AMOMUM THYRSOIDEUM. ICON. II.

2. A. Scapo spathis oblongo-ovatis vestito, spica conico-thyrsoidea.

RADIX tuberosa, fasciculata, paleaceo-albicans, variè intorta, fibrillis plurimis adspersa.

CULMI plures, teretes, erecti, striati, geniculati, aliquantum declinati, triulnares.

FOLIA alterna, oblonga, acuminata, acumine subspirali; glabra, lineata, nervosa, pedalia; *inferiora* gradatim minora.

PETIOLI convoluti.

SCAPI plures, teretes, erecti, striati, semipedales; spathis convolutis, oblongo-ovatis, striatis, rubris undique tecti.

FLORES in spicam conico-thyrsoideam digesti; spathis ovatis concavis, puniceis distincti.

CALYX incarnatus, ad basim spathâ tubulosâ, bifidâ, rubrâ; laciniis ovatis.

COROLLA lutea.

NECTARIUM luteum: *laciniis* subrotundis, intermediâ bifidâ, ad basim denticulo utrinque adnato.

GERMEN oblongum.

CAPSULA oblonga, magna, rubra, postremò purpureo-nigra.

SEMINA grisea, aromatica, acria.

HABITAT copiosè in *Peruviae* silvis ad vicos *Cuchero*, *Chinchao* et *Pozuzo* locis umbrosis humidisque.

FLORET Aprili, Majo et Junio.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla cum Nectario. 3 Nectarium. 4 Pistillum. 5 Capsula. 6 Semina.

COSTUS. LINN. *Gen. pl. p. 3.*

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* tubulosum, parvum, trifidum: *laciniis* ovatis; superum, persistens.

COR. *Petala* tria, oblongo-lanceolata, obtusa, concava, aequalia; *supremum* latius.

Nectarium monophyllum, magnum, tubulosum, curvatum, ventricosum, bilabiatum. *Labium inferius* latius, carinatum, trifidum: *laciniis* subrotundis, reflexis, intermediâ trifidâ. *Labium superius* oblongo-lanceolatum.

STAM. *Filamenti vices* gerit Nectarii superius labium, cui *Anthera* oblonga, bipartita adnata.

PIST. *Germen* inferum, obovatum, trigonum. *Stylus* filiformis, longitudine antherae. *Stigma* compressum, subinfundibuliforme, squamulâ obovatâ, ad basim emarginatâ.

PERIC. *Capsula* obovata, triquetra, carnosa, calyce coronata, trilocularis, trivalvis.

SEM. plura, trigona, pulpâ filamentosâ involuta, nitida.

Obs. Nectarium in diversis aliquantulum variat.

HABITUS.

Radix fasciculata, tuberosa. *Culmi* plures, erecti, articulati. *Folia* sparsa, lineata, nervosa. *Petoli* vaginantes. *Flores* terminales, densè spicati, bracteis obvallati.

COSTUS SCABER. ICON. III.

1. C. floribus in thyrso conico, bracteis ovatis adpressis, corollis semiclausis.

RADIX tuberosa, fasciculata, fibrillosissima: tuberculis longis, geniculatis, tortuosis.

CULMI plures, teretes, erecti, pubescentes, articulati, retrorsum scabri, biulnares.

FOLIA sparsa, lineata, nervosa, subpedalia, integerrima, undulata, acuminata; supra glabra, nitidiuscula; subtus mitissima, pubescentia: *intermedia* oblongo-obovata, reliquis latiora, patentia: *superiora* sublanceolata, dependentia; *inferiora* deflexa; *infima* subrotundo-ovalia.

PETIOLI vaginantes, pubescentes.

VAGINAE post foliorum delapsam scabrae, ore purpurascens.

FLORES in thyrsam conicum, brevem, rubicundum, termi-

nalem; plurimis *bracteis* imbricatis, unifloris, ovatis, latis, integerrimis, puniceis, nitidis, leviter pubescentibus, apice deflexis compositum. *Bractea altera* minor sub singulo flore, concavo-carinata, calyce brevior, rubro-punicea.

CALYCES rubri.

COROLLA lutea: *Petala* oblonga, pellucida, calyce quadruplò longiora.

NECTARIUM subringens, petalorum ferè longitudine, infernè tubulosum: *Labium inferius* superiori triplò latius, trifidum; *laciniâ* mediâ tripartitâ; *laciniis* omnibus ovatis, subreflexis: *Lab. superius* lanceolatum, concavo-carinatum, erectum, integerrimum, labio inferiori semiamplexatum.

STIGMA compressum, subinfundibuliforme, ore pubescens, ad basim squamulâ furcatâ munitum.

CAPSULA alba, carnosa.

SEMINA nigra, *pulpâ* albicanti involuta, nitida.

HABITAT copiosè in silvis ad *Peruviae* vicos *Pillao*, *Chinchao*, *Cuchero*, et *Pozuzo*.

FLORET Septembri et Octobri; Majo etiam et Junio floridam in *Cuchero* et *Macora* vidimus.

Explic. Icon. 1 Bractea exterior. 2 interior. 3 Capsula calyce coronata. 4 Eadem dehiscens. 5 Semina.

COSTUS LAEVIS.

2. C. floribus in thyrso conico, bracteis lanceolatis apice incurvis, corollis patentibus.

RADIX tuberosa, fasciculata; fibrillis plurimis longis; tuberculis oblongis, geniculatis, oculatis, intortis.

CULMI plures, teretes, erecti, glabri, laeves, biorgyales.

FOLIA sparsa, lanceolata, acuta, lineata, nervosa, integerrima, subundulata, utrinque glabra, ferè pedalia: *inferiora* gradatim minora, oblongiuscula, deflexa: *intermedia* patentia: *superiora* erecta, breviora.

PETIOLI vaginantes, glabri, laeves, ore purpurei.

FLORES in thyrsum conicum, obovatum, acuminatum, *bracteis* imbricatis, unifloris compositum. *Bracteae* lanceolatae, infernè rubrae, supernè virides, incurvae, apice strictae. *Bractea altera* sub singulo flore, carinata, rubra, calyce brevior.

CALYX ruber.

COROLLA: *Petala* tria, basi nectarii adnata, lanceolata, concava, calyce sextuplò longiora, erecta, nectario paulò breviora, nitida, luteo-carnea: *superius* reliquis duplò latius.

NECTARIUM maximum, ventricosum, subringens, bilabiatum, in centro rubrum, lineis carneo-lutescentibus striatum: *Labium inferius* magnum, concavo-carinatum, trifidum; *laciniis* subrotundis, *intermediâ* trifidâ: *Labium superius* oblongum, supernè angustatum, integerrimum.

STIGMA compressum, subinfundibuliforme, bilobum, infernè squamulâ obovatâ, subtriangulari, emarginatâ.

CAPSULA obovato-oblonga, triquetra, carnosa.

SEMINA trigona, *pulpâ* filamentosâ subinvoluta, nitida, nigra.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad vicum *Pillao* juxta *Chacahuassi* locis umbrosis humidisque.

FLORET Septembri, et Octobri.

COSTUS ARGENTUS. ICON. IV.

3. C. floribus in thyrso oblongo, bracteis dependentibus, corollis patentibus.

RADIX fasciculata, fibrosa: *fibris* longissimis.

CULMI plures, teretes, erecti, articulati, biorgyales, nonnunquam è basi thyrsi ramulos breves emittentes.

FOLIA sparsa, oblongo-obovata, acuminata, basi angustata, integerrima, laevia, supra glabra, subtus argentea, pubescentia, nitidiuscula, carinata, dependentia.

PETIOLI vaginantes, culmos vestientes.

FLORES in thyrsum terminalem, tripalmarem, oblongum, supernè attenuatum, plurimis *bracteis* imbricatis compositum; intra bracteas tres flos unicus.

BRACTEAE exteriores majores, oblongae, acutae, è medio ad apicem reflexae, virides, infernè concavae, lutescentes; interiores duae lanceolatae, carinatae, luteae.

SPATHA tubulosa, anceps, bifida sub singulo germine.

CALYX luteo-viridis.

COROLLA lutescens. *Petala* lanceolata, obtusa, per tubum nectarii decurrentia.

NECTARIUM magnum, tubulosum, curvatum, bilabiatum: *Labium inferius* latum, carinatum, trifidum; *laciniis* plicato-fimbriatis; *mediâ* ovatâ; *lateralibus* subrotundis deflexis: *Labium superius* subpanduraeforme, basi angustatum, apice plicato-fimbriatum, longitudine petalorum, eis angustius, lutescens, villosum.

SEMINA plura, trigona, in *pulpâ* filamentosâ albâ nidulantia, nigra, nitida.

HABITAT copiosè in *Peruviae* nemoribus ad vicos *Chinchao* et *Cuchero* locis umbrosis et humidis.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

VERNACULE *Purum-piña*, id est *Falsam Pineam*.

Explic. Icon. 1 Capsula hians. 2 Semina.

MARANTA. LINN. Gen. pl. p. 4.

MARANTA CAPITATA. ICON. V.

1. M. culmo simplici apice florifero, capitulo globoso depresso.

RADIX ramosa, fibrosa.

CULMUS simplex, teres, erectus, nudus, longitudine foliorum, in summitate florifer, purpurascens.

FOLIA radicalia, longè petiolata, ovato-oblonga sublanceolataque, acuminata, integerrima, glabra, basi inaequalia, lineis parallelis, incurvis notata.

PETIOLI teretes, ultra medium curvati.

FLORES in capitulum globosum, depressum collecti, nutan-

tes; *bracteis* ovato-lanceolatis, acutis, integerrimis, persistentibus, viridi-luteis, longitudine ferè florum, distincti.

CALYX: *Perianthium* triphyllum; *foliolis* lanceolatis, concavis; persistens, superum, albicans.

COROLLA monopetala, infundibuliformis, ringens: *Tubus* subcylindricus, inflexus, basi incrassatus. *Limbus* sexfidus: *laciniis* tribus exterioribus ovatis, aequalibus, paulò brevioribus, albidis: *tribus interioribus* luteo-fulvis, vices nectarii gerentibus, quarum *laterales duae* ellipticae integrae: *suprema* emarginata.

STAMINA: *Filamentum* membranaceum, angustum, laciniae corollae simile. *Anthera* lineari-oblonga.

PISTILLUM: *Germen* obovatum, trigonum, inferum. *Stylus* simplex, longitudine corollae. *Stigma* obsoletè trigonum.

PERICARPIUM: *Capsula* obovata, trigona, trisulca, trilocularis, trivalvis.

SEMINA solitaria, ovata, rugosa, dura.

Obs. Laciniae interiores corollae, *Nectarium* propriè repraesentant, saepius lutescentes, rarius fulvae; exteriores albo-luteae.

HABITAT in umbrosis et humidis ad *Cuchero* et *Pozuzo* vicos.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Achira de monte*, id est, *Achira montana*.

Explic. Icon. 1 Flos inversus. 2 Idem calyce destitutus. 3 Nectarium cum stamine et pistillo. 4 Capsula cum calyce. 5 Eadem per medium secta. 6 Semina.

MARANTA LATERALIS.

2. M. culmo simplici ad medium florifero, capitulo globoso.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Cuchero* vicum locis humidis et umbrosis.

FLORET Julio, et Augusto.

BOERHAAVIA. LINN. Gen. pl. p. 7.

BOERHAAVIA SCANDENS.

1. B. caule scandente, foliis cordatis, floribus umbellatis triandris, pedicellis longis apice incurvis.

BOERHAAVIA (*scandens*) caule erecto, floribus diandris, foliis cordatis acutis. LINN. *Sp. pl.* p. 7. JACQ. *Hort. Vindob. t. 1. pag. 2. tab. 4.*

PLANTA fruticosa, glaberrima, glauca.

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULIS biorgyalis, scandens, fragilis, subdivisus, (id est in dichotomias alternas, inaequales absque ordine), teres, nodosus, saepe violaceus, articulationibus praesertim leviter striatus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, petiolata, cordata, obtusa acutaeque cum brevi acumine, integerrima, venosa, basi parum inaequalia, carnosa, deflexa, obsoletè ciliata.

PETIOLI canaliculati.

PEDUNCULI axillares terminalesque, longi, filiformes, 5-6-7 flori.

FLORES umbellati, involucrati.

INVOLUCRUM *foliolis* 4. 5. 6. ovato-lanceolatis, caducis.

PEDICELLI in fructu apice incurvi, nonnulli 2-3 flori; intermedius aliquando 4 florus.

COROLLA violacea, infundibuliformis. *Tubus* curvatus, tenuis, basi ventricosus, obovatus, crassus, crescens, ultra coarctatus, persistens. *Limbus* 5 fidus, erecto-patens, plicatus: *laciniis* emarginatis.

NECTARIUM cyathiforme, membranaceum, germen ambiens, parvum, marcescens, persistens.

STAMINA: *Filamenta* tria, filiformia, ori nectarii insidentia, infernè tenuissima, coarctationi tubi adglutinata, corollâ longiora, aequalia, declinata. *Antherae* assurgentes, subrotundae, didymae.

PISTILLUM: *Germen* obovatum. *Stylus* filiformis, longitudine et situ staminum. *Stigma* globosum, papillis exasperatum.

PERICARPIUM è basi corollae formatum, clavatum, glandulosum, decem-striatum, induratum, nigrescens.

SEMEN unicum, clavatum.

Observatio. Corolla ad coarctationem marcescens, basis persistens: aliquando 6-fida, tetrandra.

HABITAT in *Peruviae* sepibus et arvis ad *Huanuci*, *Limae* et *Chancay* Provincias.

FLORET per totum ferè annum.

Vulgo *Yerba de la Purgacion*.

VIRES ET USUS. Peruviani decocto et infusione in gonorrhoea frequenter utuntur.

Obs. 1. Hoc Genus differt à *Calyxhymeniae* Genere absentiae calycis; reliquis autem notis genericis et habitu ambo Genera conveniunt.

Obs. 2. *Boerhaaviae* Genus potiùs ad tertiam Classem systematis Linnaei prope *Valerianae* Genus, quàm ad Monandriam pertinet.

BOERHAAVIA HIRSUTA.

2. B. caule procumbente diffuso, foliis ovato-cordatis undulatis repandis, floribus triandris.

BOERHAAVIA (*hirsuta*) caule laevi diffuso pubescente, foliis ovatis repandis. LINN. *Sp. pl.* p. 7. JACQ. *Hort. Vindob. V. 1. pag. 3. tab. 7.*

PLANTA hirsuta, viscosa.

RADIX ramosa, fibrosa, albicans.

CAULIS herbaceus, infernè ramosus, prostratus, diffusus, fragilis, geniculatus, teres, laeviter striatus.

RAMI consimiles, subdivisi (id est alternatim dichotomi.)

FOLIA opposita, petiolata, ovato-cordata, acuta obtusaeque cum brevi acumine, repanda, undulato-plicata, venosa, basi inaequalia, parum obliqua, altero minori.

PEDUNCULI axillares terminalesque, subdichotomatim divisi, filiformes, multiflori; bracteolis subulatis suffulti.

FLORES umbellati, parvi, subsessiles, involucrati, totidem foliolis subulatis, deciduis.

COROLLA purpurea, minima. *Tubus* vix ullus. *Limbus* subquinquefidus, plicato-patens.

STAMINA tria.

SEMEN obovatum, pentagonum, scabrum, fuscum.

HABITAT in *Peruviae* arenosis, arvis, ruderatis et cultis ad *Huanuci*, *Limae* et *Chancay* Provincias.

FLORET per totum ferè annum.

VULGO *Pegajosa*.

ACOSTA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 1. Icon. I.*

ACOSTA ACULEATA. *Icon. VI. Fig. a.*

1. A. ramis sarmentosis aculeatis, foliis oblongis, spicis congestis.

FRUTEX ramosissimus.

CAULIS teres, infernè ramosus.

RAMI teneri longissimi, scandentes, teretes, aculeati.

ACULEI recurvi, fragiles.

FOLIA alterna, petiolata, pleraque oblonga, acuminata, repanda, integerrima, glabra, nitida, coriacea.

PEDUNCULI axillares, breves, spicati, congesti.

FLORES conferti, sessiles; bracteolis subulatis suffulti.

COROLLA alba.

FRUCTUS luteus, magnitudine *Pyri Mali*.

SEMINA fulva.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* vicum, et *Machaynio* et *Macora* praedia.

FLORET Augusto.

Incolae ob similitudinem fructuum cum *Achras Caimito* fructibus *Caimito de monte* nuncupant, eosque avidè utpote grati saporis edunt.

Explic. *Icon.* 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem tubo calycis per medium secti inserta. 5 Pars calycis inferior scissa cum Stylo et tubo Corollae naturaliter ab apice ad

basim fisso, terminato nectario et antherâ octo-undulatâ.

6 Nectarium cum antherâ anticè visum. 7 Pistillum.

8 Pomum per medium sectum. 9 Semen.

DIGYNIA.

JARAVA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 2. Ic. I.*

JARAVA ICHU. *Icon. VI. Fig. b.*

1. J. foliis involutis subulatis, spica paniculata.

PLANTA caespitosa.

RADIX fibrosissima, albicans.

CULMI plurimi, erecti, bipedales, teretes, geniculis purpurascentibus.

FOLIA involuta, subulata, retrorsum scabra, leviter striata.

SPICA longissima, composita spicis oblongo-cylindricis, in flore adpressis, in fructu patulis.

FLOSCULI breviter pedunculati.

SEMINA fulvescentia.

HABITAT in alpibus (vernaculè *Punas de los Andes*) *Cantae*, *Huaro-chiri*, *Xauxae*, *Huancavelicae*, *Tarmae*, *Huanuci*, *Huamalies* et aliarum Provinciarum Regni Peruviani.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Ichu* et *Oessa* nuncupatur.

VIRES ET USUS: In *Huancavelicae* fodinis hujus graminis frequens usus est ad argenti vivi extractionem, et ex eo Indi storeas, aliaque texunt, domuumque et tuguriorum culmina tegunt. Tenera herba in pabulum valdè nutriens venit bobus. Nos, ut ceteri viatores saepius eam adhibuimus ad ciborum coctionem, et taedarum loco ad lumina artificialia, per frigidissima et deserta loca peregrinantes.

Explic. *Icon.* 1 Flos. 2 Calyx. 3 Flos à calyce liber. 4 Corolla. 5 Stamen. 6 Pistillum. 7 Corolla semen involvens. 8 Semen, (omnia haec aucta.)

CLASSIS II.

DIANDRIA MONOGYNIA.

JASMINUM. LINN. *Gen. pl.* p. 12.

JASMINUM LANCEOLATUM. ICON. VII. Fig. a.

1. J. foliis oppositis lanceolatis.

PLANTA suffruticosa.

RADIX fasciculata, fibrillosa, albicans.

CAULIS subbipedalis, erectus, teres, simplex.

FOLIA opposita, subsessilia, lanceolata, utrinque attenuata, integerrima, patentia, apice reflexa.

PEDUNCULI axillares terminalesque, breves, uniflori.

CALYX quinquefidus; *laciniis* subulatis.

COROLLA calyce multò longior, alba, subpurpurascens.

Tubus tenuis, supernè sensim ampliatus. *Limbus* quinquepartitus; *laciniis* oblongo-obovatis, patentibus.

STAMINA duo: *Antherae* intra tubum.

Observ. *Pericarpium* maturum non offendimus; *Germen* adultum tantum observavimus.

HABITAT in silvis Pozuzo locis umbrosis.

FLORET Septembri.

JASMINUM GRANDIFLORUM.

2. J. foliis oppositis pinnatis: foliolis extimis confluentibus.

LINN. *Sp. pl.* p. 15.

COLITUR in Hortis Peruvianis.

FLORET per totum ferè annum.

VULGO Jazmin.

USUS. Foeminae floribus inapertis ad capitis ornatum et cultum vespere utuntur, et cum Flores noctu explicantur, gratissimum odorem spirant. In *mixtura* cum aliis floribus Jasmini flores adhibent.

VERONICA. LINN. *Gen. pl.* p. 15.

VERONICA SERPILLIFOLIA.

1. V. racemo terminali subspicato, foliis inferioribus oppositis subrotundis crenatis trinerviis: superioribus alternis ovatis.

VERONICA racemo terminali subspicato, foliis ovatis glabris crenatis. LINN. *Sp. pl.* p. 29.

PLANTA herbacea.

RADIX fibrosa.

CAULES plurimi, diffusi, filiformes, repentes, divisi, teretes, purpurascens, supernè pubescentes.

FOLIA *inferiora* opposita, breviter petiolata, patentia, subrotunda, trinervia et quinquenervia, crenata: *superiora* alterna, sessilia, ovata, integerrima, leviter ciliata.

FLORES terminales, racemoso-spicati, singulus è singula axilla, solitarius, pedunculatus.

PEDICELLI longitudine ferè foliorum, filiformes.

COROLLA violacea: *laciniâ* minori albâ; tribus reliquis violaceo-caeruleis, lineatis.

SEMINA obovato-oblonga, fulva, hinc convexa, inde concavo-umbilicata.

HABITAT in ruderatis, versuris et humidis locis frigidis Pillao.

FLORET à Junio ad Septembrem.

VERONICA BECCABUNGA.

2. V. racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. LINN. *Sp. pl.* p. 30.

HABITAT in humidis et scaturiginibus Limae et Huanuci.

FLORET per totum ferè annum.

VERONICA ROTUNDIFOLIA.

3. V. floribus solitariis, foliis orbiculato-reniformibus crenatis, caule filiformi repente.

PLANTA herbacea, hirsuta.

RADIX fibrosa.

CAULIS filiformis, tenuis, ramosus, teres, purpureus, repens, articulationibus radicans.

FOLIA duo, tria, saepè unicum è singulo geniculo, longè petiolata, subpeltata, orbiculato-reniformia, profundè crenata, utrinque hirsuta.

PEDUNCULI axillares, solitarii, petiolis duplò breviores, uniflori.

CALYX: *Perianthium* campanulatum, quadripartitum: *laciniis* lanceolatis acutis; persistens.

COROLLA roseo-purpurea, rotata: *Tubus* longitudine ferè calycis: *Limbus* quadripartitus, planus: *laciniis* ovatis; *lateralibus* minoribus; *infimâ* angustiore, huic oppositâ latiore.

STAMINA: *Filamenta* tria, subulata, incurva, longitudine corollae. *Antherae* oblongae.

PISTILLUM: *Germen* obcordatum, compressiusculum, villosum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum, saepius persistens. *Stigma* truncatum, simplex.

PERICARPIUM: *Capsula* obcordata, apice magis compressa, bilocularis, bivalvis; *Dissepimento* contrario.

SEMINA plurima, oblonga, parva, hinc convexa, inde concava.

Obs. Flores nonnullos quinquefidus, staminibus quatuor saepè offendimus: in corollis quadrifidis stamina tria semper adsunt.

HABITAT copiosè in *Peruviae* uliginosis ad *Pillao* vicum.
FLORET Junio, Julio, et Augusto.

VERONICA PEREGRINA.

4. *V.* floribus solitariis, foliis lineari-lanceolatis integerrimis; inferioribus subserratis, caule erecto folioso et florifero.
VERONICA floribus solitariis sessilibus, foliis lanceolato-linearibus, glabris, obtusis, integerrimis, caule erecto.
LINN. *Sp. pl.* p. 38.

VERONICA terrestris annua, folio polygoni, flore albo. MORIS. *hist.* 2. p. 322. *sec.* 3. *tab.* 34. *fig.* 19.

PLANTA annua.

RADIX fibrosa.

CAULES plures, rarius solitarii, erecti, 1-4 palmares, teretes, purpurascens, undique foliis floribusque onusti, dum procumbunt radicanter.

FOLIA confertissima, sessilia, deflexa, lineari-lanceolata, integerrima, glabra, avenia: *inferiora* opposita; *superiora* sparsa; *nonnulla* ex inferioribus subserrata.

FLORES axillares, solitarii, brevissimè pedunculati.

COROLLA alba, calyce dimidio brevior.

SEMINA oblonga, compressa, lutea, hinc concava, inde subconvexa.

HABITAT in *Peruviae* rudieratis et muris ad *Pillao* vicum, et in segetibus *Limae*.

FLORET à Junio ad Septembrem.

Obs. Plantae, quae in aridis et rudieratis proveniunt, humiliores, et foliis floribusque undique onustae sunt: quae autem in versuris et inter segetes vegetant, ramosiores ad pedis ferè altitudinem crescunt, foliaque inferiora remota proferunt.

GRATIOLA. LINN. *Gen. pl.* p. 17.

GRATIOLA PERUVIANA.

1. *G.* foliis ovato-lanceolatis serratis, floribus breviter pedunculatis.

GRATIOLA floribus subsessilibus. LINN. *Sp. pl.* p. 22.

GRATIOLA latiore folio, flore albo. FEWILL. *Peruv.* t. 3. p. 23. *planch.* 17.

PLANTA herbacea.

RADIX fibrillosa, alba.

CAULIS patulus, saepè procumbens, ramosus, tetragonus.

RAMI consimiles, assurgentes.

FOLIA opposita, semiamplexicaulia, ovato-semilanceolata, omnino serrata, 3-5 nervia; nervis lateralibus obsoletis; patentia: *inferiora* minora, obtusiora.

FLORES axillares, solitarii, subsessiles.

BRACTEOLAE duae, subulatae, calycis longitudine, patulae, persistentes.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subulatis, persistentibus.

COROLLA alba. *Tubus* striis purpureis maculatus. *Faux* sublabio superiori villosa.

STAMINA quatuor, quorum duo breviora castrata. *Antherae* fertilium geminae, subrotundae.

STIGMA recurvum, bilobum: *lobis* intimè adpressis.

Obs. *Stemodia* maritima à *Gratiolae* Genere nihil alio differt, nisi Staminiibus omnibus fertilibus, ideoque ad hoc Genus referri posse videtur.

HABITAT in humidis *Limae* et *Conceptionis Regni Chilensis*.

FLORET Febuario, Martio, et Aprili.

Usus: Folia sapore amariuscule praedita sunt.

SANCHEZIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil.*

pag. 5. *ICON.* 32.

SANCHEZIA OBLONGA. *ICON.* VIII. *Fig.* b.

1. *S.* foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, petiolis alatis.

PLANTA orgyalis, herbacea.

CAULIS erectus, ramosus, glaber, obtusè tetragonus.

FOLIA opposita, petiolata, oblongo-lanceolata, acuminata, utrinque glabra.

PETIOLI alati, connati, breves.

SPICAE terminales, solitariae ternaeque: *lateralibus* brevioribus.

FLORES verticillati, totidem bracteis distincti.

VERTICILLI multiflori, involucrati: *Involucrum* diphyllum:

Foliola magna, ovata, integerrima, persistentia, erecta, punicea, pedunculum ferè obtegentia.

BRACTEAE lineares, integerrimae, puniceae, hirsutae.

CALYX luteus.

COROLLA lutea, hirsuta.

STAMINUM *Filamenta* hirsuta.

HABITAT in *Peruviae* stagnantibus et umbrosis ad *Cuchero*, *Pozuzo* et *Pillao* juxta *Chacahuassi* vicos.

FLORET ab Augusto ad Novembrem.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla. 3 Stamina et Rudimenta tubo corollae inserta. 4 Pistillum anulo insidens. 5 Anulus. 6 Capsula. 7 Eadem transversim secta. 8 Semina.

SANCHEZIA OVATA. *ICON.* VIII. *Fig.* c.

2. *S.* foliis ovatis acuminatis, petiolis semicylindricis.

PLANTA orgyalis, herbacea.

CAULIS erectus, tetragonus, vix divisus, glaber.

FOLIA opposita, patentia, petiolata, ovata, acuminata, integerrima, venosa, supra nitida, pubescentia.

PETIOLI connati, semicylindrici.

SPICA terminalis.

FLORES in verticillos aggregati, sessiles.

VERTICILLI multiflori, involucrati.

INVOLUCRUM diphyllum: *Foliola* ovata, acuta, concava, apice reflexa, punicea, persistentia.

BRACTEAE tot quot flores, oblongae, leviter emarginatae, puniceae, flores distinguentes.

CALYX ferè tubulosus, infernè angustatus, quinquepartitus, purpureus.

COROLLA lutea.

FILAMENTA ad apicem hirsuta.

HABITAT in *Peruviae* stagnatis et umbrosis locis, ad *Cuchero*, *Pozuzo* et *Pillao* circa *Chacahuassi*.

FLORET à Julio ad Decembrem.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Stamina et Rudimenta tubo corollae inserta.

SARMIENTA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 4.*

SARMIENTA REPENS. ICON. VII. Fig. b.

1. S. foliis ovatis carnosus utrinque punctatis.

URCEOLARIA foliis carnosus scandens. FEWILL. *Peruv. tom. 3. p. 69. planch. 43.*

PLANTA parasitica, scandens.

CAULIS ramosissimus, sarmentosus, teres, repens.

RAMI dependentes.

FOLIA opposita, breviter petiolata, ovata, carnosae, avenia, subtus albicantia, utrinque minutim punctata.

PEDUNCULI terminales, longi, filiformes, uni-biflori.

BRACTEOLAE duae, oblongae, crassiusculae sub singulo calyce.

CALYCES hirsuti.

COROLLA punicea, extus pubescens.

HABITAT copiose in nemoribus *Conceptionis Chile*, Provinciae *Rere*, *Itatae* et *Puchacay*.

FLORET Februario, et Martio.

VIRE: Folia ad callos emolliendos stirpandosque inserviunt.

Explic. Icon. 1 Calyx cum bracteolis. 2 Corolla cum staminibus et rudimentis. 3 Pistillum. 4 Capsula. 5 Eadem circumscissa. 6 Semina.

JUSTICIA. LINN. *Gen. pl. p. 17.*

JUSTICIA SPICATA. ICON. IX. Fig. a.

1. J. foliis lanceolato-oblongis, spicis oblongo-ovatis, bracteis inflexis.

PLANTA orgyalis, glabra, herbacea, perennis.

CAULIS erectus, infernè parum divisus, teres, geniculatus.

FOLIA petiolata, patentia, lanceolato-oblonga, integerrima.

SPICA terminalis, oblongo-ovata.

FLORES sessiles, bracteis lanceolatis, acutissimis, inflexis, solitariis suffultus.

CALYX quinquepartitus, brevissimus, bracteolis duabus lanceolatis, lateralibus suffultus.

COROLLA longissima, punicea: *Tubus* prope basim coarctatus: *Labium inferius* tripartitum; laciniis deflexis: *superius* erectum, emarginatum.

STAMINA longitudine corollae, tubi coarctationi inserta. *Antherae* incumbentes, infernè bifidae, subsagittatae.

STYLUS longitudine staminum. *Stigma* parvum, capitatum, subbilobum.

HABITAT in *Pozuzo* nemoribus.

FLORET Augusto, Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Calyx et Bracteolae calycinae sejunctae. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Anthera. 4 Pistillum.

JUSTICIA MUCRONATA. ICON. X. Fig. b.

2. J. foliis oblongo-obovatis dentato-spinosis.

FRUTEX biorgyalis, erectus.

CAULIS ramosus, teres.

RAMI inflexo-erecti, teretes.

FOLIA aliquando terna, petiolata, semipedalia, oblongo-obovata, acuminata, mucronata, supra nitida, dentato-spinosa; *denticulis* incurvis.

SPICAE terminales, ferè pedales, erectae.

FLORES sessiles, oppositi, aliquando terni.

BRACTEAE ovatae, acutae. *Bracteolae duae* sub singulo calyce, laterales, sessiles, ovatae, acutae, obsoletè denticulatae, calyce duplò breviores.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* oblongis, margine denticulatis, membranaceis.

CAPSULAE calyce triplò longiores, oblongo-obovatae, biloculares, bivalves.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Pati* tractus, prope *Chinchao* vicum.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Semen anticè et posticè visum.

JUSTICIA LONGISTAMINEA. ICON. X. Fig. a.

3. J. foliis sessilibus oblongis utrinque acutis subrepandis, pedunculis dichotomis.

PLANTA tripedalis, herbacea, perennis.

CAULIS erectus, teres, infernè parum divisus, geniculatus.

RAMI consimiles: *teneri* pubescentes.

FOLIA sessilia, oblonga, utrinque acuta, subrepanda, patentia, plana, supra nitida, subtus venosissima: *venis* inflexis, pubescentibus; *majora* latitudine sesquipalmari, longitudine tripalmari.

RACEMI terminales, purpurei, magni, compositi, pubescentes.

PEDUNCULI oppositi, gemini, dichotomi, bracteolis subulatis, pubescentibus suffulti.

PEDICELLI intermediis bracteati, aut nudi.

CALYX quinquepartitus, glaber: *laciniis* subulatis, inaequalibus.

COROLLA irregularis, gibba, ventricosa, glabra: *Labium superius* lineari-lanceolatum, integerrimum, angustissimum: *inferius* paulò brevius, trifidum; *laciniâ intermedia* breviori et angustiori: *Tubus* basi globosus, gibbus, medio coarctatus: *Faux* dilatata, maxima.

STAMINA corollâ duplò longiora. *Antherae* incumbentes, basi bifidae, subsagittatae.

STYLUS longitudine staminum.

STIGMA capitatum, bilobum, parvum.

Obs. Pedunculi, Pedicelli, Calyx, Corolla, Stamina, Stylusque purpurei.

HABITAT in *Pillao* nemoribus ad *Pampamarca*.

FLORET Octobri, et Novembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus scissa.

3 Pistillum. 4 Capsula cum seminibus aperta.

JUSTICIA SERICEA. Icon. IX. Fig. b.

4. J. foliis lanceolatis sericeis, marginibus reflexis; pedunculis axillaribus solitariis.

PLANTA fruticosa, quadripedalis, sericea.

CAULIS erectus, teres, ramosissimus.

RAMI consimiles.

FOLIA subsessilia, lanceolata, integerrima, marginibus revolutis, subtus venosissima, saepe lutescentia.

FLORES ex axillis superioribus, solitarii, sessiles.

FOLIOLA floralia oblongo-obovata, acuminata.

BRACTEOLAE duae lineares, falcatae, laterales, ad basim calycis.

CALYX quinquepartitus: laciniis lanceolatis, aequalibus.

COROLLA magna, coccinea, extus hirsuta; *Faux* rugosa: *Labium superius* erectum, emarginatum: *inferius* trifidum: laciniis obtusis.

STAMINA sub labio superiori recondita; fauci inserta. *Antherae* purpurascentes, infernè bifidae; laciniâ alterâ productioni.

STYLUS apice recurvus. *Stigma* leviter emarginatum.

CAPSULA oblonga, pedunculata, subclavata, bivalvis.

SEMINA bina.

HABITAT in aridis, et agrorum marginibus *Tarmae* ad *Acobamba*, et in *Cheuchin*, ubi *Chucumpa* nuncupant.

FLORET Aprili, et Majo.

VIRES. Ad pleuritidem usurpatur.

Explic. Icon. 1 Bractea communis. 2 Calyx cum bracteolis calycinis. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum.

JUSTICIA RACEMOSA. Icon. XI. Fig. b.

5. J. foliis ovato-lanceolatis, pedunculis dichotomis, floribus racemosis.

PLANTA tripedalis, villosa, herbacea, perennis.

CAULIS erectus, obtusè tetragonus, quadrisulcatus, striatus, geniculatus, ramosiusculus: angulis duobus oppositis densè villosis.

RAMI erecti, virgati, fragiles.

FOLIA petiolata, patentia, ovato-lanceolata, integerrima, venosissima.

PEDUNCULI axillares terminalesque, racemosi, bini ternique, dichotomi, bracteolis subulatis, solitariis suffulti.

PEDICELLI breves, uniflori, bracteolâ subulatâ sustentati.

BRACTEAE tres sub singulo calyce, subulatae, eo dimidio breviores.

CALYX quinquepartitus: laciniis lineari-lanceolatis.

COROLLA punicea, calyce triplò longior, bilabiata. *Tubus* prope basim coarctatus. *Labium superius* integrum, concavo-carinatum; *inferius* leviter tricrenatum.

Tom. I.

STAMINA: *Filamenta* longitudine corollae, coarctationi tubi inserta. *Antherae* biloculares, bilobae; lobo altero majori, oblongo; minori ferè trigono.

STYLUS longitudine staminum. *Stigma* capitatum, emarginatum.

CAPSULA clavata, acuminata, bilocularis, bivalvis, disperma.

SEMEN unicum in singulo loculo, lentiforme, glabrum, laeve, hinc concavum, inde convexum.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Muña* vicum.

FLORET Septembri, et Novembri.

Explic. Icon. 1 Calyx cum bracteolis. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Pistillum. 4 Capsula. 5 Eadem dehiscens. 6 Semina.

JUSTICIA TENUIFLORA. Icon. XII. Fig. a.

6. J. foliis lanceolatis, paniculâ terminali brachiata dichotomâque, floribus sessilibus.

PLANTA bipedalis, herbacea, perennis.

CAULIS erectus, ramosus, infernè teres, supernè subtetragonus.

RAMI virgati, sulcati, leviter pubescentes.

FOLIA lanceolata, usque ad basim petioli decurrentia, integerrima, glabra, venosa, supra nitida.

PANICULA terminalis, magna, pubescens. *Villi* apice glandulosi.

PEDUNCULI inferiores brachiati; superiores dichotomi, bracteolâ subulatâ suffulti.

FLORES sessiles, bracteolis tribus subulatis sustentati.

CALYX quinquepartitus: laciniis subulatis, aequalibus.

COROLLA longissima, angusta, punicea, bilabiata. *Tubus* tenuis. *Limbus* bilabiatus: *labium inferius* trifidum, obtusum; *superius* integrum.

STAMINA: *Filamenta* fauci inserta, subulata. *Antherae* biloculares, bilobae: lobis obversè conicis, altero majori.

PISTILLUM: *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis. *Stigma* emarginatum.

SEMINA duo in singulo loculo, utrinque granulosa.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Cuchero* vicum.

FLORET mensibus Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Calyx cum bracteolis. 2 Corolla cum staminibus. 3 Pistillum. 4 Capsula cum calyce. 5 Eadem aperta. 6 Semina.

JUSTICIA LINEOLATA. Icon. XIII. Fig. a.

7. J. foliis ovatis acutis, lineolis pellucidis, pedunculis terminalibus paniculatis, floribus spicatis.

PLANTA bipedalis, herbacea, perennis.

RADIX fibrillosa, tenuis.

CAULIS erectus, vix divisus, infernè teres, articulatus, supernè tetragonus, quadrisulcatus, glaber.

FOLIA petiolata, ovata, acuta, nonnulla obsolete dentata: denticulis remotis, lineolis pellucidis aspersa, glabra.

PEDUNCULI terminales, solitarii geminique, brachiati, leviter pubescentes: *partiales* bracteolis subulatis suffulti.

FLORES oppositi, sessiles, spicati.

BRACTEOLAE tres sub singulo calyce, subulatae; *inferiori* vix longiore.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subulatis, erectis.

COROLLA purpureo-caerulea, bilabiata: *labium inferius* trifidum, subtus concavum, supra punctatum; *laciniis* obtusis: *superius* integrum.

STAMINA: *Filamenta* corollae ferè longitudine. *Antherae* didymae, biloculares: *laciniâ alterâ* minori.

SEMINA bina, ovata, compressa, punctata, scabra.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Cuchero* vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Corolla cum staminibus scissa. 2 Pistillum. 3 Capsula cum calyce aperta. 4 Semina.

DIANTHERA. LINN. Gen. pl. p. 17.

DIANTHERA MULTIFLORA. ICON. XIV. Fig. b.

1. D. foliis oblongis, pedunculis ternis 2-4fidis, floribus 2-3 in singulis binis bracteis.

PLANTA sesquipedalis, herbacea, annua.

CAULIS erectus, infernè ramosus, sexangularis, hispidulus, geniculatus.

FOLIA petiolata, oblonga, acuta, integerrima, utrinque pubescentia.

PEDUNCULI axillares, terni, duobus quatuorve pedicellis brevissimis terminati.

PEDICELLI *exteriores* bracteolâ lineari-subulatâ, pubescenti suffulti.

FLORES verticillati, duo aut tres intra singulas binas bracteas communes, sessiles.

BRACTEAE communes geminae, obovatae, glabrae, mucronatae, *alterâ* breviori. *Bracteolae* duae oppositae infra singulum calycem, lineari-subulatae, pubescentes, ciliatae: *omnes* persistentes.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* lineari-subulatis, inaequalibus, pubescentibus, persistentibus.

COROLLA purpurea, ringens. *Tubus* subcontortus, longitudine calycis. *Labium inferius* tridentatum, obtusum: *superius* integrum, obtusum.

FILAMENTA faucis inserta, corollâ paulò breviora. *Antherae* geminae, *alterâ* inferiori.

STYLUS longitudine staminum. *Stigma* bilobum; *lobis* adpressis.

HABITAT in *Peruviae* umbrosis ad *Cheuchin* vicum.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE *Caihua-Caihua*.

VIRES ET USUS. *Radix* ad dentes mundificandos inservit. *Folia* edulia sunt.

Explic. Icon. 1 Duo Flores intra bracteas communes cum bracteolis. 2 Calyx cum bracteolis. 3 Pistillum.

DIANTHERA REPENS. ICON. XV.

Fig. b.

2. D. foliis ovatis acutis, pedunculis solitariis geminisque 4-5fidis, floribus 2-3 in singulis binis bracteis.

PLANTA suffruticosa, pedalis.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULES plures, prostrati, repentes, obsolete sexangulares, cinerei, ramosi, geniculati.

RAMI consimiles.

FOLIA breviter petiolata, ovata, acuta, tomentosa, denticulata; *radicalia* ovato-subrotunda.

PEDUNCULI axillares, solitarii geminique, petiolis longiores, terminati *pedicellis quatuor*, brevissimis, parallelis, duabus bracteolis subulatis, connatis, pubescentibus suffultis.

FLORES duo aut tres, subsessiles, intra singulas binas bracteas communes.

BRACTEAE communes magnae, geminae, *alterâ* breviori, obovatae cum brevissimo acumine, concavae, utrinque glandulosae; *glandulis* persistentibus. *Bracteolae* duae subulatae, glandulosae sub singulo calyce.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* aequalibus subulatis, villosis, apice glandulosis: *glandulis* deciduis.

COROLLA rubra, aliquando lutea, extus pubescens, longissima. *Faux* dilatata. *Tubus* deorsum angustatus. *Limbus* bilabiatus: *Labium superius* integrum, concavum, subgaleatum; *inferius* concavum, levissimè tridentatum.

STAMINA: *Filamenta* corollae longitudine. *Antherae* geminae, *alterâ* altiori. *Stylus* staminum longitudine. *Stigma* parvum, capitatum, bilobum.

HABITAT in rupium fissuris *Limae*, *Lurin*, *Chancay* et *Huanuci*.

FLORET Decembri, et Januario.

Explic. Icon. 1 Pedunculus communis cum quatuor bractearum communium paribus. 2 Duo Flores intra bracteas communes. 3 Calyx cum bracteolis. 4 Corolla cum staminibus scissa. 5 Pistillum.

DIANTHERA ACUMINATA. ICON. XVI. Fig. b.

3. D. foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, verticillis subsessilibus multifloris, bracteis ciliatis.

PLANTA bipedalis, herbacea, hirsuta. *Villi* apice glandulosi.

CAULIS ramosus, erectus, hexagonus, geniculatus, pilosus, granulis oblongiusculis respersus.

FOLIA petiolata, integerrima, hinc oblongo-lanceolata, inde ovato-lanceolata, acuminato-mucronata.

FLORES verticillati.

VERTICILLI superiores approximati, conferti; inferiores distantes.

PEDUNCULI axillares, gemini, terni solitariique, brevissimi, terminati pedicellis 3-4-5; quorum laterales *bracteolâ* subulatâ suffulti.

BRACTEAE communes, biflorae, lanceolato-lineares, acumi-

nato-mucronatae, ciliatae, persistentes: alterâ minori.

Bracteolae duae sub singulo calyce, subulatae, ciliatae.

CALYX parvus, quinquepartitus: *laciniis* subulatis, aequalibus, ciliatis.

COROLLA purpurea, extus pubescens, bracteis triplò longior, usque ad medium bifida, bilabiata. *Tubus* tenuis, *Labium superius* lanceolatum, integrum; *inferius* levisimè tridentatum, duplò latius. *Antherae* binae, oblongae in singulo filamentum, altera infra alteram.

STYLUS filiformis, longitudine staminum. *Stigma* bilobum.

CAPSULA obovata, bilocularis, bivalvis: *valvulis* cymbaeformibus, basi utrinque deffixis.

SEMINA bina, lentiformia, hispidiuscula, basi excavata.

HABITAT in *Huanuci* et *Huaurae* circuitu ad margines segetum.

FLORIDAM per totum annum offendimus.

VERNACULE in *Huanuco Caihua-Caihua* nominatur.

Incolae mucilaginem plantae ad condiendum cibi genus (*Locro* nominatum) extrahunt.

Explic. Icon. 1 Pedunculus communis cum quatuor bractearum communium paribus flores includentibus. 2 Duo Flores intra bracteas communes. 3 Calyx cum bracteolis. 4 Capsula. 5 Eadem aperta. 6 Semina.

DIANTHERA. MUCRONATA. Icon. XVI. Fig. a.

4. D. foliis ovatis mucronatis, floribus verticillatis, bracteis ovatis ciliatis mucronatis.

PLANTA bipedalis, hirsuta, herbacea.

CAULES plures, erecti assurgentesque, teretes, striati, geniculati, ramosi, leviter sexangulares.

RAMI brachiati, cauli similes.

FOLIA petiolata, ovata, acuta, mucronata, integerrima; *opposito* minori.

FLORES verticillati.

PEDUNCULI axillares, breves, solitarii geminique, triquadriphylli.

PEDICELLI brevissimi, serie horizontali digesti: *laterales* bracteolâ subulatâ suffulti.

FLORES tres, sessiles, intra binas bracteas communes.

BRACTEAE communes binae, conniventes, ovatae, mucronatae, ciliatae, persistentes; *inferiori* duplò minori: *Bracteolae duae* subulatae sub singulo calyce.

CALYX tubo corollae triplò brevior, quinquepartitus; *laciniis* aequalibus, linearibus, albidis, hirsutis.

COROLLA ringens, purpurea, pubescens. *Faux* dilatata. *Labium superius* integerrimum: *inferius* tridentatum.

STAMINA: *Filamenta* purpurea, glabra, corollae ferè longitudine. *Antherae* geminae, oblongae, uniloculares; *alterâ* altiori.

STYLUS longitudine corollae, glaber. *Stigma* bilobum.

CAPSULA brevis, suborbicularis, brevissimè pedunculata, bilocularis, bivalvis: *valvulis* infernè deffixis.

SEMINA bina, lentiformia, echinata, basi excavata.

HABITAT in *Huanuci* et *Chancay* agrorum versuris.

FLORET mensibus Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Pedunculus cum quatuor bractearum communium paribus, flores continentibus. 2 Bracteae cum tribus floribus clausis. 3 Calyx cum bracteolis. 4 Capsula. 5 Eadem hians. 6 Eadem aperta. 7 Semina.

DIANTHERA HIRSUTA. Icon. XIII. Fig. b.

5. D. foliis ovatis acutis, pedunculis geminis, floribus duobus in singulis binis bracteis.

PLANTA ferè bipedalis, herbacea, hirsutissima: *Villi* tribus sexve articulationibus.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULIS simplex, erectus, geniculatus, tetragonus, quadrisulcatus, supernè foliosus, infernè ramulosus.

FOLIA petiolata, ovata, acuta, integerrima.

PEDUNCULI axillares, terminalesque bini.

BRACTEAE communes binae, biflorae, ovatae, acuminatae; alterâ breviori.

BRACTEOLAE duae, subulatae, longitudine calycis.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* aequalibus, subulatis.

COROLLA bilabiata: *Labium inferius* trifidum; *laciniis* obtusis, reflexis: *superius* erectum, concavum.

STAMINA fauci corollae inserta. *Antherae* geminae.

GERMEN ovatum. *Stylus* longitudine corollae. *Stigma* bilobum.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Pozuzo*, *Chinchao* et *Cuchero* vicos.

FLORET Septembri, et Octobri.

Obs. *Folia* tincturam caeruleam, uti *Indigofera Anil* praestant. Planta exsiccata, aquâ respersa, et papyri plagulis interposita caeruleo colore inficit.

DIANTHERA SECUNDIFLORA. Icon. XV.

Fig. a.

6. D. foliis lanceolato-oblongis obsoletè crenatis, pedunculis solitariis polystachyis, floribus secundis.

PLANTA tripedalis, herbacea.

RADIX fibrosa, albidiuscula.

CAULES plures, ramosi, geniculati, leviter sexangulares, glabri, dilutè purpurascens.

RAMI consimiles, simplices.

FOLIA patentia, petiolata, lanceolato-oblonga, lata, venosissima, obsoletè crenata, glabra.

PEDUNCULI axillares, solitarii, longissimi, inflexi, purpurei, pubescentes, plurimis spicis, oppositis, pedicellatis, simplicibus, furcatis bifurcatisque compositi: *bracteolis* subulatis, parvis, subconnatis, infernè concavis, incurvis suffulti.

FLORES solitarii, sessiles, secundi; *bracteolis duabus* subulatis, connatis, incurvatis sustentati.

BRACTEOLAE aliae duae sub singulo calyce, subulatae.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subulatis.

COROLLA purpurea, bilabiata: *Labium inferius* trifidum;

laciniis obovatis, obtusis: *intermediâ* latiore, rotundâ: *superius* integerrimum.

FILAMENTA corollae longitudine, faucis inserta. *Antherae* duae in singulo filamento, caudatae, caudâ antherae inferioris longiori, incurvatâ.

HABITAT in *Pozuzo* nemoribus.

FLORET mense Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Pussca*.

USUS. Incolae hac plantâ colore rubro, et caeruleo tingunt.

Obs. Differt à congeneribus *Antheris* caudatis. Convenit cum *Justiciae* Speciebus bracteâ communi unicâ. An Genus novum constituendum ex hac Specie et duabus proximè sequentibus, quae omnes antheris caudatis gaudent?

Explic. Icon. 1 Calyx cum bracteolis. 2 Corolla cum staminibus. 3 Eadem cum iisdem scissa, et aucta. 4 Stamina. 5 Pistillum.

DIANTHERA CILIATA. Icon. XIV. Fig. a.

7. D. foliis lanceolatis, floribus spicatis confertis, bracteis calycibusque ciliatis.

PLANTA bipedalis, herbacea.

RADIX ramosa, fibrosa, longissima.

CAULIS erectus, simplex, hexagonus, geniculatus, radicans.

FOLIA petiolata, lanceolata, integerrima, glabra.

SPICAE axillares terminalesque, breves, pedunculatae.

FLORES confertissimi, oppositi, sessiles: singuli bracteâ magnâ, lanceolatâ, acumine subulato longissimo, ciliatâ stipati.

BRACTEOLAE duae, oppositae ad calycis basim, subulatae, ciliatae, longitudine calycis.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subulatis, ciliatis, inaequalibus.

COROLLA purpureo-violacea, fauce extus pubescens. *Tubus* tenuis. *Labium superius* emarginatum: *inferius* trifidum.

STAMINA faucis corollae inserta, limbo duplò breviora. *Antherae* geminae, oblongae, caudatae.

STYLUS longitudine staminum. *Stigma* parvum, capitatum, bilobum.

CAPSULA bilocularis, calyce duplò brevior.

SEMINA bina, scabra.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Pozuzo* vicum.

FLORET mensibus Augusto, Septembri et Octobri.

Explic. Icon. 1 Bractea communis. 2 Calyx cum bracteolis. 3 Corolla cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Capsula. 6 Eadem aperta. 7 Semina.

DIANTHERA APPENDICULATA. Icon. XI. Fig. a.

8. D. foliis lanceolatis undulatis basi appendiculatis, pedunculis solitariis ternisque, 3-5fidis parallelis.

PLANTA herbacea, glabra.

CAULIS orgyalis, erectus, geniculatus, obsolete angulatus, vix divisus, supernè purpurascens.

FOLIA petiolata, lanceolata, integerrima, venosissima, margine undulata, ferè quadripalmaria, basi utrinque appendiculata.

PEDUNCULI axillares, racemosi, solitarii, bini ternique, paralleli, tri-quinquefidi, multiflori.

FLORES sessiles, bracteâ lanceolatâ suffulti.

BRACTEOLAE tres sub singulo calyce, lanceolatae, concavae, persistentes.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* lineari-lanceolatis, aequalibus.

COROLLA purpurea, bilabiata, calyce quadruplò longior, pubescens. *Tubus* prope basim coarctatus: *Labium superius* integrum: *inferius* trifidum.

STAMINA: *Filamenta* corollae longitudine, faucis inserta. *Antherae* duae in singulo filamento, oblongo-lineares, caudatae.

STYLUS longitudine staminum. *Stigma* bilobum; lobis adpressis.

CAPSULA pedunculata, pubescens.

SEMINA bina, lentiformia, basi excavata, undique granulosa.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus umbrosis locis ad *Pozuzo* vicum.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Bractea communis. 2 Calyx cum tribus bracteolis. 3 Corolla cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Capsula aperta. 6 Semina.

Obs. Characteres Generici *Dianthera* cum *Justicia* adeo convenit, ut in unum reduci debeat: haec est mea opinio, uti cl. Haenkeus, Lamarck, Schreber et alii fecere. *PAYSON*.

JOVELLANA.

CHARACTER GENERICUS NATURALIS.

CAL. *Perianthium* quadripartitum: *laciniis* ovatis, acutis, patentibus; *superiore* angustiori; *inferiore* latiori: inferum, persistens.

COR. irregularis, cymbaeformis, resupinata. *Tubus* vix ullus. *Limbus* bilobus: lobis subaequalibus; *superiore* concavo-carinato; *inferiori* inflato, subcalceiformi.

STAM. *Filamenta* duo, sublinearia, compressiuscula, incurvata, opposita, basi corollae infra incisuras inserta. *Antherae* cordato-ovatae, utrinque sulcatae, erectae, biloculares, dissepimento contrario; *loculis* septo intermedio receptaculo inserto divisis: post pollinis effusionem persistentes.

PIST. *Germen* ovato-conicum. *Stylus* subulatus, incurvus, staminum longitudine. *Stigma* capitato-peltatum, leviter emarginatum.

PER. *Capsula* ovato-conica, bisulca, bilocularis, apice bivalvis: *valvulis* bifidis.

SEM. oblongo-obovata, laevia, planiuscula. *Receptaculum* dissepimento utrinque adnatum, ovato-conicum.

Obs. Differt hoc Genus à *Calceolariâ*, cui valde affine, corollâ et staminibus.

CHARACTER DIFFERENTIALIS.

COROLLA cymbaeformis, resupinata, biloba. *Calyx* quadripartitus.

Genus nuncupatum Ex.^{mo} D. D. Casparo Melchiori de Jovellanos, viro undequaque spectatissimo, praecipuo hujus Operis editionis Promotori.

JOVELLANA SCAPIFLORA. ICON. XVIII. Fig. b.

1 J. foliis ovatis serratis, scapis inaequalibus unifloris.

CALCEOLARIA (plantaginea) scapis paucifloris, foliis rhombeis serratis. SMITH. fasc. 1. pag. 2. tab. 2.

PLANTA herbacea, pumila, annua.

RADIX ramosa.

SCAPI 3-5, inaequales, erecti, ferè bipalmes, filiformes, teretes, subancipites, pubescentes, purpurei, uniflori, nudi: *lateralibus oppositis*, teretibus, glabris.

FOLIA radicalia, patentia, ovata, basi attenuata, quinque-nervia, serrata, utrinque pubescentia.

FLOS unicus, terminalis ex singuli scapi apice.

CALYX pubescens.

COROLLA lutea; *Labium inferius* internè punctis purpureis maculatum.

FILAMENTA purpurea. *Antherae* atro-purpureae, cordato-ovatae.

SEMINA fulva.

HABITAT in alpidibus Tarmae et Caxatambo ad Cheuchin.

FLORET Julio, et Augusto.

Obs. Folia succum mucilaginosum praebent.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Idem posticè visus. 3 Flos. 4 Corolla cum staminibus et pistillo. 5 Stamina. 6 Pistillum. 7 Capsula. 8 Semina. 9 Pars Scapi aucta.

JOVELLANA PUNCTATA. ICON. XVIII. Fig. a.

2. J. foliis ovato-oblongis duplicato-serratis, pedunculis multifloris cymosis.

GESNERA floribus maculatis. FEWILL. tom. 3. p. 21. pl. 16.

PLANTA fruticosa, tripedalis.

RADIX ramosa, tortuosa, fibrillosa.

CAULIS erectus, ramosus, fragilis, teres, compressiusculus.

RAMI consimiles: *teneri* pubescentes, glanduliferi.

FOLIA opposita, petiolata, ovato-oblonga, duplicato-serrata, glabra, subtus albida; nonnulla supra villosa: *floralia* integerrima: *omnia* utrinque punctis purpureis notata: *nervo* subtus utrinque sulcato.

PETIOLI connati, extus bisulci.

PEDUNCULI terminales axillaresque, multiflori, cymosi.

CALYX quadripartitus: *laciniis* ovatis, punctatis; *oppositis* vix latioribus.

COROLLA albo-violacea, maculâ pallidâ, punctisque purpureis variegata, campanulata, compressiuscula, cymbaeformis, resupinata, irregularis. *Tubus* brevis, patens, basi hirsutus; *villis* articulatis, flexuosis (Confervae instar).

Tom. I.

Limbus bilabiatus subaequalis, margine pubescens: *Labium inferius* margine parum involutum, superiori paulò longius: *superius* planiusculum.

STAMINA: *Filamenta* breviora, plana, sublinearia, opposita; infra incisuras tubi corollae inserta. *Antherae* erectae, reniformes, emarginatae, biloculares.

PISTILLUM: *Germen* ovatum. *Stylus* subulatus, parum incurvus. *Stigma* bilobum.

HABITAT in silvis Arauco prope Piedra dorada aliisque locis Provinciarum Conceptionis Chile et Puchacay.

FLORET Februario, et Martio.

VERNACULE Arguenilla.

Obs. Insigni vi depuratoriâ, teste P. Feuvilleo, praestat; quamobrem in morbis venereis Indi plantae infusum quam maximè calidissimum fieri potest, manè non sine utilitate, ut ipsi asseverant, quotidie bibunt.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Flos. 3 Corolla postice visa. 4 Eadem antice cum staminibus, lateraliter scissa. 5 Stamina. 6 Pistillum. 7 Capsula et Semina. 8 Villus auctus.

SCHIZANTHUS. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 6.

SCHIZANTHUS PINNATUS. ICON. XVII.

1. S. foliis interruptè pinnatis.

PLANTA herbacea, *villis* longioribus glandulâ terminatis.

RADIX fibrillosa.

CAULIS bipedalis, erectus, parum ramosus, teres.

RAMI alterni, consimiles.

FOLIA alterna, breviter petiolata, interruptè pinnata: *foliola* sessilia: *majora* laciniato-pinnatifida; *minora* lanceolata, integra.

FLORES paniculati.

PEDICELLI uniflori, filiformes, bracteolis duabus lanceolatis suffulti.

COROLLA caeruleo-violacea: *labium superius* variegatum, in centro maculâ purpureâ notatum.

FILAMENTA sterilia villosa. *Antherae* reniformes.

STIGMA emarginatum.

CAPSULA bilocularis, bivalvis: *valvulis* bifidis.

HABITAT in agrorum versuris Chile ad Esquadron, et in Araucanorum tractu.

FLORET Februario, et Martio.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Idem lateraliter visus. 3 Calyx. 4 Stamen sterile auctum. 5 Corolla cum staminibus et rudimentis. 6 Pistillum. 7 Capsula cum calyce. 8 Eadem dehiscens. 9 Semina. 10 Villus auctus.

CALCEOLARIA. LINN. Gen. pl. p. 18.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* quadripartitum: *laciniis* ovatis, acutis, venosis; *lateralibus* latioribus: *infimâ* angustiore, inferum, patens, persistens.

COR. bilabiata: *Tubus* brevissimus: *Labium superius* mini-

mum, coarctatum, subrotundum, concavum: *Labium inferius* maximum, calceiforme, inflatum, anticè hians.

STAM. *Filamenta* duo, brevissima, subulata, planiuscula, basi dilatata, ad basim corollae inserta, parti angustiori tubi opposita. *Antherae* incumbentes, labio superiori tectae, saepe exsertae, bilobae, callosae: *lobis* oblongis, patentissimis, unilocularibus, supernè univalvibus: loculo septo intermedio semidiviso.

PIST. *Germen* ovato-conicum. *Stylus* subulatus, longitudine staminum, curvatus. *Stigma* obtusum, leviter emarginatum.

PER. *Capsula* ovato-conica, bisulca, bilocularis, apice bivalvis: *valvulis* bifidis.

SEM. numerosa, minima, oblonga, cum brevi acumine, striata: *Receptaculum* semiovato-conicum, dissepimento utrinque adnatum.

Obs. 1. *Stigma* lente vitreâ conspectum bilobum: *lobis* emarginatis.

HABITUS.

Plantae herbaceae, aut fruticosae, viscoso-resinosae, pubescentes vel hirsutae, aut villosae: *Villi* bifformes: *longiores* setosi, articulati, flexuosi (Confervae instar); *breviores* glandulâ terminati. *Caules* fragiles. *Folia* opposita, saepe terna, simplicia, in *Calc. Pinn.* pinnata. *Petioluli* connati aut perfoliati; in *Calc. Perfol.* decurrentes. *Pedunculi* axillares terminalesque, solitarii, gemini, uniflori, vel dichotomo-corymbosi, aut umbellati, multiflori. *Pedicelli intermedii* uniflori: *laterales* tri-quadriflori. *Foliola* duo ad pedicellorum insertionem.

Obs. 2. *Calceolariae* omnes, quae *Plantae* sunt magis minusve amarae, diureticâ virtute pollent, et luteam tincturam praebent.

CALCEOLARIA PINNATA. ICON. XIX. Fig. a.

1. *C.* foliis pinnatis, caule dichotomo radicante.

CALCEOLARIA foliis Scabiosae vulgaris. FEWILL. *Peruv.* t. 3 pag. 12. pl. 7. fig. 1.

CALCEOLARIA (*pinnata*) foliis pinnatis. LINN. *Sp. pl.* t. 1. p. 49.

PLANTA herbacea, succosa, pubescens.

RADIX repens.

CAULIS bipedalis, erectus, obsoletè tetragonus, glaber villosusque, saepe purpurascens, geniculatus, radicans, subhyalinus.

RAMI dichotomi; *juniores* pubescentes.

FOLIA *inferiora* pinnata; *superiora* pinnatifida; *terminalia* integra: *foliola* ovato-lanceolata, acuta obtusaque, duplicato-serrata, basi superiori oblique excavatâ, inflexa, sessilia, subtus albicantia, pubescentia: *intima* gradatim minora.

PETIOLI connati, villosi.

PEDUNCULI ex dichotomiis, et axillis superioribus solitarii geminique, in corymbum ferè dispositi, uniflori, erecti,

longi, apice curvati, villosi.

CALYX extus purpurascens, villosus.

COROLLA luteo-sulphurea, magna, caduca, glabra.

STAMINA inclusa. *Antherae* bilobae: *lobis* patentibus; *altero* oblongo, breviori, pollinifero, descendente, rimâ hiantè, carinato; *opposito* longiori, clavato, apice pervio, vix pollinifero, ascendente.

HABITAT copiosè in *Peruviae* humidis, stagnatis et aquaeductuum marginibus in *Limae*, *Chancay*, *Tarmae* et *Huanuci* Provinciis.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Mancapaqui*. Vulgò *Yerba de la Bolsilla*.

Obs. Folia pro soli natura maximè variant. *Plantae*, quae in collibus altis arenosis tempore pluviarum crescunt, humiles gracilesque sunt, foliis superioribus magis fissis et obtusioribus.

VIRES: praestantissimum diureticum est.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Capsula cum calyce. 6 Eadem dehiscens, et semina. 7 Villi aucti.

CALCEOLARIA TRIPARTITA. ICON. XXII. Fig. a.

2. *C.* foliis tripartitis: lobis ovatis serratis.

PLANTA herbacea, annua, hirsuta.

CAULIS teres, ramosus.

FOLIA opposita, petiolata, tripartita; *lobis* ovatis; *intermedio* majori.

PEDUNCULI terminales, corymbosi.

PEDICELLI quinque, sex, umbellati, inaequales.

CALYX hirsutus.

COROLLA lutea, calyce duplò major.

HABITAT in nemoribus *Panatahuas*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Corolla cum staminibus. 3 Capsula cum calyce clausa. 4 Eadem cum calyce dehiscens. 5 Semina.

CALCEOLARIA CORYMBOSA. ICON. XX. Fig. b.

3. *C.* foliis radicalibus ovatis cordatisque petiolatis bicornatis; caulinis cordatis semiamplexicaulibus.

PLANTA herbacea, hirsuta.

RADIX fasciculata, fibrillosa.

CAULIS bipedalis, erectus, simplex, teres, solitarius, supernè dichotomus, foliosus, infernè nudus.

FOLIA radicalia, petiolata, ovata, aliquando cordata, obtusa, ampla, duplicato-crenata, subtus albida, venosa, nervosa; *floralia* distantia, opposita, semiamplexicaulia, integerrima; *inferiora* crenata, cordata.

PEDUNCULI terminales axillaresque, dichotomi, multiflori: *intermedii* uniflori; *laterales* umbellati.

FLORES ante explicationem nutantes.

COROLLA lutea, lineis et punctis sanguineis variegata: *Labium inferius* magnum: *superius* patens.

ANTHERAE bilobae : lobis oblongis, horizontalibus, unilocularibus, supernè rimâ hiantibus, tandem reflexis.

HABITAT in umbrosis urbis *Conceptionis Chile*.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE *Arguénita* nuncupant.

VIRES : Diureticâ virtute pollet.

CALCEOLARIA PERFOLIATA. ICON. XXI. Fig. a.

4. C. foliis sagittatis dentatis, petiolis alatis perfoliatis.

CALCEOLARIA (*perfoliata*) foliis perfoliatis, spathulato-sagittatis. LINN. *fil. supp.* p. 86.

CALCEOLARIA (*perfoliata*) foliis perfoliatis, sagittatis, utrinque villosis. SMITH. *fasc. 1. p. 4.*

PLANTA herbacea, viscosa, hirsuta. Villi longiores setacei, articulati : breviores glandulâ terminati.

CAULIS sesquipedalis, erectus, infernè parum ramosus.

RAMI patentes, teretes, dichotomi.

FOLIA petiolata, ampla, sagittata, duplicato-dentata, rugosa, patentia, subtus venosissima. Folia duo opposita, sessilia, aliquando solitaria in singulo pedunculo, ad insertionem pedicellorum, ovata, acuta, serrata.

PETIOLI alati, perfoliati : alis inferius dilatatis, dentatis.

PEDUNCULI axillares terminalesque, solitarii, dichotomo-umbellati, multiflori, aliquando umbellati, 4-5-6flori, teretes, longissimi.

PEDICELLI tenues, longi, inaequales.

COROLLA lutea, glabra.

HABITAT in lapidosis et aridis *Chinchao*, *Muña* et *Chacila*.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx postice visus. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina.

CALCEOLARIA TOMENTOSA. ICON. XXII. Fig. b.

5. C. foliis cordato-triangularibus duplicato-serratis subtus tomentosis, petiolis connatis, pedunculis 6-8floris.

PLANTA herbacea, quadripedalis.

CAULIS erectus, ramosus, teres, glaber.

FOLIA cordato-triangularia, lata, duplicato-serrata, supra leviter pubescentia, rugosa, subtus tomentosa.

PETIOLI connati, alati, serrati.

PEDUNCULI terminales, teretes, pubescentes, lutei, sex-octoflorique.

CALYCES viridi-lutescentes.

COROLLAE luteae, magnae.

Obs. Maximam affinitatem cum *C. perfoliata* habet.

HABITAT in umbrosis *Tarmae*, *Cuchero*, *Muña* et *Huassahuassi*.

FLORET à Novembri ad Februarium.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Corolla cum staminibus. 3 Capsula dehiscens. 4 Semina.

CALCEOLARIA BICRENATA. ICON. XXIII. Fig. b.

6. C. foliis ovatis bicrenatis subtus tomentosis.

PLANTA herbacea, annua, bipedalis.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

FOLIA breviter petiolata, ovata, rugosa, duplicato-crenata, subtus tomentosa ; superiora serrata.

PETIOLI connati, hirsuti.

PEDUNCULI terminales, corymbosi.

PEDICELLI numerosi, umbellati, inaequales, hirsuti.

CALYCES villosi.

COROLLA lutea, calyce duplò major.

HABITAT in *Cuchero* nemoribus.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Corolla. 3 Stamina.

CALCEOLARIA INVOLUTA. ICON. XXIII. Fig. a.

7. C. foliis ovatis acutis serratis, corollis involutis calycem semitegentibus.

PLANTA suffruticosa, tripedalis, glabra.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA breviter petiolata, ovata, acuta, serrata, rugosa.

PEDUNCULI terminales, corymbosi.

PEDICELLI axillares terminalesque, umbellati.

CALYX reflexus.

COROLLA involuta, calycem semitegens.

HABITAT in *Panatahuas* nemoribus.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Corolla cum staminibus. 3 Capsula cum calyce. 4 Semina.

CALCEOLARIA PUNICEA. ICON. XXIV. Fig. a.

8. C. caule repente, foliis ovalibus serratis, floribus puniceis.

PLANTA herbacea, hirsuta.

RADIX fasciculata, fibrosa.

CAULIS teres, repens, ramosus.

RAMI erecti.

FOLIA opposita, ovalia, serrata, supra glabra, petiolata.

PETIOLI breves, connati.

PEDUNCULI terminales, bifidi, 7-8flori.

FLORES umbellati, longè pedicellati.

PEDICELLI inaequales.

CALYX parvus.

COROLLA punicea, glabra.

HABITAT in *Panatahuas* nemoribus ad *Chicoplaya*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Capsula cum calyce.

CALCEOLARIA OBLONGA. ICON. XXIV. Fig. b.

9. C. foliis oblongis serratis, pedunculis trifidis, corollis intus punctatis.

PLANTA herbacea, hirsuta, annua.

RADIX fasciculata, fibrosa.

CAULIS erectus, teres, sesquipedalis, simplicissimus.

FOLIA breviter petiolata, oblonga, serrata, patentia.

PEDUNCULUS terminalis, trifidus, subdichotomus.

FLORES tres sexque ex singulo pedunculo partiali.

PEDICELLI inaequales.

CALYX parvus, hirsutus.

COROLLA glabra, lutea, intus punctis coccineis maculata.

HABITAT in *Panatahuas* montibus.

FLORET mense Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Corolla cum staminibus. 3 Capsula cum calyce dehiscens. 4 Semina.

CALCEOLARIA HETEROPHYLLA. ICON. XXI.
Fig. b.

10. C. foliis ovatis ellipticis subcordatisque serratis, pedunculis longissimis dichotomis.

PLANTA herbacea, hirsutissima. Villi ferruginei, bifformes: longiores setosi, articulati: breviores glandulâ terminati.

RADIX fibrillosa.

CAULIS erectus, pedalis, quadrangularis, ramosus.

RAMI erecto-patuli, purpurascens.

FOLIA petiolata, patentia, ovata, elliptica, subcordata, oblonga subrotundaque, serrata, saepe duplicato-serrata, subtus venosissima.

PEDUNCULI terminales, et ex axillis superioribus, viscosi.

PEDICELLI longissimi, dichotomi, uniflori: duo ex dichotomia inferiori inaequales; reliqui solitarii.

CALYX striatus, patentissimus.

COROLLA lutea, semiaperta, glabra.

STAMINA exserta.

HABITAT in *Muña* nemoribus.

FLORET Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx posticè visus. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Capsula dehiscens. 5 Semen auctum.

CALCEOLARIA UNIFLORA. ICON. XX.
Fig. c.

11. C. foliis ovatis serratis, pedunculis longis filiformibus unifloris.

PLANTA suffruticosa.

CAULIS quadripedalis, ramosissimus, teres.

RAMI juniores pubescentes, altero latere atro-purpurei.

FOLIA saepe terna, breviter petiolata, ovata, pubescentia, serrata: tenera subtus tomentosa.

PEDUNCULI axillares solitarii; terminales quaterni, filiformes, longi, uniflori, ad medium bifolii; foliolis integerrimis, utrinque pubescentibus.

CALYX pubescens.

COROLLA lutea.

HABITAT in umbrosis *Tarmae* ad *Curis*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

CALCEOLARIA BIFLORA. ICON. XX. Fig. a.

12. C. foliis ovatis serratis crenatisque, pedunculis geminis filiformibus unifloris.

CALCEOLARIA (ovata) caule ramoso, foliis ovatis, crenatis. SMITH. fasc. 1. p. 3. t. 3.

PLANTA densè pubescens. Villi albidii, pellucidi; longiores setacei, articulati: breviores glandulâ terminati.

RADIX fibrosa.

CAULIS herbaceus, erectus, teres, ramosiusculus.

RAMI inferiores oppositi; superiores alterni, distantes.

FOLIA breviter petiolata, ovata, integerrima, saepius serrata; nonnulla serrato-crenata, subtus venosa.

PEDUNCULI axillares, filiformes, uniflori, duo ex alterâ axillâ, quorum alter paulò longior; rarissimè solitarii.

CALYX quadripartitus: laciniis ovato-rhombeis.

COROLLA minima, lutea.

Obs. Cum plures hujus Generis Species foliis ovatis gaudeant, nomen triviale *ovata* à Smith impositum excludendum videtur, et ideo *Calc. bifloram* à pedunculis geminis diximus.

HABITAT copiosè in arenosis altis *Chanca* et *Limae*.

FLORET Octobri.

CALCEOLARIA INFLEXA. ICON. XXV. Fig. a.

13. C. foliis ovatis acutis crenulatis, pedunculis inflexis 3-4floris.

PLANTA suffruticosa, scandens.

CAULIS ramosissimus, teres, cortice scabriusculo, tenui, sedente tectus, tandem ferrugineo-purpurascens, laevis, nitidiusculus.

RAMI brachiati, inflexi, cauli similes.

FOLIA petiolata, ovata, acuta, è medio ad apicem crenulata, horizontaliter saepe deflexa, patentia, subtus venosissima, subincana.

PETIOLI connati.

PEDUNCULI axillares terminalesque, brachiati, inflexi, longi, quadriflori, saepe triflori.

PEDICELLI subaequales, umbellati. Foliola duo ovata, sub singula umbella.

CALYX quadripartitus, lutescens: laciniis lateralibus vix latioribus.

COROLLA luteo-aurea.

FILAMENTA duo, lineari-subulata, longitudine labii superioris.

HABITAT in *Cantae* praeruptis.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Stamina. 3 Pistillum cum calyce. 4 Capsula cum calyce. 5 Eadem dehiscens. 6 Semina.

CALCEOLARIA BICOLOR. ICON. XXV. Fig. b.

14. C. foliis ovato-cordatis acutis venosissimis rugosis biserratis, pedunculis multifloris, dichotomo-umbellatis.

PLANTA suffruticosa, pubescens, incana.

CAULIS biulnaris, erectus, teres, ramosissimus.

RAMI subdependentes, obtusè quadrangulares, lignosi, fragiles, ferrugineo-purpurei.

FOLIA terna oppositaque, petiolata, patentia, ovato-cordata, acuta, duplicato-serrata, rugosa, venosissima.

PEDUNCULI axillares terminalesque, multiflori, umbellato-dichotomi. *Foliola duo*, parva, ovata, sessilia, subintegerrima sub singulis dichotomiis.

PEDICELLI inaequales, tenues, villis glandulâ terminatis.

COROLLA è medio ad basim alba, supernè aureo-sulphurea.

HABITAT in *Cantae* praeruptis, argillosis et petrosis.

FLORET à Martio ad Julium.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Stamina. 3 Pistillum cum calyce.

CALCEOLARIA TRIFIDA. ICON. XXVI. Fig. b.

15. C. foliis cordatis ovatisque crenato-serratis, pedunculis trifidis multifloris umbellatis.

PLANTA suffruticosa, bi-tripedalis.

CAULIS ramosus, erectus, teres, glabriusculus.

RAMI consimiles; *teneri* leviter tomentosi.

FOLIA opposita ternaque, breviter petiolata, cordato-ovata, crenato-serrata, supra leviter pubescentia, subtus canescentia: *Villi* glanduliferi.

PETIOLI connati.

PEDUNCULI axillares terminalesque, solitarii, longi, suboc-toflori, trifidi, umbellati, canescentes: *intermedii* uniflori.

COROLLA lutea.

FILAMENTA duo, linearia, plana.

HABITAT in *Cheuchin* locis umbrosis prope aquas.

FLORET Martio, Aprili et Majo.

VERNACULE *Tumpu*.

VIRES: febrifuga et antiseptica.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Capsula cum calyce dehiscens.

CALCEOLARIA FLEXUOSA. ICON. XXVI. Fig. a.

16. C. foliis cordatis crenatis, pedunculis multifloris umbellatis.

PLANTA frutescens, villosa: *villis* articulatis, glanduliferis.

CAULIS erectus, teres, ramosus, asper.

RAMI consimiles, flexuosi.

FOLIA petiolata, distantia, patentia, cordata, crenata, supra aspera, subtus venosa.

PEDUNCULI axillares terminalesque, longi, trifidi, umbellati, septem-undecimflori.

CALYX quadripartitus: *laciniis* patentibus: *lateralibus* latioribus.

COROLLA lutea.

FILAMENTA duo, labii superioris corollae ferè longitudine.

Antherae post effusionem pollinis deflexae.

HABITAT in praeruptis *Cantae*.

Tom. I.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Capsula cum calyce dehiscens.

CALCEOLARIA VERTICILLATA.

17. C. foliis ternis cordatis acutis serratis, pedunculis quadrifloris.

PLANTA suffruticosa, glabra.

CAULIS orgyalis, erectus, ramosus, teres.

RAMI teretes, paleacei coloris, erecto-patuli.

FOLIA omnia verticillato-terna, breviter petiolata.

PEDUNCULI axillares, quadriflori; sub singulis binis pedicellis foliolum unicum.

COROLLA lutea.

HABITAT in *Cantae* praeruptis ad *Quive*.

FLORET à Decembri ad Martium.

CALCEOLARIA GLAUCA. ICON. XXVII. Fig. c.

18. C. foliis lanceolatis serratis, pedunculis tri-quadrifloris, corollis maculatis.

PLANTA suffruticosa.

CAULIS tripedalis, ramosissimus, teres.

RAMI erecti, terni oppositique, lignosi, fragiles, teretes: *teneri* leviter pubescentes, subpurpurei.

FOLIA terna, saepe opposita, breviter petiolata, patentia, lanceolata, serrata, venosa, utrinque leviter pubescentia, supra glauca; serraturis aliquando interruptis.

PEDUNCULI ex axillis superioribus, quadriflori, rariùs triflori, bi-trifolii.

FLORES umbellati.

COROLLA sulphurea, saepe ad basim interiorem punctis purpureis maculata.

FILAMENTA brevissima, infernè lata, supernè sensim attenuata.

CAPSULAE parvae.

HABITAT in *Cantae* circuitu, prope *Obrajillo* vicum.

FLORET per totum ferè annum.

Explic. Icon. 1 Stamina.

CALCEOLARIA ANGUSTIFLORA. ICON. XXVIII. Fig. a.

19. C. foliis ovato-lanceolatis acutè serratis, pedunculis quadrifloris, corollis basi angustissimis.

PLANTA suffruticosa.

CAULIS bipedalis, erecto-patulus, teres, ramosissimus, helvoli coloris.

RAMI patentes, oppositi ternique, fragiles, teretes: *teneri* hirsuti, purpurascens.

FOLIA opposita ternaque, breviter petiolata, ovato-lanceolata, acutè serrata, venosa, utrinque pubescentia, tenuia.

Foliola duo sub quatuor pedicellis, opposita, lanceolata, integra.

PEDUNCULI axillares, solitarii, hirsuti, quadriflori, foliis breviores, tenues.

PEDICELLI graciles, subaequales.

CALYX quadripartitus: *laciniis* patentibus, pubescentibus.

COROLLA parva, lutea; basi interius punctis purpureis maculata, angustissima.

HABITAT in *Cantae* versuris circa *Obrajillo* vicum.

FLORET per totum ferè annum.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Stamina.

CALCEOLARIA DENTATA. ICON. XXIX. Fig. b.

20. C. foliis ovatis argutè bidentatis.

PLANTA suffruticosa, ferè tripedalis, hirsuta, viscosa.

CAULIS ramosissimus, teres.

RAMI virgati, teretes, infernè glabri.

FOLIA opposita, aliquando terna, petiolata, ovata, acuta, duplicato-dentata, denticulis acutis: *adultæ* glabra.

PEDUNCULI terminales, corymbosi.

PEDICELLI secundi, teretes, flexuosi, tenues.

COROLLA lutea, glabra.

CAPSULA bivalvis, bilocularis; *valvulis* bifidis.

SEMIMA fulva.

HABITAT in *Conceptionis Chile* silvis.

FLORET Decembri, Januario et Februario.

Obs. Folia amariuscule sapore (Cortici Peruviano accedenti) praedita sunt.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Stamina. 3 Capsula cum calyce dehiscens. 4 Semina aucta. 5 Villi aucti.

CALCEOLARIA VISCOSA. ICON. XXX. Fig. a.

21. C. foliis ovatis acutis serratis viscosissimis, calycibus tomentosis.

PLANTA suffruticosa, viscoso-resinosa.

CAULIS ramosus, erectus, teres.

RAMI compressiusculi, obsoletè tetragoni.

FOLIA petiolata, ovata, acuta, serrata, subtus venosa, albicantia, aliquando biserrata.

PEDUNCULI terminales, umbellati.

PEDICELLI *laterales* triflori; *intermedii* uniflori, tomentosi, compressi.

FLORES initio cernui.

COROLLA luteo-pallida, extus leviter pubescens.

HABITAT in *Peruviae* alpibus in *Cantae* et *Tarmae* Provinciis.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Obs. Folia trita *Teucrium Marum* redolent, et amarissimo sapore sunt praedita.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Stamina.

CALCEOLARIA DEFLEXA. ICON. XXX. Fig. b.

22. C. foliis ovato-lanceolatis serrulatis, floribus terminalibus corymbosis, pedicellis 4-5 floris nutantibus.

PLANTA suffruticosa, glabra.

CAULIS biulnaris, erectus, teres, ramosus.

RAMI erecto-patuli, purpurei; *teneri* viscoso-resinosi, villosiusculi.

FOLIA deflexa, breviter petiolata, ovato-lanceolata, acuta, supra lucida, subtus albicantia, serrulata; *floralia* integerrima.

PETIOLI connati.

PEDUNCULI axillares terminalesque, longi, umbellato-dichotomi, quatuor quinqueflori, *foliolis duobus* lanceolatis suffulti.

PEDICELLI inaequales.

FLORES nutantes.

COROLLA luteo-crocea.

HABITAT in Provincia *Caxatambo* ad *Cheuchin*, prope torrentes.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Obs. Folia amariuscule.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Stamina.

CALCEOLARIA SALICIFOLIA. ICON. XIX. Fig. b.

23. C. foliis lanceolatis serratis, pedunculis geminis terminalibus umbellatis dichotomisque.

PLANTA suffruticosa, glaberrima.

CAULIS sexpedalis, erectus, teres, ramosus, fragilis, duplici cortice tectus: *exteriori* cinereâ, membranaceâ, rimosâ; *interiori* ferrugineâ.

RAMI brachiati, obsoletè tetragoni; *teneri* viscoso-resinosi.

FOLIA petiolata, patentia deflexaque, lanceolata, acuta, serrata; supra nitida, viscoso-resinosa; subtus venoso-reticulata, cinerea, rugosiuscula, (*Salviae officinalis* instar): *folia duo* sub singulis umbellis, et umbellulis serrata integerrimaque.

PEDUNCULI terminales, gemini, longi, dichotomo-umbellati, octo, decemflori, aliquando umbellati, quadriflori.

PEDICELLI longi, teretes, aequales, uniflori.

CALYX quadripartitus: *laciniis* in fructu deflexis.

COROLLA maxima, sulphurea, pubescens: *Villis* glanduliferis.

HABITAT copiosè in *Peruviae* praeruptis et uliginosis ad *Huassahuassi*, *Huanucum* et *Pillao*.

VERNACULE *Pachacca*.

FLORET à Januario ad Augustum.

Explic. Icon. 1 Stamina. 2 Pistillum. 3 Capsula cum calyce dehiscens.

CALCEOLARIA SESSILIS.

24. C. foliis lanceolatis serratis semiamplexicaulibus rugosis canescentibus.

PLANTA suffruticosa.

CAULIS erectus, bipedalis, ramosus, teres, fragilis.

RAMI consimiles.

FOLIA semiamplexicaulia, lanceolata, acuta, serrata, rugosa, incana.

PEDUNCULI terminales, longi, umbellati, dichotomi, multiflori.

PEDICELLI longi, erecti, uniflori.

COROLLAE flavae.

HABITAT in locis aridis prope *Conceptionem Chile*.

FLORET Februario, et Martio.

VERNACULE *Arguenita*.

CALCEOLARIA RUGOSA. ICON. XXVIII. Fig. b.

25. C. foliis lanceolatis bidentatis, petiolis connatis alatis, pedunculis dichotomis multifloris.

CALCEOLARIA (integrifolia). LINN. *Sp. plant. tom. 1. p. 49.*

CALCEOLARIA *Salviae* folio. FEWILL. *Peruv. tom. 3. p. 13. planch. 7.*

PLANTA suffruticosa, pubescens, (*Salviae officinalis* habitu).

CAULIS bipedalis, erectus, infernè ramosus, teres.

FOLIA lanceolata, bidentata, rugosa, subtus venosissima.

PETIOLI connati, alati.

PEDUNCULI terminales axillaresque, dichotomi, multiflori, subcorymbosi.

COROLLA sulphurea.

HABITAT in *Conceptionis Chile* praeruptis, aridis, argillosis et arenosis.

FLORET Februario, et Martio.

VERNACULE *Chachaul*, vulgò *Arguenita*.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem dehiscens.

CALCEOLARIA PULVERULENTA.

26. C. foliis oblongo-lanceolatis dentato-serratis albidis, ramis pulverulentis.

PLANTA suffruticosa.

CAULIS orgyalis, ramosissimus, erectus, teres.

RAMI teretes, erecto-patuli, pulvere canescenti aspersi.

FOLIA breviter petiolata, incana.

PEDUNCULI axillares, solitarii, subquadriflori, foliolum unicum sub binis pedicellis.

COROLLA omnino lutea.

HABITAT in *Cantae* praeruptis.

FLORET Decembri ad Martium.

CALCEOLARIA SCABRA. ICON. XXIX. Fig. a.

27. C. foliis oblongis dentatis venoso-lineatis, caule aspero.

PLANTA suffruticosa, hispido-scabra.

CAULES tripedales, plures, virgati, teretes, scabri, purpureo-ferruginei, ramosi, supernè dichotomi.

RAMI leviter striati, breves, axillares.

FOLIA approximata, subsessilia, oblonga, dentata, rugosa, supra venoso-lineata, patentia, marginibus revolutis.

PEDUNCULI ex axillis superioribus, longitudine foliorum,

solitarii, uniflori, ferè in corymbum dichotomum.

COROLLA lutea, parva.

HABITAT in *Tarmae* et *Muña* praeruptis.

FLORET à Majo ad Augustum.

Explic. Icon. 1 Stamina. 2 Semina aucta. 3 Villi aucti.

CALCEOLARIA CUNEIFORMIS. ICON. XXVII. Fig. b.

28. C. foliis cuneiformibus ovatisque inciso-serratis.

PLANTA suffruticosa, bipedalis, hirsuta.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres, rimosus: cortice secedente.

RAMI brachiati, breves, divisi, supernè dichotomi, scabri, ferruginei, teretes.

FOLIA approximata, petiolata, cuneiformia ovataque, supernè inciso-serrata, supra lineata, hirsuta, subtus tomentosa, incana, marginibus leviter reflexis.

PEDUNCULI terminales, trifidi, corymbosi.

PEDICELLI uniflori.

CALYX quadripartitus; laciniis ovatis, acutis; lutescens.

COROLLA lutea.

SEMINA fulva.

HABITAT in *Cantae* et *Tarmae* alpibus.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Obs. Folia masticata tincturam luteam praebent.

Explic. Icon. 1 Stamina.

CALCEOLARIA LINEARIS.

29. C. foliis linearibus integerrimis subtus albidis, pedunculis unifloris.

PLANTA suffruticosa.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULIS bipedalis, erectus, ramosissimus, teres, lignosus, fragilis.

RAMI consimiles.

FOLIA sessilia, linearia, integerrima, supra nitida, subtus albicantia.

PEDUNCULI axillares, teretes, uniflori, pubescentes.

CALYCES subtomatosi.

COROLLA lutea.

HABITAT in Provinciae *Xauxae* collium declivibus ad *Ocopae* Collegium.

FLORET Julio, et Augusto.

CALCEOLARIA ALBA. ICON. XXVII. Fig. b.

30. C. foliis linearibus denticulatis, racemis longis, floribus umbellatis; umbellis compositis.

PLANTA suffruticosa, viscoso-resinosa, (*Rorismarini* odore).

CAULES plures, virgati, simplicissimi, lignosi, fragiles, teretes, aurei coloris.

FOLIA confertissima, subconnata, linearia, angustissima, (*Pini* habitu) denticulata, margine scabra: plurima ex singulis axillis fasciculata, inaequalia.



RACEMI terminales, subpaniculati, foliosi.

PEDUNCULI axillares, solitarii, longitudine ferè foliorum.

FLORES umbellati: *umbella* composita 3-4phylla: *Foliola* duo sub singulis umbellis et umbellulis.

PEDICELLI intermedii uniflori.

COROLLA alba.

HABITAT copiosè in collibus aridis ventosis *Rere* Provinciae Regni Chilensis, circa fluvium *Biobío*.

FLORET Decembri.

Obs. Folia valde amara.

Explic. Icon. 1 Stamina.

CALCEOLARIA VIRGATA. ICON. XXXI. Fig. a.

31. C. foliis ovatis obtusè serratis, ramis virgatis, pedunculis capillaribus multifloris.

PLANTA suffruticosa, (*Melissae Calaminthae* habitu.)

RADIX fibrillosa.

CAULIS bipedalis, erectus, ramosissimus, teres.

RAMI erecti, virgati, oppositi ternique, inaequales, fragiles: *teneri* subpurpurascens, leviter pubescentes.

FOLIA opposita ternaque, breviter petiolata, patentia, ovata, obtusè serrata, venosissima, obtusa, utrinque pubescentia.

PEDUNCULI dichotomi, filiformes, graciles, pubescentes, quadriflori, saepe 5-8flori: *terminales* terni, quaterni; *axillares* solitarii.

PEDICELLI uniflori, aliquando biflori.

CALYCES pubescentes.

COROLLA parva, lutea, ore punctis purpureis maculata, ad basim villosa, ultra basim lineâ transversali purpureâ.

STYLUS subulatus, curvatus. *Stigma* obsoletè emarginatum.

HABITAT in *Cantae* circuitu.

FLORET per totum ferè annum.

PINGUICULA. LINN. *Gen. pl.* p. 19.

PINGUICULA INVOLUTA. ICON. XXXI. Fig. c.

1. P. nectario conico longitudine petali, scapo unifloro villosa, foliis ovatis, marginibus involutis.

PLANTA annua.

RADIX fibrosa.

SCAPI duo ad octo solitariique, palmares, erecti, apice curvati, filiformes, teretes, villosi, uniflori.

FOLIA depressa, in stellae formam, saepius sex, aliquando 7-10, ovata, integerrima, marginibus involutis, carnossa, subtus castaneae coloris.

FLOS cernuus.

COROLLA violacea. *Faux* villosa.

NECTARIUM conicum, longitudine petali, acutum, curvatum.

HABITAT in altis frigidis et humidis *Pillao*, et *Panao Huassahuassi*, inter Muscos.

FLORET Octobri, Novembri et Decembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina.

UTRICULARIA. LINN. *Gen. pl.* p. 19.

UTRICULARIA APHYLLA. ICON. XXXI. Fig. d.

1. U. Scapo bi-quadrifloro squamis totidem apice furcato. PLANTA annua, cespitosa, aphylla.

RADIX capillaris, utriculis reniformibus, nigris, sinapi seminum ferè magnitudine.

SCAPUS solitarius, nudus, bi-quadriflorus, bi-quadrismatus, filiformis, tenuis, glaber, sesquipalmaris, simplex, apice bifidus; *laciniâ alterâ* longiori ad medium squamatâ.

SQUAMAE ovatae, membranaceae, integerrimae, semiamplexicaules.

COROLLA lutea, nectario conico-subulato: *Labium superius* crenaturis 3-5; *inferius* tribus.

HABITAT in inundatis et humidis *Surco* et *Limae*.

FLORET Decembri, Januario et Febuario.

UTRICULARIA UNIFOLIA. ICON. XXXI. Fig. b.

2. U. Scapo squamato unifloro, calyce maximo cordato. PLANTA annua, unifolia.

RADIX fasciculata: *Radiculae pauciores* filiformes, fibrillosae, longissimae, nonnullis utriculis minimis; *reliquae* tuberosae, oblongae, pendulae, brevissimae.

SCAPUS simplex, ferè pedalis, erectus, teres, glaber, uniflorus; *squamis* tribus, linearibus, alternis, distantibus.

FOLIUM unicum radicale, lanceolatum, integerrimum, subtus venosum, glabrum, longè petiolatum.

PETIOLUS teres.

INVOLUCRUM tetraphyllum: *foliolis tribus* inaequalibus, lanceolatis, angustis, venosis; *altero* subulato, minimo.

FLOS unicus, terminalis.

CALYX maximus; *foliolis* cordatis, integerrimis, venosis-simis.

CAPSULA ovalis.

HABITAT in *Panao* montibus altis.

FLORET Aprili, et Majo.

VERBENA. LINN. *Gen. pl.* p. 20.

VERBENA VIRGATA. ICON. XXXII. Fig. b.

1. V. tetrandra, spicis axillaribus ternis gracilibus, floribus verticillatis, foliis ovatis acutis crenatis.

PLANTA frutescens, biorgyalis, fragrans.

CAULIS erectus, teres, ramosissimus.

RAMI virgati, longissimi, patentiusculi, obsoletè tetragoni.

FOLIA opposita, petiolata, patentia, ovata, acuta, crenata, supra retrorsum scabra, subtus pubescentia, venosissima, rugosa.

INFLORESCENTIA paniculata, plurimis spicis composita.

SPICAE axillares terminalesque, ternae, simplices, graciles, foliis 2-3plo longiores.

FLORES verticillati, quaterni, saepe 3-6ni, sessiles, *bracteis* lanceolatis, acutis, minimis suffulti.

CALYX tubulosus, villosus, profundè bifidus: *laciniis* semibifidis, acutis, subaequalibus, subulatis; inferus, persistens.

COROLLA alba, hypocrateriformis, inaequalis. *Tubus* cylindraceus, incurvus, calyce paulò longior. *Limbus* bilabiatus: *labio superiori* obcordato: *inferiori* tripartito; *laciniis* obcordatis, aequalibus.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, quorum duo brevissima, subulata. *Antherae* ovato-sagittatae.

PISTILLUM: *Germen* ovatum, didymum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum majorum. *Stigma* emarginatum.

PERICARPIUM: *Calyx* immutatus, semina continens.

SEMINA duo, connexa, ovato-oblonga, extus convexa, laevia, intus plana.

Obs. 1. *Haec species* et *V. triphylla* L'heritier inter se congruunt *Foliis* petiolatis non decurrentibus; *Inflorescentiâ* paniculatâ; *Spicis* axillaribus; *Floribus* verticillatis; *Calyce* semibifido: *laciniis* bifidis, subaequalibus; *Stigmate* capitato, obtuso, leviter emarginato; *Seminibus* duobus laevibus. Quibus notis addi potest, suffrutices esse fragrantés, ramosissimos, ramis virgatis, teretibus, superne tantum tetragonis. Ideoque in §. 2. L'heritier collocandae sunt *Verbena* nostra *virgata*, et *V. triphylla*.

Obs. 2. D. L'heritier. fasc. 2. pag. 22. sequentem observationem addidit: „*Inter Verbenas haec species (V. triphylla) cum Verbenâ globiflorâ, staechadifoliâ et nodiflorâ novum §. scilicet tetrandrarum dispermarum cons tituunt. Verbenae itaque ordinandae.*

§. 1. Diandrae dispermae Vid. *Linnaeum*.

§. 2. Tetrandrae dispermae. *V. triphylla, globiflora, staechadifolia, nodiflora.*

§. 3. Tetrandrae tetraspermae. *V. bonariensis, hastata, caroliniana, urticifolia, officinalis, supina, Aubletia.*

Obs. 3. Idem fasc. 2. pag. 24. In Verbenis nonnullis dispermis *Perianthium* immutatur, transitque in *Arillum bipartibilem seu diphyllum*. *V. mexicana, nodiflora, globiflora.*

HABITAT in nemoribus Pozuzo.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla posticè visa. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Pistillum. 6 Semina coadunata. 7 Eadem disjuncta.

VERBENA MULTIFIDA. ICON. XXXIII. Fig. c.

2. *V. tetrandra*, floribus capitato-umbellatis, foliis semi-trifidis: *laciniis* bi-trifidis.

LYCHNIDEA verbenae tenuifoliae folio, vulgò *Sandia Laguen*. FEWILL. Peruv. tom. 3. p. 35. planch. 25.

ERINUS (*laciniatus*) foliis laciniatis. LINN. Sp. pl. t. 3. p. 177.

PLANTA herbacea, inodora, pubescens.

RADIX fibrosa, albicans.

Tom. I.

CAULES plurimi, prostrati, rarissimè radicanter, semipedales, teretes, pubescentes.

FOLIA opposita, sessilia, subtus pubescentia, supra nitida, trifida: *laciniis* linearibus, bi-trifidis, rariùs quadrifidis.

FLORES numerosi, terminales, sessiles, capitato-umbellati, distincti totidem *bracteolis* lanceolato-subulatis, persistentibus, in fructu spicati.

CALYX quinqueangularis, prismaticus, quinquefidus; *laciniis* acutis; *supremâ* paulò breviori.

COROLLA purpureo-carnea, hypocrateriformis. *Tubus* calyce duplò longior. *Limbus* patens, profundè quinquefidus; *laciniis* emarginatis: *duabus superioribus* angustioribus. *Faux* antheris villisque clausa.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, brevissima, quorum duo breviora.

PISTILLUM: *Germen* tetragonum. *Stylus* supernè sensim incrassatus. *Stigma* bilobum: *lobo* altero acuto, supremo obtuso, subrotundo.

SEMINA quatuor, oblonga, intus concava, extus convexa, intra calycem ventricosum, saepius duo abortiunt.

HABITAT in collibus aridis ventosis *Conceptionis Chile*.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE *Sandia-Laguen* nuncupatur.

VIRE ET USUS: Incolae plantae infuso, et decocto aquoso tanquam efficacissimo diuretico et aperitivo frequentissimè utuntur, et partum promoverè, atque urinae ardorem demulcere testantur.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx cum bractea. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Semina.

VERBENA CLAVATA. ICON. XXXIII. Fig. b.

3. *V. tetrandra*, foliis senis quinisque biformibus, floribus capitato-umbellatis, antheris superioribus dorso clavatis.

PLANTA fruticosa, incana, hispidiuscula, procumbens.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULES plures, subpedales, ramosissimi, teretes, infernè nudi, canescentes.

RAMI conferti, cauli similes.

FOLIA sena, quinaque; *alternantia* semifida, cuneiformia, rariùs trifida; *reliqua* integerrima, lineari-lanceolata, marginibus revolutis.

FLORES numerosi, terminales, sessiles, capitato-umbellati.

BRACTEOLA unica, aliquando duae sub singulo flore, lineari-oblongae.

CALYX tubulosus, quinque-angularis, prismaticus, quinquefidus; *laciniis* acutis: *supremâ* paulò breviori.

COROLLA inaequalis, rubro-purpurea, hypocrateriformis. *Tubus* calyce duplò longior, erectus ad calycis longitudinem, postea parum dilatatus, incurvatus. *Limbus* patens, semiquinquefidus; *laciniis* tribus superioribus latioribus, obcordatis: *intermediâ* vix majori: *duabus inferioribus* subrotundis, minoribus.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, subulata, brevissima: duo breviora ad medium tubi inserta, duo infra faucem co-

DIANDRIA MONOGYNIA.

rollae insidentia, omnia inclusa. *Antherae* cordato-sagittatae, biloculares, utrinque dehiscentes, è dorso duarum superiorum *clavâ* prominulâ prodeunte.

GERMEN tetragonum. *Stylus* filiformis, tubi longitudine. *Stigma* bilobum: *lobo superiori* obtuso, incrassato: *inferiori* acuto.

CALYX semina continens.

SEMINA quatuor, oblonga, extus convexa, intus concava.

Obs. *Stigma* aliquando tridentatum.

HABITAT in arenosis *Arica*: unde D. Joannes Tafalla ad nos descriptionem et Iconem transmisit.
FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flôs cum bractea. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Stamen cum clava. 5 Pistillum. 6 Semina.

VERBENA CORYMBOSA. ICON. XXXIII. Fig. a.

4. V. tetrandra, floribus spicatis corymbosis, foliis cordato-triangularibus rugosis profundè serratis.

PLANTA herbacea, hispida; villis setaceis: brevioribus glanduliferis.

CAULIS tetragonus, pedalis, erectus, ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, sessilia, cordato-triangularia, profundè serrata, rugosa, retrorsum scabra, distantia, venosissima.

FLORES terminales, spicati.

SPICAE ternae in corymbum, oblongae.

BRACTEAE lanceolato-subulatae, intus ad basim concavae: unica sub singulo calyce.

CALYX tubulosus, pentagonus, prismaticus, quinquedentatus; denticulis acutis, supremo breviori.

COROLLÂ hypocrateriformis, violacea, extus pubescens. *Tubus* calyce longior, curvatus, fauce dilatatus. *Faux* hispida. *Limbus* quinquefidus; *laciniis* inaequalibus, emarginatis.

STAMINA quatuor, intra tubum corollae. *Antherae* cordatae, biloculares, utrinque dehiscentes. *Stigma* bilobum; *lobo altero* obtuso, subrotundo, breviori.

PERICARPIUM: *Calyx* semina continens, ventricosus.

SEMINA quatuor, oblonga, extus convexa, sulcata, intus parum concava.

HABITAT in *Conceptionis Chile* ruderalis, et agris.

FLORET Novembri, et Decembri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx cum bractea. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Semina.

VERBENA NODIFLORA.

5. V. tetrandra, spicis capitato-conicis, foliis serratis, caule repente. LINN. *Sp. pl. p. 54*.

RADIX fibrosa.

CAULIS ramosissimus, repens, striatus; striis viridibus.

FOLIA sessilia, cuneiformia, apice serrata, lucido-punctata.

SPICAE ovato-conicae, axillares, solitariae, pedunculatae.

PEDUNCULI foliis breviores.

HABITAT copiosè in arvis, cultis et plateis *Limae*, *Chancay* et *Huanuci*.

FLORET per totum ferè annum.

VERBENA OFFICINALIS.

6. V. tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multido-laciniatis, caule solitario. LINN. *Sp. pl. p. 55*.

HABITAT in Provinciis *Limae*, *Chancay* et *Huanuci*.

FLORET per totum ferè annum.

Vulgo *Verbena*.

USUS: Ad mensium obstructions ciendas, et abortum promovendum ab incolis decoctum commendatur.

VERBENA CUNEIFOLIA. ICON. XXXII. Fig. a.

7. V. tetrandra, foliis trifidis; laciniis incisis, spicis ternis oblongis.

PLANTA herbacea, hispida.

CAULIS bipedalis, erectus, tetragonus, internè ramosus.

RAMI saepe trifidi, consimiles.

FOLIA opposita, sessilia, semiamplexicaulia, cuneiformia, semitrifida; laciniis inciso-serratis, utrinque hispidis, retrorsum asperis.

SPICAE terminales, ternae: intermediâ solitariâ, breviter pedunculatâ: lateralibus solitariis ternisque, oblongis, pollicaribus.

BRACTEAE solitariae, lanceolato-subulatae.

CALYX pentagonus, prismaticus, quinquefidus; laciniis acutis: supremâ paulò breviori.

COROLLA hypocrateriformis, caerulea. *Tubus* calyce longior, supernè curvatus. *Limbus* profundè quinquefidus: laciniis subaequalibus, emarginatis. *Faux* subplicata.

FILAMENTA quatuor, brevissima, intra tubum corollae, duo breviora. *Antherae* incurvae.

GERMEN tetragonum. *Stylus* longitudine tubi. *Stigma* bilobum; *lobo superiori* obtuso; *inferiori* acuto, longiori.

CALYX semina continens, ventricosus.

SEMINA quatuor, oblonga, extus convexa, intus concava.

HABITAT in arenosis *Huanuci* Provinciae ad *Mayubamba*.

FLORET Martio, Aprili et Majo.

Vulgo *Verbena*.

Explic. Icon. 1 Calyx cum bractea. 2 Corolla. 3 Calyx semina involvens. 4 Semina.

VERBENA HISPIDA. ICON. XXXIV. Fig. a.

8. V. tetrandra, spicis ternis cylindricis, foliis ovatis oblongisque integris et subtrifidis profundè serratis semiamplexicaulibus.

PLANTA herbacea, hispida, perennis.

RADIX fibrillosa.

CAULES plures, pedales, patentes, tetragoni, ramosi.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, rarius terna, semiamplexicaulia, per petiolum decurrentia, ovata, oblonga lanceolataque, integra subtrifidaque, profundè serrata, aliquando biserrata, venosissima, rugosa.

SPICAE terminales, ternae, cylindricae, erectae, 1-2 pollicares; *intermediae* breviter pedunculatae; *laterales* breviores, longè pedunculatae.

FLORES confertissimi.

BRACTEAE semilanceolatae, ciliatae, calyce longiores, unica sub singulo flore.

CALYX quinqueangulatus, prismaticus, quinquedentatus; *denticulis* acutis, purpureis; *supremo* breviori.

COROLLA monopetala, irregularis. *Tubus* curvatus, calyce longior, purpureus. *Limbus* subcaeruleus, profundè quinefidus; *laciniis* emarginatis.

STAMINA quatuor antherifera.

STIGMA bilobum; *lobo superiori* obtuso: *inferiori* acuto.

CALYX semina continens, ventricosus.

SEMINA quatuor, oblonga, extrorsum convexa, sulcata, intus leviter concava.

HABITAT in arenosis et cretaceis *Huanuci*.

FLORET Martio, et Aprili.

Explic. Icon. 1 Flos cum bractea. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Pistillum. 4 Calyx cum bractea, semina continens. 5 Semina.

VERBENA DICHOTOMA. Icon. XXXIV. Fig. b.

9. V. diandra, spicis longissimis terminalibus et ex dichotomiis, foliis ovatis oblongisque serratis.

PLANTA suffruticosa.

RADIX fibrosa, albidula.

CAULIS tripedalis, erectus, infernè teres, parum ramosus.

RAMI brachiati, dichotomi, supernè secundum articulationes compressi; articulationibus hispidis.

FOLIA opposita, petiolata, ovata oblongaque, acuta, venosa, subtus hispidula, serrata; serraturis acuminatis.

SPICAE longissimae, pedales, solitariae, terminales et ex dichotomiis, arcuatae, subulatae.

FLORES conferti, adpressi; *bracteolâ* subulatâ, calycis longitudine, persistenti stipati.

CALYCES prismatici, pentagoni, quinquedentati; *denticulis* duobus *lateralibus* longioribus.

STIGMA peltatum, bilobum.

SEMINA duo, extus striata.

HABITAT in silvis *Cuchero* et *Chinchao*.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteola. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Calyx semina involvens. 6 Eadem connexa. 7 Eadem disjuncta.

SALVIA. LINN. Gen. pl. p. 23.

SALVIA SAGITTATA. Icon. XXXV. Fig. a.

1. S. foliis sagittatis crenatis acutis.

PLANTA perennis, viscosa, hirsuta, villosa: *villi* longiores

setacei, articulati; *breviores* glandulâ terminati.

CAULIS orgyalis, erectus, tetragonus, infernè ramosissimus.

RAMI divisi, brachiati, tetragoni, sulcati, saepe erecti; alioquin procumbentes, radicales.

FOLIA longè petiolata, deflexa, sagittata, acuta, hinc acutè crenata, inde crenato-serrata, aliquando subhastata, rugosa, venosissima, aspera.

RACEMI terminales, magni, compositi, brachiati, erecti.

FLORES oppositi, breviter pedicellati, reflexi; *bracteolis* lanceolatis, caducis suffulti.

CALYCES purpureo-violacei, trifidi; *laciniis* ovatis; *superiori* longiore, latiore, ovatâ, concavâ, tridentatâ.

COROLLA obscure caerulea, extus hirsuta, calyce quadruplò longior: *labio inferiori* propendente, majori.

FILAMENTA et *Antherae* caeruleae.

Obs. Semen unicum frequenter adolescit, et corpori glanduloso insidet.

HABITAT copiosè in hortis, versuris et ruderatis *Tarmae*, *Huarocheri* et *Huanuci*.

FLORET Majo, et Junio.

VULGO: *Salvia Real*.

Obs. Incolae *Salviae officinalis* loco hanc Speciem substituant.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina. 3 Pistillum. 4 Semen in receptaculo.

SALVIA CUSPIDATA. Icon. XL. Fig. b.

2. S. foliis cordato-sagittatis inaequaliter serratis, spicis longis, verticillis multifloris remotis, calycibus cuspidatis.

PLANTA suffruticosa, orgyalis.

CAULIS erectus, ramosus, obtusè tetragonus.

RAMI brachiati, tetragoni, pubescentes; *villi* in minimas congeries dispositi, albid.

FOLIA breviter petiolata, cordato-sagittata, angulis posticis, obtusis, inaequaliter serrata, rugosa, venosissima, subtus punctis miniatis adpersa.

SPICAE terminales; *intermedia* longissima.

FLORES verticillati, breviter pedicellati: *verticilli* 6-10 flori, remoti.

BRACTEAE oppositae, ovatae, acuminatae, concavae, deciduae, punctatae.

CALYX bilabiatus, obscure caeruleus, punctatus, extus hirsutus, punctis incarnatis adpersus, intus scaber: *labio superiori* tricuspidato; *cuspidè intermediâ* longiori: *labio inferiori* bifido, acuminato.

COROLLA caerulea, calyce duplò longior.

HABITAT in *Cheuchin* collibus.

FLORET Aprili, et Majo.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina.

SALVIA LONGIFLORA. Icon. XL. Fig. a.

3. S. foliis cordatis acutissimis bicrenatis, spicis longis nuntantibus, bracteis calycibus coloratis, corollis longissimis.

PLANTA fruticosa, pubescens, viscosa.

CAULIS subtriorgyalis, erectus, ramosissimus, hispidus: *villi longiores* setacei, articulati; *breviores* laeves, glandulâ terminati.

RAMI erecto-patentes, tetragoni, viscosi, pubescentes.

FOLIA petiolata, patentia deflexaque, cordata, acutissima, longa, duplicato-crenata, rugosa, subtus venosa, hirsuto-tomentosa.

PETIOLI pubescentes, viscosi.

SPICAE terminales, longae, nutantes.

FLORES verticillati, pedicellati: *Pedicelli* teretes, inaequales, calyce duplò breviores.

VERTICILLI 1-4 flori; *bracteis duabus* oppositis, ovatis, acutis, concavis, coloratis, deciduis sustentati.

CALYX ovatus, inflatus, coloratus: *labio inferiori* bifido; *superiori* integro, acuto.

COROLLA longissima, calyce quintuplò longior, extus hirsuta, Laccae coloris: *labio superiori* integro, falcato; *inferiori* brevi, trifido; *laciniâ mediâ* concavâ. *Faux* stricta.

STAMINA longitudine corollae.

GLANDULA turgida, receptaculo ad latus labii superioris insidens.

HABITAT in praeruptis profundis *Tarmae* ad *Huichay* praedium.

FLORET Januario, et Febuario.

Explic. Icon. 1 Stamina. 2 Villi aucti.

SALVIA INCURVATA. ICON. XLII. Fig. b.

4. S. foliis cordatis acutis serratis, labiis calycis incurvis, galeâ corollae bifidâ.

PLANTA herbacea.

CAULIS bipedalis, erectus, tetragonus, supernè ramosus.

RAMI erecti, tetragoni.

FOLIA longè petiolata, deflexa, cordata, acuta, serrata, venosissima, rugosa, subtus levissimè pubescentia, sub-incana.

PETIOLI foliis dimidiò breviores.

SPICAE terminales, erectae, bipalmes.

FLORES verticillati, breviter pedunculati.

VERTICILLI 4-6 flori, patentes; *bracteolis* ovatis, deciduis stipati.

CALYCES tubuloso-campanulati: *labiis* incurvis, acutis: *superiori* integro; *inferiori* bifido.

COROLLA calyce duplò longior, purpureo-caerulea: *labio superiori* concavo, bifido; *inferiori* obtusè trifido; *laciniâ mediâ* emarginatâ.

HABITAT in circuitu *Muñia*.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina.

SALVIA ACUTIFOLIA. ICON. XXXVIII. Fig. b.

5. S. foliis cordatis acutis obtusè serratis, spicis verticillatis.

PLANTA orgyalis, fruticosa.

CAULIS erectus, obtusè tetragonus, ramosus.

RAMI oppositi, erecti, tomentosi, obtusè tetragoni, sulcati.

FOLIA petiolata; cordata, acuta, obtusè serrata, aliquando duplicato-serrata, serraturis approximatis, supra rugosa, utrinque tomentosa, venosissima.

SPICAE terminales, verticillatae.

VERTICILLI 6-12 flori, approximati.

FLORES breviter pedunculati, secundi.

BRACTEAE oppositae, ovato-lanceolatae, acutae, carinatae, caducae, tomentosae.

CALYX tomentosus, intus scaber, bilabiatus, aequalis; *labio superiori* integro; *inferiori* bifido.

COROLLA purpurea, calyce duplò longior.

STAMINA corollae longitudine. *Stigma* bifidum, villosum, exsertum.

HABITAT copiosè in *Cheuchin* pratis et humidis.

FLORET Martio, et Aprili.

VERNACULE *Socconcha*.

Explic. Icon. 1 Stamina.

SALVIA BIFLORA. ICON. XXXVIII. Fig. a.

6. S. foliis cordatis serratis tomentosis, spicis erectis, floribus secundis binis.

SALVIA (*tubiflora*) foliis cordatis crenatis subpilosis, calycibus trifidis, corollis longissimis tubulosis, staminibus exsertis. SMITH *fascic. 2. p. 26. Ic. 26?*

PLANTA suffruticosa, villosissima.

RADIX ramosa.

CAULIS bipedalis, erectus, ramosus, obtusè tetragonus, striatus.

RAMI patentes, consimiles.

FOLIA petiolata, cordata, profundè serrata, patentia; serraturis cum brevi acumine, supra pubescentia, subtus venosissima.

SPICAE terminales, erectae, bipalmes.

FLORES oppositi, solitarii, secundi, breviter pedunculati, *bracteis* ovato-lanceolatis, acutissimis, nervosis, deciduis suffulti.

CALYX tubulosus, parum ventricosus, trifidus, extus villosus, 12 nervis, intus scaber.

COROLLA coccinea, tubulosa, extus hirsuta, calyce triplò longior, bilabiata: *labio superiori* productiore, integerimo, acuto; *inferiori* trifido: *laciniâ mediâ* concavâ; *lateralibus* parvis.

STAMINA *Stylusque* coccineus, exsertus. *Stigma* bifidum.

HABITAT in montibus arenosis *Huaura* in Provincia *Chancay*.

FLORET Septembri, et Novembri.

Explic. Icon. 1 Stamina.

SALVIA ACUMINATA. ICON. XXXVII. Fig. b.

7. S. foliis cordatis serratis acuminatis, spicis terminalibus, floribus verticillatis, corollâ calyce duplò longiori.

PLANTA perennis, hirsuta, viscosa.

CAULIS orgyalis, erectus, ramosus, tetragonus, sulcatus.

RAMI consimiles, brachiati, assurgentes.

FOLIA opposita, longè petiolata, ampla, patentia, acuminata, subtus venosissima, rugosa, serrata; serraturis acuminatis.

SPICAE terminales, longae, erectae.

FLORES verticillati, pedunculati.

PEDUNCULI inaequales.

VERTICILLI sex-decemflori.

BRACTEAE oblongo-obovatae, acuminatae, oppositae, incarnatae, longitudine calycis, caducae.

CALYX tubulosus, nervosus, bilabiatus; *labio superiori* integro, acuto; *inferiori* bifido, acuto.

COROLLA calyce duplò longior, incarnata.

STAMINA longitudine corollae. *Stylus* exsertus.

HABITAT in praeruptis *Pillao* et *Cantae*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Stamina.

SALVIA NODOSA. ICON. XLI. Fig. a.

8. S. foliis cordatis superioribus ovatis deltoideisque serratis, pedunculis axillaribus nodosis, galeâ hirsutâ.

SALVIA (*formosa*) L'HERITIER fasc. 3. p. 41. tab. 21.

PLANTA frutescens, suborgyalis, fragrans.

CAULIS erectus, ramosus, internè nodosus, teres, subcinerus, rimosus.

RAMI patentes, brachiati, tetragoni, quadrisulcati, articulationibus nodosi, rufescentes, viscosi.

FOLIA longè petiolata, approximata, deflexa, acuta, serrata, in hortis obtusiora et serrato-crenata; venosissima, viscoso-resinosa, subtus reticulata; *inferiora* cordata; *superiora* ovata deltoideaque.

PETIOLI foliis ferè dimidio breviores, supernè canaliculati.

FLORES axillares, 3-7, subverticillati, breviter pedunculati.

PEDUNCULI inaequales, apice nodosi, uniflori, patuli, in fructu cernui.

BRACTEAE lineares, parvae, concavae, reflexae, deciduae; *duae exteriores* majores, lanceolatae.

CALYX viscoso-resinosus, 12nervis, basi angustatus, striatus, internè nitidus, laevis, bilabiatus: *labio superiori* ovato, acuminato; *inferiori* bifido; *laciniis* ovatis, acuminatis.

COROLLA coccinea, calyce duplò longior. *Tubus* compressus, basi albus. *Faux* biplicata. *Limbus* bilabiatus: *labio superiori* recto, leviter emarginato, galeato, pubescenti, marginibus involutis, stamina stylumque amplexantibus: *labio inferiori* trifido; *laciniis lateralibus* deflexis, pubescentibus; *intermediâ* latiori, emarginatâ.

ANTHERAE lineares, uniloculares, incumbentes, margine coccineae. *Rudimenta* Filamentorum *duo*, brevissima, alba, coarctationi tubi inserta.

STYLUS utrinque hirsuto-plumosus, apice coccineus. *Stigma* glabrum, bifidum; alterâ *laciniâ* longiori.

Tom. I.

SEMINA quatuor, oblonga, compresso-trigona, corpori glanduloso quadridentato insidentia.

HABITAT in arenosis, argillaceis petrosisque *Huanuci*.

FLORET per totum ferè annum, praesertim Majo et Junio.

VERNACULE Socconcha.

VIRES ET USUS: Incolae ad dentium dolores sedandos folia mandunt. Decoctum tepidum in nervorum laxitate mirificè prodest.

Obs. Triviali nomini *formosae* nomen *nodosae* subrogavimus, quoniam illud pluribus Speciebus quadrat, hoc nulli praeter nostram.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum.

SALVIA EXCISA. ICON. XXXVI. Fig. a.

9. S. foliis cordatis obtusis basi inaequalibus serratis, spicis nutantibus, floribus oppositis binis verticillatisque.

PLANTA bipedalis, herbacea, viscosa, hirsuta. *Villi* caulis et calycum inaequales; *glandulâ* terminati.

CAULIS erectus, internè ramosus, obtusè tetragonus.

RAMI virgati, tetragoni.

FOLIA petiolata, cordata, obtusa, serrata; serraturis obtusis, cum brevi acumine, rugosa, supra aspera, subtus hirsuta, venosissima, basi inaequaliter excisa; *nonnulla* basi aequalia.

SPICAE terminales, longissimae, apice cernuae.

FLORES breviter pedunculati, secundi, saepius bini, oppositi; aliquando 4-5-6 in verticillos, bracteis duabus suffultos.

BRACTEAE lanceolatae, concavae, coloratae, deciduae.

CALYCES 12striati: *labio inferiori* bifido: *superiori* integro; *laciniis* acutis.

COROLLA calyce triplò longior, coccinea, extus hirsuta: *labium inferius* brevius, trifidum; *laciniâ intermediâ* concavâ.

STAMINA exserta.

STYLUS longitudine staminum.

HABITAT in *Peruviae* montibus arenosis, vulgò *Lomas*, in *Camanae* Provincia ad *Atiquipa* oppidum.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Pars corollae cum staminibus. 3 Pistillum.

SALVIA RACEMOSA.

10. S. foliis cordatis acutis sublanceolatis serratis, racemis terminalibus compositis, bracteis ovatis acuminatis.

PLANTA suffruticosa, hirsuta.

CAULIS erectus, ramosus, internè nudus, subteres.

RAMI brachiati, tetragoni.

FOLIA longè petiolata, cordata, acuta, sublanceolata, serrata, saepius colore purpureo, livido maculata.

RACEMI terminales, plurimis spicis compositi.

FLORES verticillati, breviter pedunculati, ante explicatio-

nem obteci *bracteis* ovatis, acuminatis, coloratis, ca-
ducis.

COROLLA obscurè caerulea.

HABITAT in versuris et ruderatis *Huanuci*.

FLORET Decembri, Januario et Februario.

SALVIA RHOMBIFOLIA. ICON. XXXVI. Fig. b.

11. S. foliis rhombeis cordatisque serratis, spicis terminali-
bus ternis, verticillis 4-8floris.

PLANTA herbacea, hirsuta. Villi microscopio visi articulati.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULIS pedalis, erectus.

RAMI brachiati, livido-purpurei.

FOLIA inferiora rhombea, petiolata; superiora cordata, bre-
viter petiolata; omnia obtusè serrata, venosa, utrinque
hirsuta.

SPICAE terminales; ramorum ternae, erectae, foliosae, bre-
ves; intermediâ longiori: caulium solitariae, aphyllae,
ceteris longiores.

FLORES breviter pedicellati, verticillati.

VERTICILLI approximati, 4-6flori, rariùs octoflori.

BRACTEAE duae, oppositae, lanceolatae, deciduae.

CALYCES subviolacei, viscosi; labio superiori longiori, in-
tegro; inferiori bifido, acuto.

COROLLA violacea, calyce triplò longior, extus hirsuta, fau-
ce plicata.

SEMINA triquetra, venoso-reticulata.

HABITAT in Peruviae collibus arenosis (*Lomas de Atiqui-
pa* et *Pongo* dictis) in *Camanae* Provincia, et etiam co-
piosè in altis *Chancay* venit.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina. 3 Pistillum. 4 Semina.

SALVIA PLUMOSA. ICON. XXXVII. Fig. a.

12. S. foliis subcordatis acutis crenatis, pedunculis 4-5
axillaribus unifloris, stylo plumoso.

PLANTA frutescens, subtomentosa; tomento ferrugineo.

CAULIS orgyalis, erectus, ramosus.

RAMI teneri lanuginosi, tetragoni, brachiati.

FOLIA petiolata, subcordata, acuta, crenata, venosissima,
rugosa, subtus leviter lanuginosa.

FLORES axillares, verticillati, pedunculati.

PEDUNCULI 3-4, frequentius 5, teretes, uniflori, petiolis
longiores, bracteolis totidem subulatis, aliquando ovatis
suffulti.

CALYX bifidus, nervosus, tubulosus, intus scaber.

COROLLA purpurea, extus hirsuta, calyce duplò longior:
labiis aequalibus; superiori emarginato; inferiori trifido.

STYLUS hirsuto-plumosus, purpurascens.

HABITAT in *Tarmae* Provinciae praeruptis, imis locis, ad
Huassa-huassi vicum.

FLORET Octobri, et Novembri.

SALVIA INTEGRIFOLIA. ICON. XXXV. Fig. b.

13. S. foliis ovatis integerrimis aveniis subrepandis, spicis

brevibus, corollis longis, staminibus exsertis.

PLANTA fruticosa, bipedalis, glabra.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres, cinereus, nudus.

RAMI teneri tetragoni, viscoso-resinosi, nitidiusculi, sub-
purpurei, foliosi.

FOLIA petiolata, erecta, ovata, obtusa acutaeque, integer-
rima, avenia, viscoso-resinosa.

SPICAE terminales, breves, solitariae.

FLORES verticillati, breviter pedunculati.

VERTICILLI quadri-sexflori.

BRACTEAE lanceolatae, acutae.

CALYX tubulosus, viridis, 12 nervis, internè asper; labio
superiori integerrimo; inferiori bifido.

COROLLA calyce triplò longior, croceo-lutea, tubulosa, an-
gusta, extus villosa, villis articulatis: galea emargina-
ta: labium inferius leviter trifidum: laciniis lateralibus
subrotundis; intermediâ ovatâ, acutâ, integerrimâ.

STAMINA exserta. Antherae lineares, uniloculares, incum-
bentes.

STYLUS glaber, staminibus longior.

SEMINA quatuor, trigona, ex fulvo et albo colore variegata,
nitida, corpori glanduloso quadridentato insidentia.

HABITAT in Peruvia ad *Caxatambo* Provinciam juxta aquas
thermales *Cheuchin*, et inter rupes.

FLORET Junio, et Julio.

VERNACULE *Socconcha*.

VIRES ET USUS. Decoctum contra Pleuritidem et Haemop-
thisim specificum est.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina. 3 Pistillum.

SALVIA OPPOSITIFLORA. ICON. XLIII. Fig. a.

14. S. foliis ovatis crenatis rugosis, spicis terminalibus, flo-
ribus oppositis.

PLANTA suffruticosa, gratissimo odore praedita.

CAULIS bipedalis, erectus, ramosus.

RAMI tetragoni, brachiati.

FOLIA petiolata, ovata, obtusa, crenata, rugosa.

SPICAE terminales.

FLORES oppositi, solitarii, pedunculati.

COROLLA coccinea, extus pubescens, calyce quadruplò lon-
gior.

HABITAT in locis altis, aridis et ventosis *Tarmae* oppidi.

FLORET Majo, et Junio.

VERNACULE *Chenchelcoma*.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina. 3 Pistillum cum glan-
dula. 4 Semina.

SALVIA VIOLACEA. ICON. XLIII. Fig. b.

15. S. foliis ovatis crenatis, floribus spicatis, verticillis sex-
floris, labio corollae dependente.

PLANTA bipedalis, herbacea, hirsuta, annua.

RADIX fasciculata, fibrosa.

CAULIS erectus, ramosus, tetragonus.

RAMI consimiles.

FOLIA ovata, crenata, rugosa, obtusa.

SPICAE terminales, breves, erectae.

FLORES verticillati, seni, breviter pedicellati, bracteis oppositis, ovatis, concavis stipati.

COROLLA caeruleo-violacea, calyce triplò longior; labio inferiori lato; galea longiori, dependente.

HABITAT in Tarmae Provinciae praeruptis calidis.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina. 3 Pistillum cum glandula. 4 Semina.

SALVIA MITIS.

16. S. foliis ovatis acutis serratis tomentosis, spicis terminalibus, intermedià longiori aphyllà, verticillis multifloris.

PLANTA suffruticosa, bipedalis.

CAULIS erectus, ramosus, brachiatus, tetragonus, sulcatus.

RAMI consimiles, leviter pubescentes, mitissimi.

FOLIA petiolata, ovata, acuta, serrata, rugosa, venosissima, tomentosa, subtus incana.

SPICAE terminales; intermedià longiori, aphyllà.

FLORES verticillati, secundi, pedicellati.

VERTICILLI sex-duodecimflori.

BRACTEAE oppositae, ovales, acuminatae, pubescentes, caducae.

CALYCES bilabiati, 12 nerves, pubescentes, subcampanulati, supernè lividi: labio superiori integro, acuto, breviori, parum incurvo: inferiori bifido, acuto.

COROLLA albo-caerulea, calyce paulò longior, extus pubescens.

STAMINA longitudine corollae.

STYLUS supernè villosus. Stigmata exserta.

SEMINA trigona, venosa, fulva.

HABITAT in praeruptis calidis Cantae Provinciae ad Obrajillo vicum.

FLORET Januario, Febuario et Martio.

SALVIA PROCUMBENS. ICON. XXXIX. Fig. a.

17. S. foliis ovatis elliptico-lanceolatisque serratis, caule ramosissimo nodoso radicante, spicis gracilibus assurgentibus.

PLANTA perennis, radicans, foetida.

CAULIS infernè ramosissimus, procumbens, tetragonus, striatus, supra articulationes geniculatus, radicans.

RAMI leviter pubescentes, subpurpurei, ascendentes, divisi, cauli similes, graciles.

FOLIA petiolata, elliptico-lanceolata ovataque, acuta, supernè serrata, venosissima, glabra, reflexa.

SPICAE terminales, assurgentes, longae, graciles; ramulorum solitariae; caulis ternae; intermedià longissima.

VERTICILLI remoti, multiflori, bracteolis duabus oppositis, ovatis, acutis sustentati.

FLORES breviter pedicellati, minimi.

CALYX pubescens, viscosus; villis glanduliferis, bilabiatus: labium superius integrum, subrotundum: inferius bi-

partitum, acutum.

COROLLA calyce duplò longior. Tubus albus: Labium inferius caeruleum, trifidum: lacinià medià productioni, emarginatà: Labium superius album, subrotundum, integerrimum.

SEMINA subrotunda; duo aut tria saepe abortiunt.

HABITAT copiosè in versuris et ruderalis Limae, Chancay et Huanuci.

FLORET per totum annum.

VULGO: Yerba del Gallinazo et Moradilla.

VIRES ET USUS: Peruviani decocto et infusione ad obstructiones et icterum utuntur.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina, 3 Pistillum.

SALVIA PUNCTATA. ICON. XXXIX. Fig. b.

18. S. foliis ovato-oblongis serratis, spicis multifloris, calyce punctato, labio superiori tricuspidato.

PLANTA suffruticosa, foetida (vulpino odore) ferruginea, supernè hirsuta: villi glanduliferi.

CAULIS tripedalis, erectus, ramosus, infernè nudus, obsolete tetragonus, fragilis.

RAMI brachiati, geniculati, erecti, pubescentes, purpurascens.

FOLIA petiolata, ovato-oblonga, è medio ad apicem serrata, patentia, rugosa, venosissima; nonnulla ex junioribus integerrima, subtus magis pubescentia, supra viscosa.

PETIOLI foliis breviores.

SPICAE longae, terminales, erectae, solitariae, hirsutae, viscosae.

FLORES breviter pedicellati, verticillati.

VERTICILLI sex-duodecimflori.

BRACTEAE oppositae, ovatae, acuminatae, deciduae.

CALYX violaceo-caeruleus, campanulatus, hirsutus, viscosus, punctis glandulosis adpersus, bilabiatus; labium inferius bifidum, acutum; superius tricuspidatum, vix longius.

COROLLA calyce triplò longior, extus pubescens, alba, saepe lutescens et violaceo-alba.

STYLUS plumosus.

HABITAT in collibus altis Huanuci.

FLORET Majo, et Junio.

VERNACULE Añascachu, id est Yerba Zorrina, seu Herba vulpina.

Explic. Icon. 1 Stamina.

SALVIA GALEATA. ICON. XLII. Fig. a.

19. S. foliis ovalibus serratis, calycis labio superiori galeato, corollae labio superiori convoluto.

PLANTA fruticosa.

CAULIS tripedalis, ramosissimus, brachiatus; infernè subtus, nudus.

RAMI brachiati, tetragoni, post exsiccationem ferruginei.

FOLIA sessilia, deflexa, ovalia ovataque, serrata, venosissima, rugosa, aspera, leviter pubescentia.

SPICAE terminales, ternae, erectae: intermedià longiori.

FLORES verticillati, breviter pedicellati.

VERTICILLI 6-12 flori, patentes; bracteolis duabus ovatis, oppositis, caducis stipati.

CALYX ringens, supernè dilatatus, ventricosus: *labio inferiori* concavo, bifido, inflexo; *superiori* concavo, galeato, majori.

COROLLA albo-violacea, calyce duplò longior: *labio inferiori* trifido; *laciniis* ovatis: *superiori* angusto, infernè convoluto, supernè patulo, stamina stylumque involvente.

HABITAT in circuitu *Muña* locis aridis.

FLORET mensibus Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina.

SALVIA REVOLUTA. ICON. XLI. Fig. b.

20. S. foliis lineari-lanceolatis crenatis, floribus spicatis, verticillis secundis.

PLANTA fruticosa, tomentosa.

CAULIS erectus, subtripedalis, ramosissimus, teres, fuscus, glaber, infernè scaber, rimosus.

RAMI virgati, oppositi, densi, obtusè tetragoni, tomentosi.

FOLIA breviter petiolata, lineari-lanceolata, crenata, rugosa, marginibus revolutis, venosissima; venis supernè profundis.

SPICAE terminales, solitariae, subpalmares, erectae.

FLORES verticillati, breviter pedunculati, secundi.

VERTICILLI quadri-sexflori.

BRACTEAE ovato-lanceolatae, caducae.

CALYX tubulosus, nervosus, bilabiatus; *labio superiori* integro, ovato, concavo; *inferiori* bifido, acuto: extus densè tomentosus, aliquando subviolaceus, intus asper.

COROLLA calyce duplò longior, albo-violacea, extus tomentosa: *labio inferiori* trifido; *laciniis* lateralibus, brevibus, revolutis; *intermediâ* majori, emarginatâ.

STYLUS supernè hirsutus.

HABITAT in praeruptis *Cantae*.

FLORET Januario, et Februario.

Obs. Sudante jam praeloprodiit in lucem Clar. Ortega *No-var. aut rarior. Plant. Decas quinta, et sexta*, in quarum limine *Salviae virgatae* nomini quod cuidam Speciei in prima Decade imposuerat, *S. linearis* nomen subrogandum monet, ne sua cum Clar. Jacquini *Salviâ virgatâ*, confunderetur. Quamobrem nos quoque hanc *Salviam*, quam in Icone *S. linearem* appellaveramus, *S. revolutam* vocare necessarium duximus.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina.

COLUMELLIA. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 3. ICON. I.

COLUMELLIA OBLONGA. ICON. VIII. Fig. a.

1. C. foliis oblongis supernè serratis, floribus corymbosis. ARBOR quadriorgyalis.

TRUNCUS erectus, ramosissimus.

RAMI brachiati, teretes, cortice squamato cinereo vestiti, infernè nudi.

FOLIA conferta, petiolata, oblonga, supernè serrata, supra glabra, nitida, subtus pubescentia, albicantia.

FLORES terminales, corymbosi.

PEDUNCULI trifidi: *Pedicelli* uniflori, bifolii: *foliola* opposita, lanceolata, decidua.

COROLLA lutea: *laciniis* concavis.

HABITAT in silvis *Pillao*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VIRES ET USUS: *Folia* amarissima stomachicâ virtute pol-
lent. Ad febres intermittentes depellendas foliorum decocto, aut infuso, aut eisdem in pulverem redactis Indi utuntur. Ex Ligno valde duro manubria et alia utensilia faciunt.

Explic. Icon. 1 Corolla anticè cum staminibus visa. 2 Pistillum. 3 Capsula calyce coronata. 4 Eadem naturaliter dehiscens. 5 Eadem clausa, à valvulis exterioribus et calyce libera. 6 Valvulae interiores anticè visae. 7 Semina. 8 Receptaculum.

COLUMELLIA OBOVATA. ICON. XII. Fig. b.

2. C. foliis obovatis serrato-dentatis integrisque, pedunculis uni-trifloris.

FRUTEX octopedalis.

TRUNCUS ramosissimus, erectus, teres.

RAMI brachiati.

FOLIA confertissima, sessilia, obovata, subtus incana, supra concava, nitida, glauca, reliqua integerrima: *majora* serrato-dentata.

FLORES terminales, breviter pedicellati, uni-triflorique. *Foliola duo* sub singulis pedunculis trifloris, opposita, lineari-subulata, decidua; *duo altera* sub calyce.

COROLLA lutea: *laciniis* patentibus.

HABITAT copiose in collibus aridis *Tarmae*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

VERNACULE *Ulux*.

VIRES ET USUS: Sapore amarissimo universa planta gaudet. Indi infuso decoctoque foliorum ad febres intermittentes profligandas, stomachumque roborandum non sine fructu utuntur. Ligna ad cibos coquendos in culinis comburunt.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Capsula cum calyce. 6 Capsula dehiscens. 7 Semina. 8 Folia anticè et posticè visa.

MARGYRICARPUS. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. pag. 7. ICON. XXXIII.

MARGYRICARPUS SETOSUS. ICON. VIII. Fig. d.

1. M. foliis impari pinnatis, foliolis linearibus, floribus axillaribus sessilibus.

PLANTA suffruticosa, procumbens.

CAULIS pedalis, ramosissimus, teres, obscuro-fuscus, intortus.

RAMI consimiles.

FOLIA imbricata, alterna, petiolata, impari-pinnata: *foliola*

linearia, setis 1-3 deciduis terminata, supra nitida, subtus albicantia, marginibus reflexis: *intima* minora.

PETIOLI vaginantes, membranaceo-alati, ciliati, paleacei.

FLORES axillares, sessiles.

BRACTEOLAE *duae* sub singulo flore, oppositae, ovatae, acutae, ciliatae, paleaceae, persistentes.

DRUPA alba, parum carnosa, margaritaeformis.

HABITAT in collibus aridis et frigidis locis Provinciarum *Tarmae, Xauxae, Huamalies, Huarocherí, Conchucos*, arenosisque *Regni Chilensis*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VULGO *Yerba de la Perilla*, ob fructuum similitudinem cum margaritis.

VIRES ET USUS: Incolae ad sanguinis aestum coercendum decoctum, et infusionem adhibent. Pueri autem fructuum succum dulcem, et gratum avidè exsugunt.

Explic. Icon. 1 Bracteolae. 2 Flos. 3 Calycis laciniae. 4 Stamina. 5 Pistillum cum calyce. 6 Drupa. 7 Nux. 8 Nucleus. 9 Folium auctum.

GUNNERA A. LINN. Gen. pl. p. 607.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. Amentum thyrsoides, compositum plurimis partialibus, confertis, cylindricis; *spathis* lanceolatis, marcescentibus suffultis; *flosculis* sessilibus, nudis tectis.

Perianthium: Margo superus, bidentatus, marcescens: *denticulis* acutis.

COR. nulla.

STAM. Filamenta duo, filiformia, brevia, inter perianthium et germen receptaculo inserta, denticulis alternantia. Antherae ovatae, tetragonae, didymae.

PIST. Germen inferum, subrotundum. Stylus bipartitus, brevis. Stigmata acuta.

PER. Drupa subrotunda, parum carnosa, è crustâ perianthina formata, coronata.

SEM. unicum, globosum.

Obs. Gunnerae Genus ex Gynandria Classe, cui Linnaeus illud inseruit, ad Diandriam retulimus ob staminum situm in receptaculo, quo accedit universa fructificatio et habitus ab Orchideis sanè distinctus.

GUNNERA SCABRA. ICON. XLIV. Fig. a.

1. G. foliis lobatis, petiolis granulosis, thyrsis magnis.

PANKE Anapodophylli folio. FEWILL. *Peruv. tom. 2. p. 741. planch. 30.*

PANKE tinctoria. MOLINA *Comp. Hist. nat. Regn. Chil. t. 1. p. 150.*

PLANTA perennis, succosa, scabra: dum tenera mucilagine crystallino abundat.

RADIX maxima, ferè ulnaris, femoris crassitie, simplex, bitrifida, fibrillosa, extus fusca, intus alba, solida.

SPATHA radicalis, magna, multipartita: *laciniis* ramoso-multifidis herbam teneram involvens, marcescens.

Tom. I.

FOLIA radicalia, amplissima, 5-11 lobata, nervosa, venosissima, scabra, utrinque rugosa, supra hispida: *lobis* laciniatis, dentatis.

PETIOLI longi, teretes, purpurei, granulis elevatis, acuminè uncinato terminatis.

SCAPUS 2-6 pedalis, erectus, teres, granulosis, purpureus.

THYRSUS longus, compositus plurimis amentis confertis, subverticillatis, *spathis* lanceolato-subulatis suffultis.

ANTHERAE magnae, purpureae.

DRUPAE croceae, milii magnitudine.

HABITAT in stagnatis, scaturientibus, paludibus et uliginosis *Conceptionis Chile*, et in *Muña* vico Regni Peruviani.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE *Panke* et *Pangue*. Petioli teneri *Nalcas*; adulti verò *Raguayes* ab Incolis nuncupantur.

VIRES ET USUS: Incolae petiolos teneros à cortice mundatos, jucundè comedunt. *Mucilago* plantae tenerae dorso et renibus applicitus, febrium ardores compescit. Radicis decoctum interius propinatum diarrhoeas et haemorrhagias sistit. Coriarii ad pelles concinnandas loco *Rhuis coriariae* radice utuntur, et tinctorum hac ipsa cocta cum terra nigra, *Robo* nuncupata, illas nigro colore inficiunt.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Idem auctus. 3 Drupa. 4 Semen.

PEPEROMIA. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 8. ICON II.

PEPEROMIA SCUTELLAEFOLIA. ICON. XLIV. Fig. b.

1. P. radice tuberosa, foliis peltatis scutellaeformibus nervosis, scapo erecto.

RADIX tuberosa, globosa, undique fibrillosa.

SCAPUS filiformis, supernè incrassatus, erectus, sesquipalmaris.

FOLIA radicalia, longè petiolata, peltata, ovata, concava, in scutellae formam, integerrima, 5-7 nervia, glabra, supra punctata, subtus purpurascens.

PETIOLI teretes, purpurascens.

FLOSCULI spicati, distantes, squamâ ovatâ, concavâ, carnosâ stipati.

HABITAT in *Peruviae* collibus ad *Atiquipa*, ubi Joannes Tafalla descripsit et delineavit.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Squama. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Drupa.

HABITUS.

Omnes hujus Generis Species herbaceae, carnosae, plus minusve fragrant. *Caules* aut *Scapi* enodes, erecti, scandentes, aut repentes. *Folia* integerrima. *Spadices* axillares, vel terminales, ad basim foliorum aut in scapo; solitarii, vel gemini, aggregati aut paniculati. *Color* ruber in omnibus ferè speciebus frequens; post exsiccationem roseo colore papyrum tingunt.

Obs. In Peperomiae Characteres Generico Prodromi Florae Per. et Chil. squamam nullam calycinam, nisi prominentiam sub singulis flosculis descripsimus. Nunc addimus squamam minimam, magis minusve carnosam.

PEPEROMIA UMBILICATA. ICON. XLV. *Fig. b.*

2. *P.* radice tuberosa, foliis peltatis orbiculatis aveniis umbilicatis, scapo laxo.

RADIX tuberosa, globosa, lutescens, fibrosissima, subtus saepe nuda.

SCAPUS filiformis, gracilis, ferè palmaris, spicatus.

FOLIA radicalia, longè petiolata, peltata, orbiculata ovataque, umbilicata, integerrima, subtus albida, nitida, glaberrima, avenia.

PETIOLI teretes.

FLOSCULI distantes, squamis ovatis, minimis sustentati.

HABITAT in collibus *Limae*, *Chancay* et *Huanuci*, supra saxa.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flosculus auctus.

PEPEROMIA SECUNDA. ICON. XLV. *Fig. a.*

3. *P.* foliis cordato-subrotundis, floribus paniculatis secundis.

PLANTA pedalis, villosa.

RADIX fibrillosa.

CAULIS teres, erectus, violaceus, simplex, brevis, infernè foliosus, supernè unifolius.

FOLIA sparsa, prope radicem conferta, longè petiolata, cordata, patentia, leviter undulata, supra nitida, subtus venosa, albicantia.

PETIOLI teretes.

RACEMUS terminalis, paniculatus, albus, compositus spicis alternis, reflexis, decompositis plurimis spiculis alternantibus, secundis, filiformibus.

BRACTEOLA ovata, acuta, parva, inflexa sub singulis spicis spiculisque.

FLOSCULI distantes, squamis minimis, concavis sustentati.

STIGMA punctis duobus notatum.

SEMINA fulva, nitida.

HABITAT in montibus *Pillao* ad *Chacahuassi* locis umbrosis.

FLORET mensibus Octobri, et Novembri.

Obs. Habitus Peperom. crystallinae, foliiflorae, umbilicatae, secundae, et insertio flosculorum, à reliquis speciebus differunt.

Explic. Icon. 1 Flosculus auctus.

PEPEROMIA FOLIIFLORA. ICON. XLV. *Fig. c.*

4. *P.* foliis umbellatis cordatis basi floriferis, spicis aggregatis flexuosis.

PLANTA semipedalis.

RADIX fibrosa.

CAULIS erectus, simplex, apice foliosus, teres, lineis lon-

gitudinalibus, purpureis maculatus.

FOLIA 8-10, inaequalia, in umbellam disposita, petiolata, integerrima, repanda, nervosa, venosa.

SPICAE è basi foliorum in radium prodeuntes, flexuosae, gradatim minores, brevissimae, hyalinae.

FLOSCULI distantes; squamis globosis suffulti.

DRUPA ovalis, pedicellata, stylo acuminata.

HABITAT in *Chinchao* montibus nemorosis supra saxa et arbores.

FLORET mensibus Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Spica. 2 Flos. 3 Drupa. Omnia haec aucta.

PEPEROMIA CRYSTALLINA.

5. *P.* foliis oblongis subtus punctato-excavatis, spicis oppositifoliis compressis.

PLANTA glabra, fragilis, odoratissima, (odore *Aniso* similimo) pedalis.

CAULIS dichotomus, tetragonus, hyalinus, striis rubris maculatus, articulationibus ciliatus.

FOLIA hinc oblonga, inde oblongo-ovata, sessilia, integerrima, subtus punctis excavata, supra punctis convexis, acuminatis notata: unicum inter singulam dichotomiam.

SPICAE solitariae, oppositifoliae, filiformes, decemflorae, versus folium declinatae, ejusque longitudine.

FLOSCULI distantes, squamis suffulti.

HABITAT affatim in collibus *Limae*, in locis petrosis.

FLORET ab Aprili ad Septembrem.

VIRES ET USUS: Tota planta gaudet odore fragrantissimo et suavissimo, *Aniso* valde simili, ideoque ad flatum expellendos summopere infusio inservit.

PEPEROMIA INAEQUALIFOLIA. ICON. XLVI.

Fig. a.

6. *P.* foliis verticillatis obovatis, floralibus majoribus, spicis terminalibus inaequalibus subquaternis.

PLANTA subpedalis.

RADIX fibrosissima, albicans.

CAULIS erectus, teres, dichotomus; dum procumbit, radicitur.

FOLIA verticillata, 4-5-6, reflexa, subsessilia, subtus convexa, submarginata integerrimaque; *caulina* terminalibus carnosiora; *floralia* inaequalia, caulinis triplò longiora.

SPICAE terminales, longae, subulatae, 2-5, inaequales, erectae: *exteriores* breviores.

HABITAT abundè in *Limae*, *Huanuci*, *Tarmae* et *Canta* locis saxosis, et supra arbores.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE in *Lima Congona* et *Congonita cimarrona*, in *Huanuco Siempreviva* vulgò nominant.

VIRES ET USUS: Succus hujus plantae doloribus auris et hemicrania sedandae valde opitulatur. Infusio calidè sumpta flatum dissipat, ventriculum roborat, et digestio-

nem juvat. Quibusdam etiam condimentis, saporis gratia, non infrequenter admiscetur.

Obs. Ob odorem fragrantissimum, quo gaudet, Peruviana foeminae in diversarum florum *Mixtura* (ita enim appellant) eandem adhibere solent.

PEPEROMIA RHOMBEA. Icon. XLVI. Fig. b.

7. P. foliis quaternis oblongo-rhombeis, spicis terminalibus solitariis.

PLANTA bipalmaris.

RADIX fasciculata, fibrosa.

CAULES nonnulli, gemini, furcati, teretes, erecti, geniculati, ad articulationes nitidi, aliquando procumbentes, radicales.

FOLIA quaterna, breviter petiolata, patentia, subtus convexa, supra plana, integerrima, purpurascens, avenia.

SPICAE erectae, cylindricae, purpureae, solitariae, flosculis undique tectae.

FLOSCULI squamâ peltatâ suffulti.

HABITAT in silvis *Pillao* ad *Chacahuassi* supra arbores et saxa.

FLORET Octobri, et Novembri.

Obs. Folia post exsiccationem papyrum tingunt.

PEPEROMIA FILIFORMIS. Icon. XLVII. Fig. b.

8. P. foliis verticillatis subrotundo-obovatis, spicis terminalibus oblongis brevibus.

PLANTA scandens.

CAULIS filiformis, ramosus, repens, purpureus.

RAMI oppositi aut solitarii, breves.

FOLIA quaterna, saepe terna quinaeque, subrotundo-obovata, subtus convexa, supra plana, integerrima, inaequalia, breviter petiolata.

SPICAE terminales, solitariae, oblongae, breves.

FLOSCULI squamâ peltatâ, crassâ sustentati.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* supra saxa et arbores.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Squama. 3 Stamen. 4 Drupa. 5 Semen.

PEPEROMIA CONCAVA. Icon. XLVI. Fig. c.

9. P. foliis oppositis verticillatisque ovalibus subtus convexis quinquenerviis, spicis solitariis terminalibus.

PLANTA bipalmaris.

RADIX fasciculata, fibrosa.

CAULES plures, erecti, furcati, teretes, lineis purpureis longitudinalibus.

FOLIA opposita aut quaterna, ovalia, integerrima, subtus convexa, supra concava, quinquenervia, nervis purpureis.

SPICAE cylindricae, palmares, purpureae, erectae.

FLOSCULI squamâ peltatâ, crassâ stipati.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* et *Cuchero* supra saxa.

FLORET Julio, et Augusto.

PEPEROMIA TETRAGONA. Icon. XLVII. Fig. a.

10. P. foliis oblongis quinquenerviis acutis, spicis terminalibus geminis longissimis.

PLANTA pedalis.

RADIX fasciculata, fibrosa.

CAULIS infernè divisus, assurgens, tetragonus, radicans, dilutè purpureus, punctis notatus.

FOLIA opposita: alterum paulò brevius; petiolata, oblonga, quinquenervia, utrinque acuta, coriacea, marginibus reflexis.

SPICAE terminales, geminae, filiformes, ferè pedales, dependentes, inter spathas duas lanceolatas, acutas, carinatas, deciduas.

FLOSCULI squamâ peltatâ, crassâ sustentati.

HABITAT in nemoribus *Chinchao*.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama aucta. 3 Stamen. 4 Drupa. 5 Semen.

PEPEROMIA SEPTEMNERVIS. Icon. XLVII. Fig. c.

11. P. foliis lanceolatis septemnerviis coriaceis, spicis subulatis folio longioribus.

PLANTA pedalis.

RADIX fasciculata, fibrosa.

CAULES plurimi, erecti, nutantes, dichotomi, teretes, articulationibus purpurascens, radicales.

FOLIA opposita, rarius terna: alterum paulò brevius; petiolata, lanceolata, acuta, coriacea, septemnervia.

SPICAE axillares solitariae; terminales ternae aut solitariae, subulatae, curvatae.

FLOSCULI squamâ peltatâ, crassâ suffulti.

HABITAT in nemoribus *Pozuzo* supra saxa.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamen. 4 Drupa. 5 Semen.

PEPEROMIA PUBESCENS.

12. P. foliis obovatis trinerviis subtus pubescentibus; spicis ternis, intermediâ longissimâ.

PLANTA bipedalis.

CAULIS erectus, ramosus, teres, pubescens.

FOLIA opposita, obovata, trinervia, petiolata, integerrima, supra glabra, subtus pubescentia.

SPICAE axillares, ternae; intermediâ longissima.

FLOSCULI squamâ peltatâ, carnosâ stipati.

HABITAT in umbrosis montibus *Huassahuassi* supra saxa.

FLORET Octobri, et Novembri.

PEPEROMIA ALATA. Icon. XLVIII. Fig. b.

13. P. foliis lanceolatis quinquenerviis, caule alato, spicis subulatis.

PLANTA pedalis.

RADIX fasciculata, fibrosa.

CAULES plures, erecti, divisi, flexuosi; ab uno latere à geniculo ad geniculum semiteretes; altero plani, alati, articulationibus purpureis.

FOLIA alterna, petiolata, lanceolata, quinquenervia, integerrima.

SPICAE axillares solitariae; terminales geminae, subulatae, palmatae, in flore erectae, in fructu curvatae.

FLOSCULI squamâ peltatâ, crassiusculâ sustentati.

HABITAT in nemoribus Pozuzo, supra saxa.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama aucta. 3 Stamen. 4 Drupa. 5 Semen.

PEPEROMIA PURPUREA. ICON. XLIX. Fig. b.

14. P. foliis ovatis acuminatis venosis, spicis laxis dependentibus.

PLANTA ferè pedalis.

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULIS flexuosus, in summitate divisus, infernè nudus, purpureus, teres, erectus.

RAMI patentes.

FOLIA alterna, petiolata, integerrima, subtus purpurea, supra venis purpureis notata.

SPICAE axillares terminalesque, filiformes, purpureae, foliis triplò longiores, laxae, dependentes.

FLOSCULI squamâ peltatâ fulti.

HABITAT in montibus Chinchao umbrosis, et saxosis locis.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Squama. 2 Stamina et Pistillum.

PEPEROMIA PILOSA. ICON. L. Fig. a.

15. P. foliis oblongo-lanceolatis acutis basi inaequalibus, spicis axillaribus solitariis.

PLANTA semipedalis.

RADIX fasciculata.

CAULIS vix divisus, flexuosus, erectus.

FOLIA alterna, petiolata, basi inaequalia, subcordata, acuta, subtus punctata, supra pilosa.

SPICAE axillares, solitariae, filiformes, longitudine ferè foliorum, erectae.

HABITAT in nemoribus Pozuzo locis umbrosis.

FLORET Augusto, et Septembri.

PEPEROMIA TRINERVIS. ICON. L. Fig. b.

16. P. foliis ovalibus acutis trinerviis, spicis axillaribus solitariis; terminalibus binis erectis tenuibus.

PLANTA pedalis.

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULIS teres, parum divisus, infernè radicans.

FOLIA alterna, petiolata, ovalia, utrinque acuta, parum venosa.

SPICAE filiformes, foliis quadruplò longiores, erectae: axillares solitariae; terminales geminae.

HABITAT in montibus Chinchao, in locis umbrosis.

FLORET Julio, et Augusto.

PEPEROMIA OBLIQUA. ICON. LI. Fig. c.

17. P. foliis oblongo-obovatis obliquis nervosis, spicis furcatis filiformibus.

PIPER (*acuminatum*) foliis lanceolato-ovatis, nervosis.

LINN. Sp. pl. p. 42.

SAURURUS alius humilis, folio carnosio acuminato. PLUMIER.

Amer. p. 54. t. 71.

RADIX fibrosa.

CAULIS erectus, teres, geniculatus, vix divisus.

FOLIA alterna, petiolata, oblongo-obovata, nervosa, carnososa, integerrima, glabra, obliqua, altero latere productiora.

SPICAE axillares terminalesque, dichotomae, filiformes, erectae.

HABITAT in nemoribus Cuchero, Pozuzo et Pillao.

FLORET Julio, et Augusto.

PEPEROMIA ACUMINATA. ICON. LI. Fig. a.

18. P. foliis obovatis acuminatis, spicâ filiformi acutâ.

RADIX fibrosa.

CAULES plures, pedales, erecti, teretes, geniculati.

FOLIA alterna, petiolata, obovata, acuminata, integerrima, carnososa, plana.

PETIOLI breves, alati.

SPICA terminalis, filiformis, acuta, erecta.

HABITAT in nemoribus Muña, Pillao et Macora.

FLORET à Majo ad Novembrem.

PEPEROMIA STRIATA. ICON. LII. Fig. b.

19. P. foliis oblongo-ovatis acutis utrinque pubescentibus, spicis compositis terminalibus.

PLANTA pedalis.

RADIX fibrosa.

CAULIS simplicissimus, striatus, erectus, teres, geniculatus, radicans.

FOLIA alterna, petiolata, utrinque pubescentia, venosa, pellucido-punctata, integerrima.

PETIOLI subtus striati, supra canaliculati, punctis purpureis notati.

PEDUNCULI punctis purpureis aspersi.

SPICAE in racemum terminale, erectae, filiformes, longae.

HABITAT in nemoribus Cuchero et Chinchao, locis umbrosis.

FLORET Augusto, et Septembri.

PEPEROMIA SCANDENS. ICON. LI. Fig. b.

20. P. foliis cordato-subrotundis, caule scandenti repente, spicis axillaribus solitariis.

PLANTA scandens.

RADIX filiformis.

CAULIS ramosissimus, repens, filiformis, teres, geniculatus, flexuosus.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, cordato-subrotunda, integerrima, acuminata, carnosae, avenia.

SPICAE axillares, solitariae, subulatae.

HABITAT in nemoribus Chinchao, Cuchero, Pozuzo et Macora.

FLORET à mense Augusto ad Novembrem.

PEPEROMIA DEPENDENS. ICON. XLVIII. Fig. a.

21. P. foliis cordatis 13 nervibus dependentibus, spicis terminalibus subulatis.

PLANTA pedalis, inodora.

CAULIS ramosus, teres, purpurascens, radicans.

FOLIA alterna, longè petiolata, cordata, acuta, dependentia, utrinque glabra, subtus albida, supra nitida, tredecimnervia.

SPICAE terminales, solitariae, foliis terminalibus oppositae, subulatae, teretes.

HABITAT in locis umbrosis Pozuzo.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamen. 4 Drupa. 5 Semen.

PEPEROMIA EMARGINATA. ICON. XLIX. Fig. a.

22. P. foliis obovatis emarginatis aveniis, pedunculis furcatis bispicatis.

RADIX fibrosa.

CAULIS flexuosus, teres, repens.

FOLIA alterna, petiolata, avenia, versus basim carinata.

PEDUNCULI teretes, furcati.

SPICAE geminae, cylindricae, supernè sensim attenuatae.

STIGMA acuminatum.

DRUPA oblonga.

HABITAT in silvis Pozuzo, locis umbrosis supra saxa.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Squama. 2 Stamina et Pistillum.

PEPEROMIA VARIEGATA. ICON. LII. Fig. a.

23. P. foliis cordato-ovatis peltatis, spicis geminis.

PIPER (maculosum) foliis peltatis ovatis. LINN. Sp. pl. p. 42. PLUMIER. Amer. pag. 60. tab. 66.

RADIX filiformis, fibrosa.

CAULIS teres, repens, punctis purpureis maculatus, geniculatus.

FOLIA cordato-ovata; alterna, integerrima, plana, glabra, nitida, subtus albida; supra per venas alba, glauca, marginibus revolutis, dependentia, longè petiolata, acuminata.

Tom. I.

PETIOLI foliorum ferè longitudine, teretes, maculis purpureis variegati, arcuati.

SPICAE geminae, subulatae; alterâ breviori.

GERMEN ovatum, acuminatum.

HABITAT in montibus Pillao ad Chacahuassi, in locis umbrosis.

FLORET Septembri, et Octobri.

PEPEROMIA MONOSTACHYA.

24. P. foliis obovatis ovatisque, caule simplicissimo, spicâ unicâ terminali.

PLANTA bipalmaris.

CAULIS teres, glaber, radicans.

FOLIA alterna, petiolata, ovata obovato-oblongaque, nervia, supra viridia; subtus purpurea, lineis quinque obscure purpureis, longitudinalibus; duabus lateralibus brevioribus.

SPICA cylindrica, erecta, terminalis, solitaria.

HABITAT in montibus Chinchao, supra arborum vetustarum truncos.

FLORET mense Augusto, et Septembri.

TRIGYNIA.

PIPER. LINN. Gen. pl. p. 26.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. Spatha lanceolata, caduca. Spadix amentiformis, cylindricus, flosculis totidem squamis, subcuneiformibus, concavis distinctis tectus.

Perianthium nullum, nisi squamam velis.

COR. nulla.

STAM. Filamenta duo, longitudine germinis, ad cujus latera opposita. Antherae subcordatae, didymae, biloculares, utrinque dehiscentes: loculis septo intermedio perpendiculari divis.

PIST. Germen obovatum. Stylus unicus, brevis. Stigmata tria, patentia.

PER. Drupa obovata, unilocularis, monosperma.

SEM. Nux obovata, unilocularis. Nucleus subreniformis.

Obs. Stamina in quibusdam Speciebus quatuor, quinque aut sex. Stylus in nonnullis longus. Stigmata reflexa aut erecta.

HABITUS.

Frutices aromatici; pauci ferè inodori. Radix ramosa, fibrillosa, in verticillos. Caules erecti, teretes, articulati, nodosi. Rami subdivisi, plus minusve flexuosi. Gemmae ex axillis spicarum. Folia alterna, petiolata, aspera aut laevia, glabra aut pubescentia, vel hispidula, venosa aut nervosa: nervis alternis, aliquando coeuntibus, basi saepius inaequalia, apice obliqua, acuminata, saepe acuta, integerrima, lente vitrea visa pellucido-punctata. In nonnullis Speciebus utrinque punctis fuscis nota-

ta. *Petiolis* subvaginantes, canaliculati. *Spathae* parvae, convolutae, caducae, lanceolatae, folia et spicas involventes. *Spicae* pedunculatae, oppositifoliae, solitariae, erectae aut dependentes, rectae aut recurvae, breves vel longissimae, cylindricae, aut subulatae; in *Pipere polystachyo* plurimae. *Flosculi* ferè anulares. *Squamae* cuneiformes, margine ciliato, aut denticulato aut integerrimo, glabro aut villosa coronatae. In *Pipere unguiculato*, subrotundae. In *Pipere ovali* ovatae, acutae. *Stylus* unicus. *Stigmata* tria, villosa, aut hispida, vel glabra, breviora vel longa. In *Pipere calloso* *Stigmata* duo.

PIPER CALLOSUM. ICON. LIII. Fig. a.

1. P. foliis ovalibus acuminatis basi callis duobus, spicis brevibus subechinatis, stigmatibus duobus.
- FRUTEX ulnaris, glaber.
RADIX verticillata, ramosa, fibrosa.
CAULES plures, parum ramosi, articulati, nodosi, leviter striati.
RAMI subdivisi, supernè foliosi, dum procumbunt radicantes.
FOLIA petiolata, ovalia, obliquè acuminata, integerrima, patentia, plana, alternatim nervosa, supra nitida, utrinque laevia, glabra, ferè exsucca, basi callis duobus; altero altiori; microscopio visa pellucido-punctata.
PETIOLI canaliculati.
SPATHAE minimae, caducae.
SPICAE oppositifoliae, solitariae, cylindricae, parvae, petiolis paulò longiores, in fructu stylis persistentibus, subechinatae.
SQUAMA ovata, acuta sub singulis flosculis.
STAMINA quatuor, singulum germen ambientia.
STYLUS longus, persistens. *Stigmata* duo, patentia.
HABITAT in nemoribus Pillao ad Chacahuassi.
FLORET Septembri, et Octobri.

PIPER EXCAVATUM. ICON. LIV. Fig. b.

2. P. foliis ovatis acuminatis leviter repandis, spicis cylindricis folio duplò brevioribus.
- FRUTEX biorgyalis, glaber.
CAULIS erectus, articulatus, nodosus, teres, striatus, ramosus.
RAMI consimiles, dichotomi, punctis minimis adpersi.
FOLIA breviter petiolata, ovata, acuminata, basi parum inaequalia, integerrima, leviter repanda, undecim-tredecimnervia: nervis alternis, supra excavatis.
PETIOLI semiamplexicaules, supra canaliculati.
SPICAE oppositifoliae, solitariae, cylindricae, foliis duplò breviores, rectae.
FLOSCULI in anulos ferè articulatos digesti.
SQUAMAE obovatae, margine membranaceo, glabro, integerrimo.
STAMINA pistillo longiora.

HABITAT in Cuchero nemoribus.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamina. 4 Drupa cum stylo et stigmatibus. 5 Semen. Omnia haec aucta.

PIPER SCABRUM. ICON. LV. Fig. b.

3. P. foliis ovatis acutis rugosissimis subtus pubescentibus supra asperis, spicis erectis.
- FRUTEX ferè quadriorgyalis.
CAULIS erectus, teres, articulatus, nodosus, ramosus.
RAMI consimiles, subdivisi, nutantes, scabri.
FOLIA petiolata, ovata ovato-oblongaque, acuta, integerrima, subtus pubescentia, supra aspera: nervis alternis oppositisque, valde venosa, rugosissima, basi inaequalia.
SPATHA ovato-lanceolata, villosa, marginibus glabra.
SPICAE oppositifoliae, solitariae, erectae, foliis duplò breviores, cylindricae.
STAMINA duo, germinis longitudine.
STIGMATA tria, reflexa.
HABITAT in Huassahuassi nemoribus.
FLORET Octobri, et Novembri.
Explic. Icon. 1 Flosculus.

PIPER HETEROPHYLLUM. ICON. LVI. Fig. a.

4. P. foliis ovalibus acuminatis venosis utrinque punctatis, spicis curvatis.
- FRUTEX duodecimpedalis, glaber; coma subrotunda.
CAULIS erectus, teres, striatus, articulatus, nodosus, articulationibus distantibus.
RAMI consimiles, alternatim dichotomi.
FOLIA petiolata, ovalia ovato-oblongaque, acuminata, integerrima, rarissima basi inaequalia, nitidissima, venosae; venis alternis, supra prominulis, utrinque punctata, punctis fuscis, marginibus revolutis.
SPICAE oppositifoliae, solitariae, pedunculatae, cylindricae, acuminatae, in flore folio triplò breviores, erectae, in fructu longitudine ferè foliorum, curvatae, deflexae.
FLOSCULI in anulos digesti, squamis totidem distincti.
SQUAMAE cuneiformes, peltatae, margine cristato coronatae.
FILAMENTA longitudine styli.
STYLUS longitudine staminum. *Stigmata* tria, breviora, patentia.
HABITAT in nemoribus Pillao ad Chacahuassi, Chinchao et Muña.
FLORET Junio, Julio et Augusto.
VERNACULE Carpunya.
VIREs: Folia vi digestivâ pollent.

PIPER UNGUICULATUM. ICON. LVII. Fig. b.

5. P. foliis subcordatis quinquenerviis acumine unguiculato basi utrinque revolutis, spicis erectis.

FRUTEX biulnaris, odore et sapore *Piperi nigro* aliquantulum accedente.

CAULIS erectus, infernè divisus, supernè ramosus, articulatus, nodosus, viridiusculus, leviter striatus.

RAMI consimiles, subdivisi, supernè foliosi; articulationibus approximatis.

FOLIA patentia, breviter petiolata, obliquè deflexa, carinata, subcordata, acuta cum acumine brevi, tenero, unguiculiformi ad apicis dorsum, basi inaequalia, marginibus ad basim revolutis, quinquenervia, aliquando septemnervia, utrinque glabra, laevia, supra nitida; nervis lateralibus, obsoletioribus.

PETIOLI breves, supra canaliculati.

SPATHA caduca.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, cylindricae, in flore erectae, in fructu patentes, foliis longiores.

FLOSCULI conferti, squamis subrotundis, concavis distincti et suffulti: *flosculus inferior* remotus, hexandrus.

STAMINA quinque, sex, frequentius quatuor, singulum germen ambientia. *Antherae* subrotundae, compressiusculae, didymae, biloculares, longitudinaliter utrinque dehiscentes: *loculis* septo intermedio divisis.

GERMEN obtusè 3-5 gonum, frequentius tetragonum. *Stigmata* totidem, prominula, reflexa, depressa.

DRUPA tri-pentagona, parva, stigmatibus coronata.

HABITAT in *Pozuzo* et *Chinchao* nemoribus.

FLORET Septembri, et Octobri. Colitur in Hort. Regio Matritensi, ubi floret Majo et Junio.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamen. 4 Drupa. 5 Semen. Omnia haec aucta.

PIPER CHURUMAYU. ICON. LVIII. Fig. b.

6. P. foliis ovatis acutis, spicis erectis.

ARBOR triorgyalis.

TRUNCUS erectus, supernè ramosus, teres, geniculatus.

RAMI subdivisi, teretes, articulati, nodosi.

FOLIA petiolata, ovata, acuta, integerrima, subcoriacea, nervosa; nervis alternis, glabra, parum venosa.

PETIOLI canaliculati.

SPATHAE magnae, lanceolatae.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, erectae, cylindricae, obtusae, foliis paulò breviores.

STYLUS brevissimus. *Stigmata* tria, reflexa.

HABITAT in nemoribus *Huassahuassi* ad fluvii margines.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Churumayu*, id est, fluvii Flagellum.

PIPER GRACILE. ICON. LIX. Fig. b.

7. P. foliis ovato-lanceolatis acutis rugosis, spicis gracilibus erectis.

FRUTEX biulnaris.

CAULIS erectus, teres, striatus, scaber, nodosus, ramosus.

RAMI consimiles, subdivisi: *teneri* hispiduli.

FOLIA breviter petiolata, ovato-lanceolata, acuta, integerrima, apice obliquo, basi inaequalia, 11-13 nervia, nervis alternis oppositisque, supra parum aspera, subtus venosissima, ferè reticulata, rugosa, pubescentia.

SPICAE oppositifoliae, filiformes, tenues, rectae, in fructu longitudine foliorum.

SQUAMAE flosculos distinguentes, cuneiformes, peltatae, concavae, villis coronatae.

HABITAT in *Cuchero* nemoribus.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER DICHOTOMUM. ICON. LX. Fig. b.

8. P. foliis oblongo-lanceolatis; venis alternis, spicis cylindricis folio brevioribus.

FRUTEX triulnaris.

CAULIS dichotomus, articulatus, nodosus, teres.

RAMI consimiles.

FOLIA petiolata, oblongo-lanceolata, acuta, venosa; venis alternis.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, cylindricae, in flore erectae, folio breviores, in fructu dependentes.

HABITAT in silvis *Chinchao* ad *Macora* et *Messapata* praedia.

FLORET Julio, et Augusto.

VIRE ET USUS: Folia ob suam gratissimam fragrantiam et digestivam virtutem ad eosdem usus ac *Pip. Carpunya* adhibentur.

PIPER LINEATUM. ICON. LX. Fig. a.

9. P. foliis ovato-oblongis acutis lineatis subplicatis, spicis recurvatis.

FRUTEX duodecimipedalis.

CAULIS erectus, teres, articulatus, nodosus, granulosus, ramosus.

RAMI consimiles, subdivisi, articulationibus approximatis, incrassatis; *teneri* hispiduli.

FOLIA petiolata, ovato-oblonga, acuta, integerrima, lineata, subplicata, basi inaequalia, marginibus reflexis, coriacea, exsucca, supra nitida, glaberrima, subtus leviter pilosa, venosa, venis horizontalibus simplicissimis, 11-15 nervia, nervis alternis prominentibus.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, recurvatae, cylindricae, longitudine ferè foliorum.

HABITAT ad margines fluviorum *Huanuci* et *Panao*, et in *Chinchao* runcationibus vernaculè *Carpales* dictis.

FLORET Julio, et Augusto.

Obs. Folia luteum colorem praebent.

Explic. Icon. 1 Squama. 2 Flosculus. 3 Stamina. 4 Drupa. 5 Semen.

PIPER CROCATUM. ICON. LV. Fig. a.

10. P. foliis ovato-oblongis acutis acuminatisque utrinque rugosis supra asperis, spicis erectis foliorum ferè longitudine.

FRUTEX subtriulnaris.

CAULIS erectus, ramosus, scaber, articulatus, nodosus, striatus.

RAMI erecto-patentes, subdivisi, scabri, teretes, striati, articulati, nodosi: *teneri* pubescentes.

FOLIA petiolata, ovato-oblonga, integerrima, acuta acuminataque, basi inaequalia, subtus pubescentia, supra retrorsum aspera, utrinque venosa, rugosissima, nervis alternis.

SPATHAE lanceolatae, breves, concavae, membranaceae, caducae.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, erectae, longitudine ferè foliorum, brevissimae, teretes.

SQUAMAE flosculos distinguentes, cuneiformes, peltatae, concavae, villis coronatae.

STAMINA quatuor, germen ambientia.

STIGMATA reflexa.

HABITAT in *Pillao* ad *Chacahuassi* nemoribus.

FLORET Octobri, et Novembri.

VIREs: Folia Spicaeque adhuc recentes saporem habent et odorem, Piperi nigro quodammodo similem, qui insigniores sunt, postquam spicae ad maturitatem perveniunt, et tunc colorem croceum praebent, quapropter ad cibos condiendos inservire possunt.

Explic. Icon. 1 Flosculus.

PIPER LANCEOLATUM. Icon. LXI. Fig. b.

11. P. foliis lanceolatis acutis, spicis brevibus erectis.

FRUTEX biulnaris, glaber.

CAULIS erectus, teres, articulatus, nodosus.

RAMI consimiles, subdivisi.

FOLIA breviter petiolata, lanceolata, acuta, basi aequalia, parum obliqua, integerrima, alternatim venosa, utrinque punctis fuscis notata.

SPICAE oppositifoliae, cylindricae, erectae, foliis dimidio breviores.

SQUAMAE margine pubescenti coronatae.

STYLUS brevissimus. Stigmata brevia.

HABITAT in nemoribus *Chacahuassi*.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamen auctum. 4 Drupa. 5 Semen.

PIPER CURVATUM. Icon. LIV. Fig. a.

12. P. foliis oblongis acuminatis laevibus subtus punctatis nitidis, spicis brevibus curvatis.

FRUTEX octopedalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, striatus, articulatus, nodosus, ramosus, articulationibus approximatis.

RAMI consimiles, dichotomi.

FOLIA petiolata, oblonga, acuminata, integerrima, marginibus leviter revolutis, subtus minutim punctata, venosa; venis alternis, nervo venisque supra elevatis, subcoriacea, basi parum inaequalia.

SPICAE oppositifoliae, pedunculatae, breves, curvatae re-

curvataeque, acuminatae, cylindricae, tenues.

FLOSCULI in anulos digesti.

SQUAMAE subreniformes.

HABITAT in nemoribus *Cuchero* et *Chinchao*.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamina. 4 Drupa cum stylo et stigmatibus. 5 Semen.

PIPER OBOVATUM. Icon. LIII. Fig. b.

13. P. foliis obovato-oblongis acuminatis utrinque attenuatis, spicis erectis; inferioribus incrassatis; superioribus parvis tenuibus.

FRUTEX monoicus, triulnaris, glaber, (*Betulae* facie).

CAULIS erectus, teres, striatus, articulatus, nodosus, ramosus.

RAMI consimiles, subdivisi, articulationibus approximatis.

FOLIA petiolata, obovato-oblonga, acuminata, utrinque attenuata, basi aequalia, integerrima, marginibus revolutis, venosa, venis alternis, utrinque laevia, punctis fulvis notata.

SPICAE oppositifoliae, erectae; inferiores subpatentes, foliis duplo breviores, cylindricae, obtusae, crassae; superiores longitudine petiolorum, erectae, teretes, acumine subulato.

SQUAMAE cuneiformes, peltatae, concavae, margine pubescenti coronatae.

DRUPA obovata.

NUX ejusdem figurae. Nucleus subreniformis.

HABITAT in nemoribus *Chacahuassi*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

PIPER PUNCTATUM. Icon. LXII. Fig. a.

14. P. foliis oblongis acuminatis venosis utrinque punctatis, spicis foliis duplo brevioribus.

FRUTEX quadripedalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, striatus, articulatus, nodosus, punctatus, ramosus.

RAMI consimiles, articulationibus distantibus.

FOLIA petiolata, oblonga, acuminata, integerrima, basi aequalia, venosa; venis alternis oppositisque, punctata, supra nervo et venis prominentibus.

SPICAE oppositifoliae, pedunculatae, erectae, subulatae, foliis duplo breviores.

FLOSCULI confertissimi, squamis totidem distincti.

SQUAMAE cuneiformes, peltatae, margine denticulato coronatae.

FILAMENTA pistilli longitudine.

STYLUS crassus. Stigmata tria, brevia, patentia.

HABITAT in nemoribus *Pillao* ad *Iscutunam*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Squama. 2 Pistillum cum staminibus.

PIPER SECUNDUM. Icon. LXII. Fig. b.

15. P. foliis oblongis acuminatis glabris laevibus, spicis filiformibus erectis secundis.

FRUTEX octopedalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, articulatus, nodosus, scaber, ramosus.

RAMI dichotomi, horizontales, consimiles.

FOLIA petiolata, dependentia, oblonga, acuminata, integerrima, utrinque glabra, laevia, venosa, basi leviter inaequalia.

SPICAE oppositifoliae, secundae, ad coelum spectantes, cylindricae, tenues, rectae, foliis paulo breviores.

FLOSCULI confertissimi, in anulos digesti.

STIGMATA patentia.

HABITAT in nemoribus *Pillao*, *Muña*, *Cuchero* et *Chinchao*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Squama. 2 Pistillum cum staminibus.

PIPER ASPERIFOLIUM. ICON. LVI. Fig. b.

16. P. foliis ovatis oblongisque acuminatis asperis, spicis teneris curvatis; adultis erectis.

FRUTEX triulnaris.

CAULIS erectus, teres, articulatus, nodosus, scaber, striatus, ramosus.

RAMI consimiles, hispiduli, subdivisi.

FOLIA petiolata, ovata oblongaque, alia acuta, alia acuminata, integerrima, utrinque aspera, rugosa, 11-13 nervia; nervis alternis, subtus hispidula, basi inaequalia.

SPICAE oppositifoliae, cylindricae, tenues, cum brevi acumine, in flore curvatae, in fructu erectae, foliorum ferè longitudine.

SPATHAE caducae.

FLOSCULI densissimi.

SQUAMAE flosculos distinguentes, cuneiformes, peltatae, concavae, villis coronatae.

ANTHERAE cordato-reniformes.

HABITAT in nemoribus *Pillao* et *Cuchero*.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER LONGIFOLIUM. ICON. LXI. Fig. a.

17. P. foliis oblongo-ovatis obovatisque acuminatis utrinque nitidis venosissimis, spicis recurvatis.

FRUTEX biorgyalis, subinodorus, ferè insipidus.

CAULIS erectus, ramosus, teres, articulatus, nodosus, dichotomus.

RAMI consimiles, nitidi.

FOLIA breviter petiolata, oblongo-ovata obovataque, acuminata, pedalia, lata, integerrima, utrinque nitida, laevia, glaberrima, venosissima; venis alternis oppositisque; marginibus leviter reflexis.

SPATHAE ovato-lanceolatae, albicantes, membranaceae.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, foliis breviores, recurvatae, subulatae.

STYLUS longus. *Stigmata* erectiuscula.

HABITAT in nemoribus *Pillao* ad *Iscutunam*.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamen. 4 Drupa cum stylo et stigmatibus. 5 Semen. Omnia haec aucta.

Tom. I.

PIPER MITE. ICON. LVIII. Fig. a.

18. P. foliis cordatis acutis 15-19 nervibus reticulatis, spicis longioribus subulatis erectis.

FRUTEX sexpedalis.

CAULIS erectus, ramosus, glaber, articulatus, nodosus, teres.

RAMI consimiles, pubescentes, mites.

FOLIA petiolata, ampla, cordata, acuta acuminataque, repanda, integerrima, supra glabra, subtus pubescentia, leviter mitia, 15-19 nervia, subtus venoso-reticulata.

PETIOLI canaliculati.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, erectae, folio longiores, pedales, teretes, subulatae.

FLOSCULI in anulos dispositi confertissimi.

HABITAT in silvis *Cuchero*.

FLORET Julio, et Augusto.

PIPER CARPUNYA. ICON. LXIII. Fig. b.

19. P. foliis cordatis acutis acuminatisque coriaceis, marginibus revolutis, spicis erectis.

ARBOR triorgyalis, glaberrima.

CAULIS erectus, teres, articulatus, nodosus, ramosissimus.

RAMI consimiles, subdivisi, patentes, granulosi, articulationibus approximatis, incrassatis.

FOLIA (*Aurantij* facie) breviter petiolata, cordata, acuta acuminataque, integerrima, coriacea, basi aequalia, utrinque nitida, marginibus revolutis, venosa: venis alternis.

SPATHAE lanceolatae.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, erectae, tenues, longitudine ferè foliorum.

FLOSCULI confertissimi, in anulos digesti.

SQUAMAE obovatae, concavae, membranaceae, glaberrimae, lutescentes.

FILAMENTA brevissima.

STYLUS brevissimus. *Stigmata* tria, brevissima, patentia.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* et *Cuchero*.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Carpunya*.

VIRE ET USUS: Folia praesertim sicca fragrantissimum odorem emittunt. Incolae ad indigestiones eorum infusione in aqua calida aut fervente paratâ frequentissime utuntur, et ob gratum saporem coeae et theae potioni praeferunt. Eadem etiam sicca et contusa blattas certissimè fugant, ideoque in nostris excursionibus per montes Panatahuas ad Animalia et Aves dissectas à blattis praeservandas ipsis non sine fructu semper usi sumus.

Explic. Icon. 1 Flosculus.

PIPER OBLIQUUM. ICON. LXIII. Fig. a.

20. P. foliis oblique cordatis obtusis, spicis longissimis dependentibus.

FRUTEX biorgyalis, glaber, laevis.

CAULIS erectus, teres, articulatus, nodosus.

K

RAMI consimiles, striati.

FOLIA petiolata, oblique cordata, obtusa, integerrima, magna, subtus 11-15 nervia, nervis alternis, venosissima, reticulata, repanda.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, ferè bipedales, dependentes.

FLOSCULI in anulos digesti, confertissimi.

HABITAT in Cuchero silvis ad Cayumba terminum.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flosculus.

PIPER ACUTIFOLIUM. ICON. LXIV. Fig. a.

21. P. foliis cordatis acutissimis, spicis erectis cylindricis brevibus.

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS erectus, teres, articulatus, nodosus, striatus, ramosus.

RAMI consimiles: teneri pubescentes, subdivisi.

FOLIA breviter petiolata, cordata, acutissima, ampla, integerrima, venosissima, utrinque rugosa, subtus pubescentia, supra aspera, alternatim 13-17 nervia; apice obliquo, basi inaequali, obliqua.

SPICAE oppositifoliae, cylindricae, erectae, foliis quadruplo breviores.

FLOSCULI in anulos digesti.

SQUAMAE flosculos distinguentes, cuneiformes, peltatae, concavae, villis coronatae.

STAMINA longitudine germinis.

STIGMATA tria, revoluta.

HABITAT in Cuchero et Pozuzo silvis.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamen. 4 Drupa cum stylo. 5 Semen.

PIPER ANGUSTIFOLIUM. ICON. LVII. Fig. a.

22. P. foliis cordato-lanceolatis acutis rugosis, spicis recurvis foliorum longitudine.

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS erectus, articulatus, nodosus, ramosus.

RAMI subdivisi, geniculati, articulati, subpurpurascens, teretes, scabri: teneri pubescentes, punctati.

FOLIA breviter petiolata, cordato-lanceolata, acutissima, parum obliqua, basi inaequalia, integerrima, subtus pubescentia, mitia, supra retrorsum scabra, utrinque venosa, reticulata, rugosissima, nervosa; nervis alternis.

SPATHAE lanceolatae.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, recurvatae, dum tenerae erectae, foliorum longitudine, cylindricae, sapore piperis nigri.

STIGMATA hispida.

HABITAT in silvis et ripis Huanuci, Cuchero, Panao, Chacilla et Muña.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

VERNACULE Mohomoho, id est, Nodus nodus.

VIRES ET USUS: Incolae ad gonorrhoeas et ulcera cancrosa à lue venerea ortas extirpandas decoctum affatim hauriunt.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamina. 4 Drupa cum stylo. 5 Semen.

PIPER GRANULOSUM. ICON. LXIV. Fig. b.

23. P. foliis cordato-lanceolatis obliquis rugosissimis supra scabris, nervis alternis, spicis uncinatis.

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS erectus, teres, ramosus, scaber, articulatus, nodosus, ad genicula granulosus; articulationibus approximatis, incrassatis.

RAMI consimiles, superne villosi, subdivisi, subdependentes.

FOLIA breviter petiolata, dependentia, cordato-lanceolata, acuta, parum obliqua, integerrima, basi inaequalia, venosissima, utrinque rugosa, per nervos et venas villosa, supra magis scabra, bipalmaria, 13-17 nervia; nervis alternantibus.

SPICAE oppositifoliae, solitariae, in flore arcuatae, foliis dimidio breviores, in fructu erectae.

SQUAMAE flosculos distinguentes, cuneiformes, peltatae, concavae, villis coronatae.

FILAMENTA articulata. Antherae cordatae.

STIGMATA tria, revoluta.

HABITAT in Pillao nemoribus.

FLORET Augusto, et Septembri.

VIRES ET USUS: Folia et spicae manibus fricatae gratum et aromaticum odorem spirant, saporemque praebent, quamobrem ad cibos condiendos inservire possunt. Infusum etiam calidum ad indigestiones removendas propinatur.

Explic. Icon. 1 Flosculus. 2 Squama. 3 Stamen. 4 Drupa cum stylo et stigmatibus. 5 Semen.

PIPER PELTATUM. ICON. LIX. Fig. a.

24. P. foliis cordato-reniformibus acuminatis 19 nervibus, pedunculis polystachyis, spicis fasciculatis inaequalibus.

PIPER (peltatum) foliis peltatis, orbiculato-cordatis obtusis repandis, spicis umbellatis. LINN. Sp. pl. p. 77.

LOMBA. RUMPHI. amb. 6. p. 133. t. 59. fig. 1.

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS ramosus, teres, articulatus, nodosus, striatus.

RAMI consimiles, striis nodisque villosis.

FOLIA longe petiolata, ferè peltata, cordato-reniformia, suborbiculata, acuminata, integerrima 17-19 nervia, repanda, venosissima.

PETIOLI ante foliorum explicationem vaginantes, postea semivaginantes, striati, striis villosis, supra canaliculati, maculati.

PEDUNCULI axillares, solitarii binique, petiolis quadruplo breviores, 15-20 spicas, saepe pauciores, fasciculatas sustinentes.

SPICAE inaequales, intra spatham universalem, totidem spathis partialibus distinctae, cylindricae, tenues.

HABITAT in Provinciae Panatahuarum nemoribus ad Cuchero vicum, et ad Maichaynio praedium.

FLORET Julio, et Augusto.

Obs. In Prodrumi Florae Peruvian. et Chil. Observatione IV. post characterem genericum Peperomiae hanc speciem Piper reniforme appellavimus.

C L A S S I S III.

TRIANDRIA MONOGYNIA.

VALERIANA. LINN. *Gen. pl. p. 29.*

VALERIANA RIGIDA. ICON. LXV. Fig. c.

1. V. acaulis, floribus triandris, foliis lineari-lanceolatis coriaceis mucronatis, corollis trifidis.

PLANTA acaulis (*Valerianae tenuifoliae* valde affinis) perennis.

RADIX fusiformis, crassa, paucis fibrillis.

FOLIA numerosissima, inaequalia, in stellae formam imbricata, patentia, lineari-lanceolata, ad basim dilatata et membranacea, mucronata, rigida, coriacea, integerrima, glabra, nitida, avenia, infernè ciliata, utrinque obsolete punctata, marginibus cartilagineis.

SCAPI numerosi è centro foliorum, brevissimi, compressi, subancipites, umbellati, involucrati, albi, basi attenuati.

INVOLUCRA *universalia* monophylla, vaginantia, bifida; *laciniis* acutis; *alterâ* breviori: *partialia* consimilia.FLORES sessiles: *singulus* intra involucellum proprium, parvum.CALYX: *Margo* minimus.COROLLA alba, infundibuliformis. *Tubus* longus, tenuis. *Limbus* trifidus, patens.

STAMINA tria, aequalia.

STIGMA bifidum.

SEMINA solitaria, nuda.

HABITAT in Provinciae *Tarmae* alpinis, dictis *Bombom*.

FLORET Octobri, et Novembri.

Explic. Icon. 1 Involucrum universale cum partialibus. 2 Partiale. 3 Flosculus cum involucello subjecto. 4 Semen.

VALERIANA TENUIFOLIA. ICON. LXV. Fig. d.

2. V. acaulis floribus triandris, foliis lineari-subulatis gracilibus, corollis trifidis.

PLANTA acaulis, perennis. (*Val. rigidae* habitu).

RADIX fusiformis, crassiuscula, paucis fibrillis.

FOLIA numerosa, in stellae formam patentia, inaequalia, lineari-subulata, sessilia, gracilia, integerrima, avenia, glabra, nitida, infernè ciliata, apice rigidiusculo, basi dilatata, membranacea.

SCAPI plurimi è centro foliorum, compressi, ancipites, brevissimi, umbellati, albi, basi attenuati, involucrati.

INVOLUCRA *universalia* monophylla, vaginantia, bifida; *laciniis* acutis, inaequalibus: *partialia* consimilia.FLORES sessiles; *singulus* intra involucellum proprium, parvum.CALYX: *Margo* minimus.COROLLA alba, infundibuliformis. *Tubus* tenuis, longus. *Limbus* trifidus.

STAMINA tria, aequalia.

STIGMA bifidum, patulum.

SEMINA solitaria, nuda.

HABITAT in alpinis *Tarmae* ad *Huassahuassi*, et in Provincia *Huaroche*, aut *Huaroche*.

FLORET Novembri, et Decembri.

Explic. Icon. 1 Involucrum universale cum partialibus. 2 Partiale. 3 Flosculus cum involucello subjecto. 4 Semen.

VALERIANA PILOSA. ICON. LXVI. Fig. a.

3. V. floribus triandris, foliis lineari-lanceolatis, integerrimis, marginibus revolutis.

PLANTA herbacea, pilosa, (*Plantaginis albicantis* habitu).

RADIX ramosa, crassiuscula.

CAULIS solitarius, saepe duo aut tres, erectus, pedalis, striatus, subnudus, ad medium foliis duobus linearibus oppositis.

FOLIA *radicalia* numerosa, sesquipalmaria, erecta, inaequalia, lineari-lanceolata, integerrima, marginibus revolutis: *floralia* opposita, linearia, patula.

INFLORESCENTIA corymbosa.

PEDUNCULI oppositi. *Pedicelli* umbellati, terni, quini.FLORES capitati, sessiles: *bracteis* obovatis, margine membranaceis, persistentibus distincti.

CALYX marginalis.

COROLLA quinquefida, alba.

STAMINA tria, exserta. *Antherae* globosae.

STIGMA emarginatum.

SEMEN pappo piloso coronatum.

HABITAT in frigidis locis *Tarmae* Provinciae ad *Diezmo*.

FLORET à Majo ad Augustum.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Semen anticè et posticè visum. Omnia haec aucta.

VALERIANA CONNATA. ICON. LXVII. Fig. c.

4. V. floribus triandris, foliis lanceolatis connatis integerrimis, spicis verticillatis.

PLANTA suffruticosa, bipedalis. (*Polygoni Persicariae* habitu).

CAULES plurimi, subprocumbentes, ramosissimi, cortice rimoso obtecti.

RAMI assurgentes, virgati, articulati, ferè vaginati, cavi: *teneri* bifariam alternatim pubescentes, obscure helvoli, striati.

FOLIA subconnata, sessilia, lanceolata, integerrima, ad basim utrinque ciliata, glabra.

SPICA verticillata.

PEDUNCULI oppositi, trifidi; *bracteolis* duabus, lanceolato-linearibus, connatis stipati.

FLORES sessiles, capitati; *bracteis* lanceolatis, obtusis, membranaceis, persistentibus distincti.

CALYX marginalis.

COROLLA minima, quinquefida, alba.

STAMINA tria, corollae longitudine.

STIGMA emarginatum.

SEMEN pappo piloso coronatum.

HABITAT in frigidis locis *Bombom* ad *Diezmo* inter rupes.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Squama. 2 Flos. 3 Corolla cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Semen.

VALERIANA COARCTATA. ICON. LXVIII. Fig. a.

5. V. floribus triandris: foliis lanceolato-spathulatis margine denticulatis ciliatis, spicâ conicâ coarctatâ.

PLANTA herbacea.

RADIX fusiformis, infernè divisa.

CAULIS ferè pedalis, erectus, striatus, infernè nudus, superne foliosus, pubescens: *villis* deciduis.

FOLIA *radicalia* imbricata, bipalmaria, lanceolato-spathulata, canaliculata, extus purpurascentia: *floralia* terna, quaterna, lanceolata; *omnia* margine denticulata, ciliata, utrinque glabra.

SPICA terminalis, conica, coarctata.

FLORES verticillati, in capitula congesti, sessiles; *bracteis* cuneiformibus, latiusculis, brevibus distincti.

VERTICILLUS inferior, remotus.

COROLLA alba, quinquefida.

SEMINA oblonga, squamis quinque coronata.

HABITAT in locis altis frigidis *Tarmae* ad *Huassahuassi*.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Huarituru*.

VIRES: Ad fracturas specificum remedium perhibetur Radix.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. Omnia haec aucta.

VALERIANA SERRATA. ICON. LXVIII. Fig. c.

6. V. floribus triandris, foliis lanceolato-spathulatis, superne serratis, spicis verticillatis.

PLANTA herbacea, glabra, caespitosa.

RADIX crassa.

CAULES plures, teretes, striati, infernè nudi; *intermedius* longior, semipedalis.

FOLIA *radicalia* lanceolato-spathulata, superne serrata: *floralia* opposita, linearia, apice serrata.

SPICA terminalis, sesquipalmaris.

FLORES verticillati, sessiles, in capitula congesti; *bracteis* cuneiformibus, membranaceis, persistentibus distincti.

VERTICILLI distantes; *superiores* approximati.

COROLLA alba, quinquefida.

SEMEN oblongum, squamis quinque coronatum.

HABITAT in locis frigidis *Caxatambo* Provinciae ad *Cheuchin*.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. 3 Semen. Omnia haec aucta.

VALERIANA SPATHULATA. ICON. LXVIII. Fig. b.

7. V. floribus triandris, foliis spathulatis sublinearibusque obtusis, corollis trifidis, umbellâ sessili involucreatâ.

PLANTA caespitosa.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULIS prolifer, subpalmaris, anceps, infernè foliis numerosissimis tectus.

FOLIA erecto-potentia, spathulata sublineariaque, integerrima; microscopio visa ciliata, pubescentia: *radicalia* confertissima: *superiora* sparsa.

FLORES umbellati, sessiles, involucrati.

INVOLUCRA monophylla, 4-6flora: *laciniis* linearibus, acutis.

CALYX nullus, nisi *Margo* minimus.

COROLLA alba. *Tubus* tenuis, longus. *Limbus* trifidus, patens.

STAMINA tria, aequalia.

SEMINA margine coronata.

HABITAT in alpihus Provinciae *Tarmae* ad *Bombom*.

FLORET Januario, et Februario.

Explic. Icon. 1 Involucrum. 2 Flos. 3 Folium. Omnia haec aucta.

VALERIANA OBLONGIFOLIA. ICON. LXV. Fig. a.

8. V. floribus triandris, foliis oblongis dentatis, corymbo terminali.

PLANTA herbacea, pilosa.

RADIX crassiuscula, fibrillosa.

CAULES plures, inaequales, striati; *intermedius* longior, bipalmaris.

FOLIA *radicalia*, petiolata, oblonga, dentata: *floralia* opposita, sessilia, semiamplexicaulia, lanceolato-linearia, profundè dentata.

CORYMBUS terminalis.

FLORES congesti, sessiles; *bracteis* linearibus distincti.

COROLLA alba, quinquefida.

STAMINA tria.

STIGMA bifidum, reflexum.

HABITAT in alpihus *Tarmae*, versùs *Pasco* oppidum.

FLORET Aprili, et Majo.

Explic. Icon. 1 Flos cum bractea. 2 Pistillum. 3 Semen.

VALERIANA PINNATIFIDA. ICON. LXIX. Fig. b.

9. V. floribus triandris corymbosis, foliis infimis lanceolatis integerrimis; reliquis pinnatifidis laciniatis, paniculâ brachiata.

PLANTA herbacea, succosa.

RADIX tuberosa, longa, (odore *Valerianae Phu* simillimo).

CAULIS erectus, simplicissimus, striatus, cavus, infernè aphyllus.

FOLIA radicalia longè petiolata; duo inferiora lanceolata, integerrima; reliqua pinnatifido-laciniata: caulina opposita, sessilia, semiamplexicaulia, pinnatifida; laciniis omnibus serrato-dentatis.

PANICULA elongata.

PEDUNCULI brachiati, corymbosi.

PEDICELLI inferiores brachiati; terminales dichotomi.

BRACTEOLAE duae sub pedunculis et pedicellis, oppositae, lineares.

FLORES triandri, sessiles.

CALYX marginalis.

COROLLAE albae.

SEMEN pappo coronatum.

HABITAT in collibus altis Limae et Chaucay.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Calyx supra germen. 2 Corolla cum staminibus. 3 Eadem scissa. 4 Pistillum. 5 Semen.

VALERIANA OFFICINALIS.

10. V. floribus triandris, seminibus papposis, foliis omnibus pinnatis. LINN. Sp. pl. p. 45.

PLANTA ramosa.

CAULIS erectus, bipedalis, tener, striatus.

FOLIA radicalia longè petiolata, laciniata, pinnata pinnatifidaque; caulina opposita, pinnata; laciniis incisis serratis.

FLORES subumbellati.

COROLLA alba.

HABITAT in collibus altis Limae et Chaucay ad Jequan.

FLORET Majo, et Junio.

VALERIANA PHU.

11. V. floribus triandris, foliis caulinis pinnatis radicalibus indivisis. LINN. Sp. pl. p. 45.

HABITAT in Peruviae collibus ad Cercado et Chaucay Provincias, et ad Sancti Jacobi Chilensis urbem.

FLORET Octobri, et Novembri.

VALERIANA HYALINORRHIZA. ICON. LXVII.
Fig. b.

12. V. floribus triandris, foliis radicalibus subrotundis crenatis; caulinis pinnatifido-dentatis, paniculâ terminali.

PLANTA herbacea, pubescens.

RADIX tuberosa, saepe obovata, hyalina, insipida, alba.

CAULIS erectus, semipedalis, simplicissimus purpurascens.

FOLIA radicalia petiolata, subrotunda, crenato-dentata; intimum utrinque appendiculatum: Caulina connata, distantia, pinnatifido-dentata.

PANICULA terminalis.

PEDUNCULI axillares, oppositi.

PEDICELLI communes corymboso-dichotomi, bracteis subulatis suffulti.

Tom. I.

FLORES breviter pedicellati bracteolâ lineari stipati.

CALYX marginalis, obsoletus.

COROLLA lutea. Tubus brevis. Limbus quinquefidus.

FILAMENTA tria, minima. Antherae subrotundae.

STIGMA trifidum.

SEMEN oblongo-tetragonum, denticulis minimis coronatum.

HABITAT in aridis locis arenosis Conceptionis Chile.

FLORET Septembri, Octobri et Novembri.

Explic. Icon. 1 Bracteola. 2 Flos. 3 Pistillum.

VALERIANA CRISPA.

13. V. floribus triandris, foliis inferioribus ovato-oblongis serratis; caulinis subpinnatis: foliolis lanceolatis, racemis dichotomis.

PLANTA herbacea.

RADIX fibrillosa.

CAULIS bipedalis, erectus, ramosus, fragilis, teres, striatus, cavus.

FOLIA opposita, petiolata: inferiora ovato-oblonga, dentato-serrata; caulina pinnata pinnatifidaque: foliola sessilia, reflexa, lanceolata, serrata, undulato-crispa; intima gradatim minora; extimum maximum.

RACEMI terminales, dichotomi.

COROLLA alba.

SEMEN coronatum.

HABITAT in Regni Chilensis pratis, arvis et agris, in Conceptionis, Puchacay et Cauguenes Provinciis.

FLORET Octobri, et Novembri.

VALERIANA CORNUCOPIAE.

14. V. floribus diandris ringentibus, foliis ovatis sessilibus. LINN. Sp. pl. p. 44.

PLANTA herbacea.

CAULIS semipedalis, erectus, simplex.

FLORES purpurei albique.

HABITAT in locis arenosis Chile.

FLORET Octobri, et Novembri.

VALERIANA PANICULATA. ICON. LXX.
Fig. a.

15. V. floribus triandris, foliis radicalibus indivisis cordatis acutis; caulinis pinnatis, paniculâ diffusâ.

PLANTA herbacea, villosa.

RADIX ramosa, fibrillosa, (odore foetido Valerianae Phu simillimo).

CAULES plures, aggregati, parum foliosi, ferè bipedales, erecti, teretes, obsoletè ancipites, striato-sulcati, cavi, simplicissimi.

FOLIA duo radicalia inferiora cordata, acuta, integerrima: reliqua et caulina ternata, impari-pinnataque: foliolis ovatis, acutis, denticulatis, intimis minoribus; impari acuminato: caulina opposita.

L

PETIOLI canaliculati, vaginantes.

PANICULA diffusa.

PEDUNCULI brachiati, distantes. *Pedicelli* dichotomi.

BRACTEOLAE duae sub singulis binis pedunculis et pedicellis, oppositae, parvae, lineares.

CALYX marginalis, decemangulatus.

COROLLA alba, minima. *Tubus* calcari minimo. *Limbus* quinquefidus.

STAMINA tria.

SEMINA oblonga, parum compressa, pappo ex calyce explicato formato, plumoso, decemradiato coronata.

HABITAT in locis uliginosis et petrosis Provinciae *Panathuarum* ad *Muña*.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Macaë*.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteola. 2 Corolla cum staminibus. 3 Eadem scissa. 4 Pistillum. 5 Semen.

VALERIANA LACINIATA. ICON. LXIX.

Fig. a.

16. V. floribus triandris, foliis radicalibus simplicibus; caulinis impari-pinnatis: foliolis laciniatis, pedunculis 5-12-floris.

VALERIANA (*chaerophylloides*) floribus triandris, foliis omnibus pinnatis: foliolis pinnatifidis laciniatis, pedunculis axillaribus. SMITH. *fasc. 3. p. 53. Ic. 53.*

PLANTA herbacea, succosa, nitida, glabra, annua.

RADIX fibrosa.

CAULIS bipedalis, erectus, teres, obsolete anceps, striatus, cavus, hyalinus, ramosus.

RAMI oppositi, consimiles.

FOLIA opposita petiolata, patentia, glabra; radicalia simplicia, subrhombea, incisa; caulina impari-pinnata: foliola opposita alternaque, duplicato-laciniata.

PETIOLI ad basim pubescentes.

PEDUNCULI axillares, solitarii, longi, filiformes, dichotomi, 5-12-flori.

BRACTEOLAE duae sub singulo pedicello, oppositae, lanceolatae.

CALYX: *Margo* quinquedentatus.

COROLLA infundibuliformis, alba. *Limbus* quinquepartitus; laciniis ovatis.

STAMINA: *Filamenta* tria, parum exserta. *Antherae* subrotundae.

STYLUS longitudine staminum, semitrifidus. *Stigmata* tria, divaricata.

SEMEN ovatum, nudum.

HABITAT in collibus *Limae* et *Chancay* inter rupes: affatim in nemoribus *Chinchao* et *Muña*.

FLORET à Majo ad Septembrem.

VULGO *Arvegilla*.

USUS: Incolae hanc plantam in manipulos redactam, et inter calidos cineres leviter torrefactam, ad morbosa grana seu eruptiones cutaneas inflammatorias ab umbra arboris *May-*

co nuncupatae provenientes, exstirpandas, partibus male affectis applicant, quod in nobismetipsis experti sumus.

Explic. Icon. 1 Calyx supra germen. 2 Corolla cum staminibus. 3 Eadem scissa. 4 Pistillum. 5 Semen.

VALERIANA INTERRUPTA. ICON. LXVII.

Fig. a.

17. V. floribus triandris, foliis pinnatifido-laciniatis interruptis; laciniis dentiformibus, corymbis involucretis.

PLANTA herbacea, succosa, glabra.

RADIX crassa, bifida, perennis.

SCAPI plures, teretes, striati, cavi.

FOLIA radicalia, pinnatifido-laciniata (*Scorzonerae laciniatae* haud dissimilia) laciniis interruptis, dentiformibus.

INFLORESCENTIA corymbosa, involucreta.

INVOLUCRUM diphyllum: foliis oppositis, pinnatifidis.

FLORES capitati, sessiles, bracteis linearibus distincti.

COROLLA alba, quinquefida.

STAMINA tria, exserta.

HABITAT in alpibus *Tarmae* Provinciae ad *Diezmo* sedem.

FLORET Aprili, et Majo.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. 3 Corolla cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Semen.

VALERIANA DECUSSATA. ICON. LXX.

Fig. b.

18. V. floribus triandris, foliis impari-pinnatis; foliolis lanceolatis, intimis minimis, paniculâ decussatâ, pedunculis dichotomis.

PLANTA herbacea, pubescens, incana.

CAULIS erectus, subscandens, tripedalis, teres, striatus, cavus, leviter pubescens.

FOLIA breviter petiolata, impari-pinnata; foliola lanceolata, remotè denticulata, subtus tomentosa, incana, supra pubescentia; intima minima; extima gradatim majora.

FLORES paniculati: panicula maxima.

PEDUNCULI decussati.

PEDICELLI dichotomi, horizontales.

BRACTEOLAE duae sub singulis binis pedunculis et pedicellis, oppositae, lineares.

COROLLA minima, alba.

SEMINA pappo plumoso, 10-12 radiato coronata.

HABITAT in *Huanuci* sepibus et locis petrosis.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos cum bractea. 2 Corolla cum staminibus. 3 Eadem scissa. 4 Pistillum. 5 Semen.

VALERIANA VIRGATA. ICON. LXVI. Fig. b.

19. V. floribus triandris, foliis pinnatis: foliolis bi-trifidis; laciniis linearibus, paniculâ subcorymbosâ.

PLANTA suffruticosa, glabra, (habitu *Tagetis minutae*).

CAULIS tripedalis, ramosissimus, tetragonus, striatus, parum cavus, obsolete pubescens.

RAMI consimiles , virgati , erecti. *Ramuli* patentiusculi.
 FOLIA opposita , impari-pinnata : *foliola* minuta , nonnulla
 integra, bi-trifidave, pauciora quadrifida; *laciniis* linearibus
 integerrimis emarginatisque , supra nitidis.

PANICULA subcorymbosa.

PEDUNCULI brachiati.

PEDICELLI superiores dichotomi.

BRACTEOLAE oppositae , lineares, acutae, persistentes.

FLORES ex dichotomiis , sessiles.

CALYX marginalis.

COROLLA alba.

STAMINA tria , exserta.

STIGMA oblongum , bifidum.

SEMEN papposum , ovato-oblongum , compressum , margina-
 le , hinc striatum , inde dorso elevato.

HABITAT in *Cantae* Provinciae praeruptis.

FLORET Martio , Aprili et Majo.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. 3 Corolla scissa cum stami-
 nibus. 4 Pistillum. 5 Semina antice et postice visa.

VALERIANA GLOBIFLORA. Icon. LXV.
 Fig. b.

20. V. floribus triandris , foliis pinnatis : foliolis sinuato-den-
 tatis , bracteis spathulatis , capitulis globosis.

PLANTA herbacea , pilosa , humilis.

RADIX bi-trifida , crassiuscula , fibrillosa.

SCAPI plures , semipalmares , teretes , striati.

FOLIA radicalia , petiolata , scapi ferè longitudine , pinnata;
foliola sessilia , sinuato-dentata.

FLORES sessiles , in capitulum globosum collecti , *bracteis* nu-
 merosis , spathulatis , submembranaceis , glabris distincti.

CALYX marginalis.

COROLLA alba , quinquefida.

STAMINA tria , exserta.

STIGMA bifidum.

SEMEN papposum.

HABITAT in alpibus *Cantae* et *Tarmae*, praecipuè ad *Bombom*.

FLORET Majo , et Junio.

Explic. Icon. 1 Flos cum bractea. 2 Pistillum. 3 Semen.

HETERANTHERA. Gen. pl. Fl. Per. et Chil.
 pag. 9. Icon. II.

HETERANTHERA RENIFORMIS. Icon. LXXI.
 Fig. a.

1. H. foliis reniformibus , caule repente.

PLANTA herbacea , stolonifera.

RADIX fibrosa; *radiculis* plurimis è singulo geniculo vertici-
 llatis , fibrillosis.

CAULIS repens , ramosus , articulatus , teres , striatus.

SPATHAE communes ex caulis articulationibus , oblongae ,
 convolutae , membranaceae , striatae , tenuissimae , pel-
 lucidae , folia et fructificationes adhuc teneras clau-
 dentes.

FOLIA alterna , petiolata , reniformia , integerrima , glabra ,
 subtus lineata.

PETIOLI longissimi , semiamplexicaules , margine membra-
 naceo , teretes , leviter striati , cavi.

PEDUNCULI è medio petiolorum , solitarii , recurvati , triqua-
 driflori.

FLORES alterni , breviter pedicellati , intra spatham oblon-
 gam , acumine lineari terminatam , primum convolutam ,
 tandem reflexam.

COROLLA ex albo-viridis.

HABITAT in Provincia *Cercado*, in paludibus et stagnatis *Lu-
 rin*, *Limae*, *Surco*, *Miraflores*, *Magdalena* et *Luriganchu*.

FLORET Decembri , et Januario.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Stamina. 3 Pistillum. 4 Capsula co-
 rollâ marcidâ involuta. 5 Eadem à corolla libera. 6 Cap-
 sula transversim secta. 7 Eadem longitudinaliter scissa.
 8 Semina. 9 Spatha aperta , ut insertio florum conspiciatur.

COMMELINA. LINN. Gen. pl. p. 38.

COMMELINA HISPIDA. Icon. LXXIII. Fig. a.

1. C. corollis aequalibus , foliis ovato-lanceolatis obtusis his-
 pidulis margine scabris , pedunculis subquinquefloris.

PLANTA herbacea , sesquiulnaris.

RADIX fibrosa.

CAULIS erectus , teres , articulatus , striatus , pubescens.

FOLIA alterna , vaginantia , ovato-lanceolata , obtusa , utrin-
 que hispidula , 11-17nervia , margine scabra; *majora* bi-
 palmaria.

VAGINAE membranaceae , ore ciliatae , antice lineâ villosâ ,
 subpurpurascens.

PEDUNCULI è vaginis solitarii , oppositifolii , foliis paulò bre-
 viores , subpatentes , superne incrassati.

SPATHA cordata , compressa , deflexa , nervosa , hispidula ,
 margine ciliata , quadri-sexflora.

PEDICELLI recurvati: *Spatha* parva , lanceolata , concava sub
 singulo flore.

COROLLA: *Petala* sex , caerulea: *duo* ex tribus exterioribus
 obovata ; *alterum* oblongum , concavum ; *interiora tria*
 maxima , emarginata , ovalia , concava , breviter ungui-
 culata.

NECTARIA tria , staminiformia , capitulo stellaeformi , luteo.

FILAMENTA tria , subulata. *Antherae* oblongo-lineares , sul-
 catae , utrinque emarginatae.

GERMEN superum , trigonum. *Stylus* filiformis , declinatus.

STIGMA subcapitatum , obsolete tridentatum.

CAPSULA ovata , trigona , trilocularis , trivalvis , membra-
 nacea.

SEMINA compressa.

HABITAT in *Camanae* Provinciae collibus *Atiquipa*, vulgo
Lomas de Atiquipa , ubi Joannes Tafalla descripsit et
 delineavit.

FLORET tempore pluviarum , scilicet ab Aprili ad Augustum.

Explic. Icon. 1 Pistillum. 2 Capsula. 3 Eadem aperta. 4 Se-
 mina.

COMMELINA FASCICULATA. ICON. LXXII.

Fig. b.

2. C. corollis aequalibus, foliis lanceolatis acutis, vaginis ciliatis, caule assurgenti, radice fasciculata.

PLANTA herbacea, perennis.

RADIX fasciculata, tuberosa: tuberculis oblongis, teretibus, pendulis, lanuginosis.

CAULIS assurgens, striatus, pilosus: pilis deciduis.

FOLIA alterna, vaginantia, carinata, lanceolata, acuta, angusta, integerrima, novemnervia, subtus magis pubescentia, villis deciduis.

VAGINAE ore ciliatae.

SPATHA cordata, carinata, compressa.

PEDUNCULI gemini, villosi: alter tenuis, longus, uni-biflorus; alter crassiusculus, brevis, quadri-quinqueflorus.

FLORES breviter pedicellati.

PETALA interiora aequalia, caerulea: exteriora breviora, albida.

ANTHERAE lineares, basi bifidae.

STIGMA tridentatum.

HABITAT in collibus, et arvis Chancay et Lima.

FLORET Augusto, et Septembri.

COMMELINA GRACILIS. ICON. LXXII.

Fig. a.

3. C. corollis aequalibus, foliis ovatis acutis margine scabris, vaginis longis ciliatis, caule repente.

PLANTA herbacea.

RADIX fibrosa.

CAULIS bipedalis, gracilis, repens, ramosus, teres, geniculatus, striatus, glaber, saepe purpurascens.

RAMI alterni, consimiles.

FOLIA alterna, ovata, acuta, nervosa, integerrima, marginibus retrorsum scabris, utrinque glabra, vaginantia, ferè petiolata.

VAGINAE longae, membranaceae, pellucidae, ciliatae.

SPATHAE cordatae, compressae, ciliatae, persistentes.

PEDUNCULI longitudine ferè spathae, solitarii, quinqueflori, saepe gemini; alter uni-biflorus; alter tri-quadriflorus.

PEDICELLI erecti, in fructu recurvati.

PETALA tria exteriora albida, ovata, parva, concava, quorum duo latiora; interiora tria caerulea, subrotunda, subundulata, quorum duo majora patentia, pedicellata; tertium sessile, concavum.

NECTARIA duo, subulata, staminiformia, tenuia, brevia, furcata, lutescentia.

STAMINA: Filamenta tria, subulata, longitudine petalorum interiorum, declinata. Antherae ovatae, bifidae.

GERMEN ovatum. Stylus subulatus, incurvus, longitudine staminum. Stigma obsoletè tridentatum.

CAPSULA ovata, acuminata, triangularis, trisulca, trilocularis, trivalvis.

SEMINA bina, angulata.

HABITAT in cultis et humidis locis Huanuci et Lima.

FLORET per totum ferè annum.

Explic. Icon. 1 Petalum.

COMMELINA NERVOSA.

4. C. corollis subaequalibus, foliis lanceolatis, 16 nervibus, vaginis hirsutis, caule erecto.

PLANTA herbacea.

CAULIS tripedalis, erectus.

FOLIA alterna, subpetiolata, lanceolata, acuta, supra nitida, utrinque glabra, basi hirsuta, erecta, decidua.

VAGINAE nervosae, ore hirsutae.

PEDUNCULI axillares.

SPATHAE cordatae, multiflorae.

COROLLA purpureo-violacea.

HABITAT in umbrosis ad Cuchero vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

HIPPOCRATEA. LINN. Gen. pl. p. 34.

JACQ. 9. Coa Plum. 35.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. Perianthium minimum, pentaphyllum: foliolis subrotundis, concavis: inferum, deciduum.

COR. Petala quinque, ovata, apice biexcavata.

STAM. Filamenta tria in urceolum, germen involventem, coalita, supernè libera, subulata, basi latiora, erecta, longitudine corollae. Antherae erectae, reniformes, biloculares, bivalves, supernè dehiscentes.

PIST. Germen obovatum, trigonum. Stylus subulatus, apice trisulcus, erectus, longitudine staminum. Stigma trigonum.

PER. Capsulae tres, obovatae, emarginatae, compressae, striatae, uniloculares, 5-6spermae, bivalves: valvulis carinatis, compressis.

SEM. oblongo-reniformia, infernè aucta alâ membranaceâ, receptaculo insidentia.

HIPPOCRATEA VIRIDIS. ICON. LXXIV. Fig. a.

1. H. corymbis dichotomis, foliis ovatis obtusè acuminatis.

FRUTEX scandens, triorgyalis, glaber.

CAULIS teres, ramosus.

RAMI brachiati, teretes.

FOLIA opposita, petiolata, patentia, ovata, obtusè acuminata, integerrima, subcoriacea, supra nitida, nonnulla oblonga, leviter serrata.

PETIOLI canaliculati, contorti, breves.

PEDUNCULI axillares terminalesque; foliis dimidiò breviores, dichotomi, corymbosi.

PEDICELLI bracteolis parvis, ovatis, acutis, concavis suffulti.

FLORES parvi, lutei.

CAPSULAE virides, pollicares.

HABITAT in nemoribus *Andium* ad *Pozuzo* vicum.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Stamina in urceolum cum pistillo. 4 Stamina libera. 5 Pistillum. 6 Capsulae. 7 Capsula dehiscens. 8 Semen.

ANTHODON.

CHARACTER GENERICUS.

CAL. Perianthium pentaphyllum: *foliolis* subrotundis, dentato-ciliatis, concavis, marginibus invicem incumbentibus: inferum, deciduum.

COR. Petala quinque, inaequalia, ovato-oblonga, dentato-ciliata, patentia, calyce triplò longiora.

Nectarium: *Discus* minimus, cyathiformis, inter petala et stamina.

STAM. Filamenta tria, linearia, plana, nectarii longitudine. *Antherae* erectae, subreniformes, biloculares, bivalves, rimâ transversali supernè dehiscentes.

PIST. Germen ovatum. *Stylus* brevis. *Stigma* obtusum.

PER. non offendimus.

Obs. Genus *Hippocrateae* Jacquini et Tonsellae Schreberi vel *Tonteleae* Aublet affine. Genus *Anthodon* à foliolis calycinis et petalis dentato-ciliatis nominavimus.

ANTHODON DECUSSATUM. ICON. LXXIV. Fig. b.

1. *A. corymbis* dichotomis, foliis oblongis leviter serratis.

FRUTEX volubili-scandens.

CAULIS ramosissimus, teres.

RAMI brachiati, teretes, cinerei: *teneri* purpurascens.

FOLIA opposita, petiolata, oblonga, acuminata, nonnulla ovata, leviter serrata, saepe serrato-crenata, utrinque glabra, supra nitida, patentia.

PETIOLI canaliculati, contorti.

PEDUNCULI axillares, tetragoni, solitarii: *foliis* breviores, dichotomi, corymbosi.

PEDICELLI breves; *bracteolis* oppositis, ovatis, acutis, concavis, apice ciliatis suffulti.

FLORES parvi, lutei.

HABITAT in nemoribus *Andium* prope *Pozuzo* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Stamina. 4 Nectarium. 5 Pistillum.

CALLISIA. LINN. Gen. pl. p. 39.

CALLISIA REPENS. ICON. LXXIII. Fig. b.

1. *C. foliis* cordatis vaginantibus, vaginis subtrifloris.

CALLISIA (repens.) JACQ. *Pictur. p. 12. t. 14. LINN.*

Sp. pl. p. 116.

PLANTA herbacea, glabra, repens.

CAULES plures, repentes, ramosi, teretes.

RAMI assurgentes.

Tom. I.

FOLIA alterna, vaginantia, cordata, acuta, enervia, nitida, carnosa, hyalina, margine purpureo, obsolete denticulato-ciliata, nonnulla acuminata, integerrima.

VAGINAE ore villosae, punctis purpureis maculatae.

FLORES è vaginis parvis breviter pedunculati, virides, 3 ad 6 ex singula vagina, sed plerumque tres, totidem *bracteis* subulatis, ciliatis, membranaceis distincti.

CALYCIS Folium inferius dorso ciliatum, reliquis majus.

STIGMA bilobum, penicilliforme.

CAPSULA lentiformis, acuminata, bilocularis, bivalvis: dissepimento contrario.

SEMINA compressa, subtrigona, hinc plana, inde umbilicata, radiata, fusca.

Obs. Reliqua ut in Charactere generico *Callisiae* Jacquini.

HABITAT ad urbem *Huanuci* sub fruticibus aliisque plantis.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos cum bractea. 2 Capsula. 3 Eadem dehiscens aucta. 4 Semina.

CALYXHYMENIA. Ortega Decad. I. p. 5.

ICON. I.

CALYXHYMENIA EXPANSA. ICON. LXXV. Fig. a.

1. *C. floribus* dichotomo-corymbosis, foliis ovatis subrepandis glabris, staminibus corollae longitudine.

PLANTA perennis, glabra.

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULIS sexpedalis, erectus, teres, striatus, alternatim ramosus, subdivisus, geniculatus.

RAMI consimiles, supernè inaequaliter expansi.

FOLIA opposita; *alterum* majus; distantia, petiolata, ovata, acuta, subrepanda, venosa, obsolete crenulata: *floralia* subsessilia.

PEDUNCULI terminales, dichotomo-corymbosi, 6-11 flori.

FLORES pedicellati; *pedicellis* inaequalibus, parum viscosis.

CALYX pubescens, glutinosus, quinquefidus: *laciniis* ovatis, acutis.

COROLLA purpurea, subcampanulata. *Tubus* longitudine ferè calycis. *Limbus* plicabilis, patens, quinquefidus: *laciniis* ovatis, emarginatis.

STAMINA tria, corollae longitudine.

SEMEN oblongo-obovatum, scabrum.

HABITAT in collibus aridis *Chancay* et *Limae* ad *Amancaes*.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Nectarium cum staminibus in basi corollae scissâ aucta. 4 Pistillum. 5 Drupa in calyce expanso. 6 Drupa. 7 Eadem longitudinaliter secta. 8 Nucleus.

CALYXHYMENIA OVATA. ICON. LXXV. Fig. b.

2. *C. floribus* dichotomo-corymbosis, foliis ovatis viscosis hirsutis, staminibus longitudine ferè corollae.

PLANTA perennis, viscosa, hirsuta: *villi* inaequales, articulati et glanduliferi.

CAULIS erectus, tripedalis, subdivisus, teres, geniculatus, ramosus.

RAMI consimiles, patentes.

FOLIA opposita, petiolata, ovata, acuta, integerrima, margine scabra, crassa, parum venosa; *alterum* majus.

PEDUNCULI terminales; dichotomi, corymbosi.

PEDICELLI uniflori, breves.

CALYCES quinquefidi, parvi, crescentes in membranam venoso-reticulatam, patentissimam.

COROLLA rubra, calyce duplò major. *Tubus* brevissimus. *Limbus* patens, plicatilis.

STAMINA tria, corollae ferè longitudine.

SEMEN obovatum, laeve.

HABITAT in collibus *Chancay* Provinciae ad *Huaura* oppidum, et in montibus *Lachay*, *Pasamayo* et *Jequan*.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Villi articulati et glanduliferi aucti.

CALYXHYMENIA PROSTRATA. ICON. LXXV. Fig. c.

3. C. floribus subcorymbosis, foliis cordatis ovatisque, staminibus corollâ brevioribus.

PLANTA herbacea, leviter pubescens, prostrata.

CAULIS tripedalis, teres, leviter striatus, articulatus, ramosus.

RAMI consimiles, alterni, subdivisi, supernè dichotomi.

FOLIA opposita, petiolata, patentia, lata, cordata ovataque, obtusa acutaque, repando-undulata, obsolete crenulata, venosa: *alterum* majus.

PEDUNCULI axillares terminalesque, et ex dichotomiis, breves, quinque-ocloffori, glandulosi.

FLORES subcorymbosi, breviter pedicellati.

CALYX campanulatus, semiquinquefidus: *laciniis* ovatis, acutis, erectis: inferum, persistens.

COROLLA calyce triplò longior, purpurea. *Tubus* calyce brevior. *Limbus* patens, plicabilis, quinquefidus: *laciniis* emarginatis.

STAMINA: *Filamenta* tria, filiformia, corollâ breviora.

Obs. *Germen* ab insectis malè affectum in coccum globosum, acuminatum, magnum, fungosum, purpureum, tomentosum abijt.

HABITAT in collibus dictis *Lomas de Atiquipa*, in *Cama-nae* Provincia, unde ad nos Joannes Tafalla descriptionem, iconem et plantam siccam misit.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VULGO Pegapega.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla cum staminibus scissa, cui nectarium subjectum. 3 Calyx. 4 Pistillum. 5 Drupa.

CALYXHYMENIA VISCOSA.

4. C. floribus paniculatis, foliis cordatis, staminibus corolla duplò longioribus.

MIRABILIS (*viscosa*) floribus racemosis, foliis cordatis,

orbiculato-acutis, tomentosus. CAVANILL. Icon. vol. I. pag. 13. num. 17. t. 19.

PLANTA perennis, hirsutissima, viscosissima: *villi* inaequales, articulati, glanduliferi.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULIS orgyalis, erectus, ramosus, teres, leviter striatus, geniculatus.

RAMI consimiles, brachiati, patentes.

FOLIA opposita, longè petiolata, cordata, acuta obtusaque, integerrima, repanda, venosa: *alterum* majus.

PETIOLI subteretes, striati.

PEDUNCULI axillares terminalesque in paniculam brachiatam, maximam, foliosam: *foliolis* minimis, oppositis, sessilibus, cordatis.

FLORES solitarii, breviter pedicellati.

PEDICELLI in flore erecti, in fructu recurvi.

CALYX inferus, in flore parvus, erectus, quinquefidus; post floris decidentiam pentagonus, plicatus, in fructu maximus, membranaceus, expansus, rugosus, venoso-reticulatus, quinquelobus.

COROLLA purpureo-rosea. *Tubus* brevissimus. *Limbus* patens, plicatus, calyce triplò major, campanulato-rotatus.

STAMINA: *Filamenta* tria, purpurea, corollâ duplò longiora. *Antherae* luteae.

STYLUS et *Stigma* purpureum.

DRUPA oblonga, pentagona, angulis rugosa, in centro calycis.

HABITAT affatim in versuris et plateis *Huanuci* urbis.

FLORET per totum ferè annum. In Reg. Hort. Matrit. floret à Julio ad Novembrem è seminibus missis per nosmetipsos.

XYRIS. LINN. Gen. pl. p. 39.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Gluma* diphylla: *valvulis* oblongis, carinatis, aequalibus, conniventibus.

COR. *Petala* tria, longè unguiculata. *Lamina* ovata, plana, patens, integra: *Ungues* angustissimi, lineares, glumae longitudine.

Nectarium: *Fila* tria, capillaria, longitudine stigmatum, apice penicilliformia, petalis alternantia.

STAM. *Filamenta* tria, filiformia, apicibus unguium petalorum inserta, erecto-potentia, stigmatibus longiora. *Antherae* erectae, ovatae.

PIST. *Germen* oblongum, superum. *Stylus* filiformis, erectus. *Stigmata* tria, erecto-potentia, obtusa, simplicia.

PER. *Capsula* oblonga, unilocularis, trivalvis.

SEM. nonnulla, oblonga, receptaculo columnari suis pedicellis inserta.

XYRIS SUBULATA. ICON. LXXI. Fig. b.

1. X. spica bi-triflorâ, scapo unifloro, foliis subulatis.

PLANTA herbacea, parva, caespitosa.

RADIX fibrosa.

FOLIA disticha, infernè equitantia, subulata, subpollicaria, basi villosa.

SCAPUS unicus ex singula propagine erectus, filiformis, gracilis, ferè bipalmaris, uniflorus, folio unico vaginatus.

SPICA oblonga, imbricata, saepius triflora, aliquando biflora: squamis sex, ovatis, concavis; flosculos duos, saepe tres claudentibus.

COROLLA lutea.

HABITAT in altis frigidis *Pillao* locis humidis, stagnatisque.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Petala cum staminibus. 3 Fila trianectarii. 4 Pistillum. 5 Capsula. 6 Eadem aperta. 7 Semina in receptaculo. 8 Semina.

CYPERUS. LINN. *Gen. pl. p. 41.*

CYPERUS NIGER.

1. C. culmo triquetronudo glabro, umbellâ foliosâ, pedunculis plurimis longis, spicis laxis nigricantibus.

PLANTA annua.

RADIX fibrosa.

CULMUS triquetrus, glaber.

FOLIA ensiformia, canaliculata, glabra.

UMBELLA foliosa.

PEDUNCULI plurimi, longi, glabri.

SPICAE laxae, nigricantes.

HABITAT in inundatis et stagnatis Provinciae *Cercado* et *Chanca*.

FLORET Junio, et Julio.

CYPERUS STRIATUS.

2. C. culmo tereti leviter striato retrorsum scabro, foliis subulatis canaliculatis.

RADIX fibrosa.

CULMUS erectus, teres, filiformis, leviter striatus, retrorsum scaber, foliis paulò longior.

FOLIA usque ad medium vaginantia, subulata, canaliculata, infernè margine ciliata.

GLUMAE ovatae, carinatae, atro-purpureae.

SEMEN triquetrum, acuminatum, nitidum.

HABITAT in collibus aridis *Tarmae* oppidi.

FLORET à Januario ad Martium.

SCIRPUS. LINN. *Gen. pl. p. 41.*

SCIRPUS FRAGRANS.

1. S. culmo tereti striato nudo, spicis ovatis pedunculatis inaequalibus; terminalibus umbellatis.

PLANTA herbacea, caespitosa.

RADIX fasciculata, fibrosa, capillaris, odoratissima.

CULMUS solitarius, erectus, bipalmaris, simplicissimus, eno-

dis, nudus, filiformis, teres, striatus, pubescens, foliis ferè duplò longior.

FOLIA setacea, hinc plana, sulcata, inde semiteretia, erecta, pubescentia.

SPICAE sex, terminales, pedunculatae, umbellatae, ovatae, inaequales; *intermediae* breviores, rarius divisae, ut plurimum squamis novem compositae.

INVOLUCRUM polyphyllum: *foliolis* setaceis; *exteriori* spiculis duplò longiori.

CALYX: *Spica* ovata, undique imbricata: *squamis* ovatis, carinatis, erectis, flores distinguuntibus, purpurascens.

COROLLA nulla.

STAMINA: *Filamenta* tria, longitudine germinis. *Antherae* oblongae.

PISTILLUM: *Germen* parvum. *Stylus* filiformis, squamae longitudine. *Stigmata* tria, capillaria.

PERICARPIUM nullum.

SEMEN unicum, triquetrum, supernè crassius, acuminatum, nudum, glabrum.

HABITAT in nemorum runcationibus, vernaculè *Carpales* dictis, *Pillao* ad *Iscutunam*.

FLORET Septembri, et Octobri.

DIGYNIA.

MILIUM. LINN. *Gen. pl. p. 47.*

MILIUM NIGRICANS.

1. M. floribus paniculatis confertis, valvulis calycinis nitidis nigrescentibus, foliis ensiformibus longissimis latis.

RADIX fibrosa.

CULMI plurimi, erecti, biorgyales, teretes, farcti.

FOLIA ensiformia, longissima, lata, plana, nervosa, utrinque glabra, nitidiuscula, margine retrorsum aspero serrulata; *vaginae* convolutae.

PANICULA racemosa, composita, conferta; *pedunculis* cernuis.

GLUMAE uniflorae: sub singulo flosculo fertili *alii* duo flosculi parvi, omnino steriles.

CALYCINAE *Valvulae* nitidae.

SEMEN subrotundum, pallidum; *valvulis* calycinis nigricantibus obvolutum.

COLITUR in *Pillao*, *Cuchero* et *Pueblo nuevo*.

FLORET Octobri.

VERNACULE *Maiz de Guinea* nomen audit.

USUS. E seminibus torrefactis, quae Peruviani *Camcha* appellant, albissimam farinam praeparant, quâ potum *Ullpu* dictum et cibum *Mazamorra* nuncupatum conficiunt.

PASPALUM. LINN. *Gen. pl. p. 46.*

PASPALUM PURPUREUM.

1. P. culmis infernè divisis, paniculâ oblongâ, spicis linearibus, floribus secundis bifariam imbricatis.

MILIUM (latifolium) culmo ramoso, paniculae ramis simplicissimis; floribus cernuis muticis duplici ordine imbricatis. CAVAN. vol. 3. p. 37. tab. 273.

PLANTA herbacea, laevis, glabra.

RADIX fibrosa, albida.

CULMI numerosi, bi-tripediales, infernè divisi et radican-tes, erecti, solidi; geniculis approximatis, purpurascen-tibus.

FOLIA alterna, semilanceolata; vaginae à geniculo ad ge-niculum convolutae, ore coarctatae, purpurascen-tes.

PANICULA terminalis, bi-tripalmaris, purpurea, oblonga; composita plurimis spicis, sparsis, approximatis, linea-ribus, breviter pedicellatis, primum erectis, deinde pa-tentibus, tandem strictis.

FLORES secundi, duplici serie imbricati, alternantes, sub-sessiles.

CALYX: Gluma uniflora, bivalvis, compressa: valvulis oblongis, acuminatis, subaequalibus, purpurascen-tibus, extus disco rugoso scabris, marginibus involutis.

COROLLA: Gluma calyce brevior, bivalvis: valvulis ferè aequalibus, oblongis, obtusis, membranaceis, nitidis, glabris; alterà latiori, exterius convexâ, interius conca-vâ, angustiore planam semiamplexante.

FILAMENTA tria, capillaria, corollâ longiora. Antherae li-neares, supernè infernèque bifidae, apice utrinque pol-len effundentes.

PISTILLUM: Germen parvum. Styli duo. Stigmata alba, pe-nicilliformia, longiuscula.

SEMEN oblongum, nitidum, hinc convexum, inde planum.

HABITAT in Peruviae cultis, et in Hort. Reg. Matri-tensi singulis annis colitur è seminibus missis per nos-metipsos.

FLORET per totum ferè annum, in locis calidis et maritimis. VERNACULE Maizillo.

USUS: Haec utilissima planta, quae praestantissimum pabu-lum belluis suppeditat, inter segetes Limae, Chancay, Huanuci ceterisque locis calidis et maritimis inter Medi-cam sativam copiosè crescit, ibique ter ad annum meti-tur; quapropter per Europam ad eosdem usus propagari meretur.

Obs. Hoc Genus Milio valde affine est, atque adeo in unum idemque haec duo Genera redigi debere, exsistimat Jos. PAVON.

PANICUM. LINN. Gen. pl. p. 46.

PANICUM PURPUREUM.

1. P. spica tereti, involucris 12setis inaequalibus flosculo majoribus unifloris, culmo tereti ramoso.

PLANTA herbacea.

CULMUS erectus, teres, glaber, nitidus, quadripedalis.

FOLIA alterna, lanceolata, acuta, quinquenervia.

SPICA longa, paleaceo-virescens.

FLOSCULI alterni, breviter pedicellati, uniflori, involucre setaceo cincti.

GLUMA trivalvis, mutica: valvulâ exteriori duplò minori.

STIGMATA purpurea, plumosa, antherarum longitudine.

SEMEN unicum, oblongum, ferè planum, inclusum.

HABITAT in praeruptis Tarmae ad Acobamba vicum.

FLORET Majo, et Junio.

BRIZA. LINN. Gen. pl. p. 46.

BRIZA MEDIA.

1. B. spiculis ovatis, calyce flosculis brevior. LINN. Sp. pl. p. 194.

HABITAT in campis Tarmae et argillosis Regni Chilensis.

FLORET Aprili, et Majo.

MOLLUGO. LINN. Gen. pl. p. 58.

MOLLUGO RADIATA.

1. M. caulibus procumbentibus radiatis, foliis obovatis acuminatis.

PLANTA herbacea.

CAULES plures, ferè duodecim, radiatim positi, procum-bentes, spithamaei, inaequales, dichotomi, leviter pu-bescentes.

FOLIA opposita, petiolata, obovata cum brevi acumine, in-tegerrima: nonnulla ex axillis inaequalia, multo breviora.

FLORES axillares, sessiles, conferti, bracteolis subulatis dis-tincti.

Obs. Calycem clausum semper offendimus.

HABITAT in inundatis locis Conceptionis Chile ad Mochita et Carcamo terminum.

FLORET Febuario, et Martio.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA MONOGYNIA.

SCABIOSA. LINN. *Gen. pl.* p. 64.SCABIOSA SYMPAGANTHERA. ICON. LXXVI. *Fig. a.*

1. *S.* corollulis quinquefidis, calyce proprio unico membranaceo, foliis inferioribus spathulato-cuneiformibus supernè laciniatis.

PLANTA herbacea.

RADIX fibrosa.

CAULES plures, ferè bipedales, erecti, teretes, obsolete striati, virgati, supernè in pedunculos nudos foliososque divisi, leviter pilosi.

FOLIA inferiora congesta, spathulato-cuneiformia; superiora alterna, distantia, sub lanceolata: omnia supernè laciniata, margine villosa ciliata.

CAPITULA solitaria, magna, convexa.

CALYX: *Perianthium commune* multiflorum, monophyllum, multipartitum: *laciniis* lanceolatis, integris laciniatisque, patentibus, inaequalibus.

Perianthium proprium unicum, membranaceum, quinquefidum: *laciniis* subrotundis.

COROLLA *universalis* aequalis.

PROPRIA infundibuliformis: *Tubus* tenuissimus, viridis: *Limbus* erectus, albus, quinquefidus, aequalis.

STAMINA: *Filamenta* quinque, brevissima, fauci corollae inserta. *Antherae* lineares, valde approximatae in cylindrum, corollâ brevius.

PISTILLUM: *Germen* inferum, propriâ vaginâ tanquam in fundo calycis involutum. *Stylus* filiformis, corollâ longior. *Stigma* oblongum.

PERICARPIUM nullum.

SEMINA solitaria, oblonga, involuta, calyce proprio coronata. *Receptaculum commune* convexum, paleaceum; paleis subulatis, rigidis, subspinosis.

HABITAT in arenosis *Conceptionis Chile* ad *Penco* viam.

FLORET Novembri, et Decembri.

Obs. Calycem exteriorem proprium nullum offendimus.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla scissa cum staminibus. 3 Stamina. 4 Squama receptaculi.

ALLIONIA. LINN. *Gen. pl.* p. 65.

ALLIONIA INCARNATA.

1. *A.* foliis oblique ovato-cordatis; altero majori, calycibus triphyllis.

ALLIONIA (incarnata) foliis oblique cordatis, calycibus triphyllis trifloris. *Sp. pl.* p. 289. L'HERIT. *fasc. 4.* p. 63. *tab. 31.*

Tom. I.

WEDELIA. LOEFLING. *it.* 180.

PLANTA herbacea.

RADIX fusiformis.

CAULES plures, prostrati, diffusi, teretes, villosi, saepe purascentes.

FOLIA opposita, petiolata, hinc oblique ovata, obtusa, inde oblique cordata, acuta, repanda, utrinque pubescentia, subtus albicantia, crassiuscula, integerrima: alterum quadruplò brevius.

PEDUNCULI solitarii binique ex singulis axillis foliorum minorum, longitudine folii: alter altero brevior.

FLORES incarnati.

CALYX *Perianthium commune* triphyllum, triflorum, trigonum; *foliolis* ovatis, concavis; persistens.

Perianthium proprium nullum.COROLLA *universalis* aggregata, triflora, aequalis.

Propria intra singulum angulum calycis, tubulosa, germi-
ni insidens. *Tubus* angustus, superne sensim ampliatus.

Limbus erectus, inaequalis, latere exteriori exsertus, obtusè trifidus: *laciniis* bifidis, latere interiore deliquescentibus.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, setacea, corollâ breviora. *Antherae* subrotundae.

PISTILLUM: *Germen* inferum, intus convexum, extus concavum; marginibus inflexis, argutè dentato-serratis. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, subrotundum, simplex.

PERICARPIUM nullum.

CALYX semina fovens.

SEMINA solitaria, nuda, oblongo-obovata, intus convexa, extus concava, aucta alis inflexis, argutè dentato-serratis, in cujus centro lineae duae glandularum subrotundarum, parallelae excurrunt.

HABITAT in arenosis ad *Huanuci* urbem.

FLORET tempore pluviarum, praesertim Novembri et Decembri.

CALLICARPA. LINN. *Gen. pl.* p. 73.

CALLICARPA GLOBIFLORA. ICON. LXXVII. *Fig. b.*

1. *C.* foliis oblongo-lanceolatis dentato-serratis integerrimis-
que, cymis dichotomis.

FRUTEX triorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, ramosus, medullosus, teres.

RAMI acute tetragoni, incani, ad articulationes compressi et latiores.

FOLIA opposita, petiolata, oblongo-lanceolata, acuta, ad basim attenuata, hinc dentato-serrata, inde integerrima, venosissima, magna.

N

PEDUNCULI axillares, solitarii, foliis triplò breviores.

FLORES cymosi. *Cymae* dichotomae, ferè globosae, cinereae.

PEDICELLI bracteolis subulatis suffulti, ad basim attenuati.

CALYX campanulato-tubulosus; limbo quadrifido, erecto, acuminato; inferus, persistens, cinereus.

COROLLA infundibuliformis, alba. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* quadripartitus; *laciniis* ovatis, patentibus.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, filiformia, corollâ longiora. *Antherae* ovatae, incumbentes.

PISTILLUM: *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis. *Stigmata* duo, subulata, longa.

PERICARPIUM: *Bacca* globosa, unilocularis, rubicunda, pisi magnitudine.

SEMINA quatuor, trigona.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* vicum.

FLORET Octobri, et Novembri.

Obs. Ad hoc Genus referendae sunt *Manabea villosa*, *arborescens*, et *laevis*. AUBLET pag. 61-64-66. pl. 23-24-25.

Explic. Icon. 1 Flos cum bractea. 2 Eadem scissa cum staminibus. 3 Pistillum. 4 Bacca cum calyce. 5 Eadem secta. 6 Semina.

CALLICARPA CORDIFOLIA. ICON. LXXVII.

Fig. a.

2. C. foliis cordatis ovatisque acutis integerrimis, cymis brachiatis.

FRUTEX triorgyalis, hirsutus.

CAULIS erectus, infernè ramosus, teres, medullosus (habitu *Sambuci*).

RAMI patentes, obtuse tetragoni: *teneri* secundum articulationes compressi, densè pubescentes.

FOLIA opposita, petiolata, integerrima, acuta, utrinque hirsuta: *inferiora* cordata; *superiora* ovata.

PEDUNCULI axillares, solitarii, subpatentes, foliis dimidio breviores, multiflori.

FLORES cymosi. *Cymae* brachiatae.

PEDICELLI bracteolis subulatis stipati, infernè angustati.

CALYX: *Perianthium* campanulatum, quadrifidum; *laciniis* ovatis, acutis: inferum, persistens.

COROLLA infundibuliformis, albo-lutescens. *Tubus* cylindricus, longitudine calycis. *Limbus* quadripartitus; *laciniis* ovatis, obtusis, patentibus.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, filiformia, fauci inserta, basi villosa, corollâ longiora. *Antherae* ovatae, simplices, incumbentes.

PISTILLUM: *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, corollâ duplo longior. *Stigmata* duo, subulata, subpatentia.

PERICARPIUM: *Bacca* obovata, unilocularis, tetrasperma, apice puncto umbilicato notata, aurantii coloris.

SEMINA quatuor, obovato-oblonga, extus rugoso-striata, pulpâ rubicundâ mollissimâ distincta, gibba, cortice calloso vestita.

HABITAT in Provinciae *Panatahuarum* nemoribus ad *Muña*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Pistillum. 4 Bacca cum calyce. 5 Eadem secta. 6 Semina.

AEGIPHILA. LINN. Gen. pl. p. 73.

AEGIPHILA MULTIFLORA. ICON. LXXVI.

Fig. b.

1. AE. foliis oblongis, floribus axillaribus congestis.

FRUTEX triorgyalis. (*Corni* habitu).

CAULIS erectus, subcinereus, ramosus, medullosus.

RAMI brachiati, obtusè tetragoni, granulosi, secundum articulationes compressi; *teneri* purpurei, hirsuti.

FOLIA opposita, petiolata, oblongo-obovata, et ovato-lanceolata, acuminata, subtus venosa, lanuginoso-pubescentia, integerrima.

PETIOLI purpurei.

FLORES breviter pedicellati; *axillares* gemini ternique: *alii* ex cicatricularum axillis foliorum anni praecedentis congesti.

CALYX: *Perianthium* campanulatum, fauce leviter coarctatum. *Limbus* planus, quadridentatus: inferum, persistens, pubescens, purpureum.

COROLLA ante explicationem clavata, tandem infundibuliformis, rubro-purpurea. *Tubus* calyce triplo longior. *Limbus* quadripartitus; *laciniis* ovatis, reflexis.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, filiformia, fauci corollae inserta, corollâ breviora. *Antherae* incumbentes, oblongo-sagittatae.

PISTILLUM: *Germen* subrotundum, quadrisulcatum. *Stylus* filiformis, contortus, utrinque sulcatus. *Stigmata* duo, acuta, revoluta, contorta.

PERICARPIUM: *Bacca* tetragono-subrotunda, utrinque depressa, tetrasperma, obscurè purpurea.

SEMINA obovata, ossea, trigona, extus gibba, striata, unilocularia. *Nuclei* ejusdem formae.

HABITAT in circumviciniâ *Chacillae*, *Huassahuassi*, et *Pillao*, ad fluviorum margines.

FLORET Octobri, et Novembri, quo tempore folia etiam explicantur.

VERNACULE *Utcus*.

Usus: Lignum durissimum, ex quo stapedas conficiunt.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Stamen. 5 Pistillum.

SCOPARIA. LINN. Gen. pl. p. 77.

SCOPARIA DULCIS.

1. S. foliis ternis lanceolato-linearibus, superne serratis, deorsum attenuatis.

SCOPARIA dulcis. LINN. Sp. pl. p. 116.

PLANTA herbacea, glabra.

RADIX fibrosa.

CAULIS inferne ramosus, erectus, parum lignosus, tripedalis, hexagonus.

RAMI consimiles, virgati.

FOLIA verticillata, terna, lanceolato-lineararia, ultra medium ad apicem serrata, deorsum sensim attenuata.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uniflori, inferne attenuati.

CALYX quadripartitus.

COROLLA parva, alba.

CAPSULA ovato-conica.

HABITAT in ripis et arenosis *Limae*, *Chancay* et *Cuchero*.

FLORET à Majo ad Augustum.

VULGO *Escobilla*.

PLANTAGO. LINN. *Gen. pl. p. 77.*

PLANTAGO HIRSUTA. ICON. LXXVIII. *Fig. a.*

1. P. foliis lanceolato-linearibus trinerviis, denticulis raris-
simis, spica ovato-cylindrica.

PLANTA herbacea, densè hirsuta, incana.

RADIX ramosa, fibrillosa.

SCAPI tres, quatuor, quinque, axillares, filiformes, teretes,
erecti, inaequales, in fructu foliis duplò longiores.

FOLIA lanceolato-lineararia, denticulis 1-4 è medio ad api-
cem, trinervia, erecta, plana.

SPICA ovata, in fructu oblongo-cylindrica.

BRACTEAE ovatae, acutae, marginibus membranaceis.

COROLLAE *Limbus* patens, scariosus.

STAMINA vix corollae longitudine.

SEMINA plura.

HABITAT in collibus *Limae*, *Chancay* et *Tarmae*.

FLORET Septembri.

Obs. Affinis *Plantagini albicanti*.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. 3 Calyx. 4 Corolla cum
staminibus. 5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem aperta.
8 Semina.

PLANTAGO HISPIDULA. ICON. LXXVIII.

Fig. b.

2. P. acaulis, foliis linearibus integerrimis, scapis longissimis
scabris, spicâ oblongâ.

PLANTA herbacea.

RADIX filiformis, fibrillosa.

SCAPI plures, erecti, filiformes, teretes, foliis quadruplò lon-
giores, hispiduli, erecti.

FOLIA linearia, angustissima, subinflexa, integerrima, ci-
nerea, leviter pubescentia.

SPICA oblonga, semipollicaris, erecta.

BRACTEAE ovatae, concavae, marginibus scariosis, pubes-
centes.

CALYX margine scarioso, pubescens.

COROLLAE *Limbus* scariosus, reflexus.

STAMINA longitudine corollae.

STYLUS corollâ longior, villosus.

CAPSULA ovato-oblonga.

SEMINA plura.

HABITAT *Chile* locis arenosis, in *Conceptionis*, *Puchacay* et *Re-
re* Provinciis.

FLORET Novembri, et Decembri.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. 3 Calyx. 4 Corolla cum
staminibus. 5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem aperta.
8 Semina.

PLANTAGO SERICEA. ICON. LXXIX. *Fig. b.*

3. P. caule decumbente suffruticoso, foliis lineari-subulatis
incurvis sericeis, spicâ ovatâ.

PLANTA caespitosa, tomentoso-sericea.

RADIX fusiformis, fibrillis paucissimis, minimis.

CAULIS suffruticosus, decumbens, ramosus, dichotomus, post
foliorum delapsum per horum vestigia scaber.

FOLIA congesta, lineari-subulata, integerrima, incurva.

PEDUNCULI axillares, erecti, filiformes, teretes, tomentosi,
incani, tandem glabri, ferruginei, foliis triplò lon-
giores.

SPICA ovata, brevis.

SEMINA solitaria.

HABITAT in *Peruviae* collibus altis aridis ad *Tarmae* oppi-
dum, et prope *Tarmatambo* Castellum.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. 3 Calyx. 4 Corolla. 5 Sta-
mina. 6 Pistillum. 7 Capsula. 8 Eadem aperta. 9 Semina.

PLANTAGO CONGESTA. ICON. LXXIX.

Fig. a.

4. P. caule suffruticoso patenti, foliis lineari-subulatis patu-
lis villosis, spicâ ovato-oblongâ.

PLANTA suffruticosa, caespitosa, parum villosa.

RADIX fibrosa.

CAULES plures, patentes, brevissimi, congesti, simplicissi-
mi, undique foliis obvoluti.

FOLIA congesta, lineari-subulata, integerrima, patula, tan-
dem reflexa.

PEDUNCULI axillares, longissimi, filiformes, parum inflexi,
nudi.

SPICA ovato-oblonga.

BRACTEAE ovatae, concavae.

CALYX margine scarioso.

COROLLAE *Limbus* scariosus, reflexus.

STAMINA corollâ longiora. *Stylus* hirsutus.

SEMINA duo.

HABITAT in *Tarmae* Provinciae collibus circa *Huichay*,
Morocamcha et *Camcham* praedia.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Bractea. 2 Flos. 3 Calyx. 4 Corolla. 5 Sta-
mina. 6 Pistillum. 7 Capsula. 8 Eadem aperta. 9 Se-
mina.

BUDDLEJA. LINN. *Gen. pl.* p. 76.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

- CAL. *Perianthium* tetragonum, quadrifidum; *laciniis* acutis, erectis: inferum persistens.
- COR. campanulata. *Tubus* tetragonus, longitudine calycis. *Limbus* quadrifidus: *laciniis* ovatis, patentibus, calyce duplò longioribus.
- STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, brevissima, infra divisuras corollae tubo inserta. *Antherae* ovatae, parvae, incumbentes.
- PIST. *Germen* ovatum, villosum. *Stylus* brevis, utrinque sulcatus, corollà dimidiò brevior. *Stigma* oblongum, crassiusculum, utrinque lineatum, obsoletè emarginatum.
- PER. *Capsula* ovata, bisulca, bilocularis, bivalvis: *valvulis* bifidis.
- SEM. numerosa, minutissima, oblonga, apice compressa, margine brevissimo, membranaceo cincta, imbricata; *Receptaculo* ovato, fungoso inserta.

HABITUS.

Arbores aut *Frutices* tomentoso-lanuginosi. *Caulis* erectus aut diffusus. *Rami* obtusè tetragoni, brachiati. *Folia* opposita, venosissima, rugosa. *Stipulae* interfoliaceae, reniformes aut marginales. *Flores* racemoso-paniculati, aut spicato-verticillati, in capitula digesti. *Pedunculi* et *Pedicelli* bracteis suffulti. *Bracteolae* duae sub singulo calyce.

BUDDLEJA INCANA. ICON. LXXX. Fig. b.

1. B. foliis oblongis lanceolatisque crenulatis, stipulis marginalibus, pedunculis ternatim divisis, floribus capitatis. ARBOR sexorgyalis.
- TRUNCUS erectus, satis crassus, intortus, cortice scabro obtectus, comâ frondosâ patentem.
- RAMI brachiati; *teneri* obtusè tetragoni, tomentoso-lanuginosi, cortice lutescente vestiti, subarticulati.
- FOLIA breviter petiolata, oblonga lanceolataque, crenulata, subtus tomentoso-lanuginosa, canescentia, rugosa, supra glaberrima, nervo utrinque striato.
- PETIOLI canaliculati.
- STIPULAE: *Margines* semicirculares, interfoliaceae.
- RACEMI terminales, brachiati, subpaniculati, tomentoso-lanuginosi.
- PEDUNCULI ternatim divisi, bracteis linearibus, acutis suffulti.
- FLORES in capitula globosa, sessiles; *bracteolis* oppositis, subulatis distincti.
- BRACTEAE, *Bracteolae*, et *Calyces* tomentoso-lanuginosi.
- COROLLA crocea.
- HABITAT in *Peruviae* ripis, in *Cantae*, *Huaroheri*, *Tarmae* et *Huanuci* Provinciis.
- FLORET Majo, et Junio.
- VERNACULE *Quisuar*, et *Quisoar*.

Usus: Lignum satis durum ad varia utensilia perutile.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteis duabus. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem aperta. 8 Capsulae valvula anticè visa. 9 Receptacula connexa cum seminibus imbricatis. 10 Receptaculum nudum. 11 Semina.

BUDDLEJA GLOBOSA. ICON. LXXXIII. Fig. a.

2. B. foliis lanceolato-ovatis acutissimis crenatis, stipulis marginalibus, capitulis globosis.
- PALQUIN. FEWILL. *Peruv. t. 3. p. 51. planch. 38.*
Buddleja capitata? JACQUIN. *Collect. Vol. 2. p. 332.*
- FRUTEX biorgyalis, tomentoso-lanuginosus, incanus.
- CAULIS erectus, ramosissimus, teres.
- RAMI brachiati, obsoletè tetragoni.
- FOLIA breviter petiolata, lanceolato-ovata, acutissima, crenata, supra glabra, patentia, rugosissima.
- STIPULAE: *Margines* breves, semicirculares.
- PEDUNCULI axillares, solitarii, longi, foliis breviores, erecto-patentes, ultra medium *squamis* duabus, subulatis, oppositis.
- FLORES plurimi in capitulum globosum; in fructu ovatum, nucis juglandis magnitudine; aliquando Capitula gemella.
- COROLLAE aurantii coloris: *laciniis* subrotundis, reflexis.
- HABITAT in *Regni Chilensis* silvis umbrosis, et in hortis *Conceptionis* urbis.
- FLORET Novembri, et Decembri. In Regio Horto Matritensi, ubi semina perficere nequit, colitur sub dio, et floret mense Majo, et Junio.
- VERNACULE *Pagnin*, à FEWILLE *Palquin*.
- Usus: Foliorum pulvis ad ulcera cicatricanda inservit.
- Explic. Icon. 1. Flos cum bracteolis. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum.
- BUDDLEJA CONNATA. ICON. LXXXI. Fig. b.
3. B. foliis lanceolatis connatis crenatis, stipulis reniformibus, pedunculis solitariis capitatis.
- PLANTA frutescens.
- CAULES plures, orgyales, erecti, teretes, parum ramosi.
- RAMI hexagoni, striati, fragiles, tomentosi, incani.
- FOLIA connata, patentia, lanceolata, acuta, crenata, venosissima, rugosa: subtus tomentosa, incana; supra aspera, absque tomento.
- STIPULAE interfoliaceae, reniformes, crenatae.
- PEDUNCULI axillares terminalesque, foliorum ferè longitudine, solitarii, angulati, simplicissimi, saepe bifidi.
- BRACTEAE duae, oppositae, lineari-subulatae, patentes, infra florum capitulum.
- FLORES in capitulum globosum collecti, sessiles; *bracteolis* binis oppositis, subulatis distincti.
- CALYX et *Capsula* tomentosa.
- COROLLA luteo-crocea, fauce villosa.
- STAMINA longitudine faucis.

STYLUS corollâ brevior.

HABITAT in *Chanca* Provinciae segetibus et versuris, ad *Esquibel*, *Retes* et *Torreblanca* praedia.

FLORET Decembri, et Januario.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteolis. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Stamen. 5 Pistillum.

BUDDLEJA DIFFUSA. ICON. LXXX. Fig. a.

4. B. foliis ovatis subcordatisque acutis, stipulis reniformibus reflexis, pedunculis axillaribus, floribus capitatis.

PLANTA frutescens, tomentoso-lanuginosa, lutescens.

CAULIS subscandens, ramosissimus, diffusus, teres.

RAMI brachiati, patentes, obsolete tetragoni, diffusi.

FOLIA breviter petiolata, deflexa, ovata, subcordata ovato-lanceolataque, acuta, integerrima, nonnulla uno alterove denticulo notata, supra pubescentia, venosa, per petiolum decurrentia, rugosa.

STIPULAE interfoliaceae, reniformes, marginibus reflexis, persistentes.

PEDUNCULI axillares terminalesque, solitarii, gemini ternique, quorum duo tresve breves, simplices; reliqui longi, racemosi, foliosi. *Pedicelli* teretes.

FLORES capitati, sessiles, totidem *bracteolis* linearibus distincti.

COROLLA lutea. *Faux* villosa. *Limbus* reflexus.

SEMINA pauca ad maturitatem perveniunt.

HABITAT in circuitu *Huanuci* ad agrorum margines.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Quisoar*.

Explic. Icon. 1 Flos, cui bracteolae subjectae. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Pistillum. 6 Capsula.

BUDDLEJA AMERICANA. ICON. LXXXII. Fig. b.

5. B. foliis ovato-lanceolatis serratis, stipulis subreniformibus revolutis, racemis compositis subpaniculatis.

BUDDLEJA (*americana*) foliis ovatis. LINN. *Sp. pl.* p. 317.

VERBASI folio minore arbor, floribus spicatis luteis.

SLOAN. *Jam.* 139. *hist.* 2. p. 29. t. 173.

PLANTA frutescens, ferè biorgyalis, tomentoso-lanuginosa, incana.

CAULIS erectus, ramosissimus, obtusè tetragonus, cortice lutescente vestitus.

RAMI brachiati, obtusè tetragoni, secundum articulationes compressi.

FOLIA breviter petiolata, ovato-lanceolata, serrata; *majora* duplicato-serrata; *adultiora* supernè glabra, venosissima, venis approximatis.

STIPULAE interfoliaceae, breves, subreniformes, revolutae, integerrimae, rugosae.

RACEMI terminales, maximi, paniculati, plurimis spicis compositi.

Tom. I.

PEDUNCULI communes et partiales *bracteis* linearibus stipati.

FLORES verticillati, sessiles; *bracteolis* subulatis distincti.

BRACTEOLAE duae sub singulo calyce, subulatae.

COROLLA lutea, tetragona, fauce hirsuta, extus tomentosa.

HABITAT in *Muña* runcationibus, vernaculè *Carpales* dictis.

FLORET à Junio ad Septembrem.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteolis. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Stamen auctum. 6 Pistillum. 7 Capsula. 8 Eadem aperta. 9 Semina.

BUDDLEJA OCCIDENTALIS. ICON. LXXXII. Fig. a.

6. B. foliis lanceolatis acutis serratis integerrimisque, stipulis obsolete, floribus paniculatis, spicis verticillatis.

BUDDLEJA *occidentalis* foliis lanceolatis. LINN. *Sp. pl.* p. 317.

PLANTA frutescens, biorgyalis, tomentoso-lanuginosa, subferruginea.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI brachiati, obsolete tetragoni.

FOLIA petiolata, lanceolata, acuta, è medio ferè ad apicem serrata, saepe integerrima, patentia, venosissima, supernè glabra, apice obliquo integerrimo.

STIPULAE nullae, nisi *Margines* semicirculares.

RACEMI terminales, subpaniculati, compositi plurimis spicis brachiatis.

PEDUNCULI et *Pedicelli* bracteis lineari-lanceolatis stipati.

FLORES verticillati, congesti, sessiles, *bracteolis* subulatis distincti: *Verticilli* approximati.

BRACTEOLAE duae sub singulo calyce, subulatae.

COROLLA lutea.

HABITAT in circuitu *Limae* et *Chanca*, ad Margines fluviorum *Rimac* et *Pasamayo*.

FLORET per totum ferè annum.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteolis. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Stamen auctum. 6 Pistillum. 7 Capsula. 8 Eadem aperta. 9 Semina.

BUDDLEJA SPICATA. ICON. LXXXI. Fig. a.

7. B. foliis ovatis utrinque acutis serratis, stipulis marginalibus, spicis longissimis simplicibus.

PLANTA frutescens, triulnaris, tomentoso-lanuginosa, albicans.

CAULIS erectus, ramosus, obtusè tetragonus, cortice lutescente vestitus.

RAMI brachiati, consimiles, secundum articulationes compressi.

FOLIA petiolata, ovata, utrinque acuta, serrata; *majora* duplicato-serrata, venosa, venis alternis, distantibus.

STIPULAE nullae, nisi leves *Margines* interfoliaceae semicirculares.

SPICAE axillares terminalesque, solitariae, longissimae, pedales et ultra, simplices.

FLORES verticillati, congesti, sessiles, totidem *bracteolis* subulatis distincti.

COROLLA lutea, tetraquetra, quadrifida, extus tomentosa, fauce hirsutâ.

HABITAT abundè in versuris et aridis *Mutia*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteolis. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Stamen auctum. 6 Pistillum. 7 Capsula. 8 Eadem aperta. 9 Semina.

PALTORIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 13.*
ICON. XXXIII.

PALTORIA OVALIS. ICON. LXXXIV. Fig. b.

1. P. foliis ovalibus crenatis, pedunculis subtrifloris.

FRUTEX biorgyalis, ramosissimus.

CAULIS erectus, teres.

RAMI *teneri* angulosi, confertissimi, subverticillati.

FOLIA sparsa, conferta, ovalia, crenata, breviter petiolata, obtusa, supra nitida: nonnulla oblongo-obovata.

FLORES axillares.

PEDUNCULI solitarii, bi-triflori, pubescentes, ad medium *bracteolis duabus* minimis, nigris, ovatis.

COROLLA alba.

HABITAT in montibus altissimis, *Andium* dictis, Provinciae *Tarmae* ad *Churupallana* et *Siusa*.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Quinti*.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus.

4 Eadem postice visa. 5 Stamina. 6 Pistillum. 7 Bacca.

8 Eadem per medium secta. 9 Semina.

CONDALIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 11.*
ICON. II.

CONDALIA REPENS. ICON. LXXXIV. Fig. a.

1. C. foliis ovatis acutis, caule repente, pedunculis tri-multifloris umbellatis.

PLANTA herbacea, glabra pubescensque.

CAULES plures, ramosi, repentes, teretes, pedales; *teneri* nitidi, purpurascens.

FOLIA opposita, ovata, acuta, petiolata, venoso-lineata, nitida, patentia, plana, pubescentia, integerrima.

STIPULAE interfoliaceae, erectae, oppositae, subulatae.

PEDUNCULI axillares, alternantes, solitarii, foliis duplò breviores, tri-multiflori.

FLORES breviter pedicellati, umbellati, totidem *bracteolis* subulatis suffulti.

CALYCIS laciniae subulatae.

COROLLA purpurascens.

ANTHERAE oblongae.

STYLUS longitudine staminum.

BACCA caerulea, ovata.

SEMINA ferruginea, orbiculata, plana.

HABITAT in nemoribus *Panatahuarum* ad *Pillao*, *Cuchero* et *Chinchao* vicos.

FLORET à Julio ad Octobrem.

Obs. Plantae, quae in locis aridis crescunt, folia proferunt per margines tantum pubescentia: caulem et reliquas partes omnino glabras.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Stamina. 6 Pistillum. 7 Bacca. 8 Eadem transversim secta. 9 Receptacula cum seminibus. 10 Semina.

CONDALIA SESSILIS.

2. C. foliis oblongis acutis, floribus sessilibus congestis axillaribus.

PLANTA suffruticosa, tripedalis.

CAULIS erectus, teres, vix ramosus.

FOLIA opposita, oblonga, petiolata, integerrima, supra nitida, parum obliqua, aliquando oblongo-obovata.

STIPULAE interfoliaceae, ovatae, acutae, deciduae.

FLORES axillares, aggregati, sessiles.

COROLLA purpurascens.

BACCA purpurea, ovata.

SEMINA minutissima, fulvescentia.

HABITAT in *Chinchao* nemoribus, per runcationes et tramites.

FLORET Augusto, et Septembri.

CONDALIA OBOVATA.

3. C. foliis obovatis acuminatis, pedunculis aggregatis, floribus racemosis.

PLANTA suffruticosa, tripedalis.

CAULIS erectus, teres, parum ramosus.

FOLIA opposita, petiolata, obversè ovata, cum parvo acumine, integerrima, utrinque glabra.

PETIOLI purpurei.

STIPULAE interfoliaceae, ovatae, acutae, deciduae.

PEDUNCULI sex-octo ex singulâ axillâ, inaequales, pubescentes.

FLORES racemosi.

COROLLA albo-viridis.

BACCAE purpureae.

HABITAT in nemoribus *Andium* ad *Chinchao* montes.

FLORET Augusto, et Septembri.

CONDALIA LANCEOLATA.

4. C. foliis lanceolatis integerrimis, caule radicante, pedunculis multifloris.

PLANTA herbacea, tota densè pubescens.

RADIX fibrosa.

CAULIS radicans, succosus, fragilis, teres, ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, petiolata, lanceolata, acuta, integerrima.

STIPULAE interfoliaceae, subulatae, persistentes.

PEDUNCULI ex alterâ axillâ, solitarii, multiflori.

FLORES congesti, sessiles, *bracteolis* lanceolatis distincti.

CALYX superus, quadripartitus: *laciniis* lanceolatis, erectis, persistentibus.

COROLLA albo-violacea, infundibuliformis. *Tubus* longitudine calycis. *Faux* inflata. *Limbus* quadripartitus: *laciniis* lanceolatis, patentibus.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, brevissima, fauci inserta. *Antherae* lineares, basi bifidae.

PISTILLUM: *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigmata* duo, revoluta.

PERICARPIUM: *Bacca* caerulea, ovato-oblonga, calyce coronata, bilocularis, spongiosa, cava.

SEMINA plurima, orbiculato-angulosa, à pulpa libera: *receptaculo* dissepimento utrinque adnato affixa.

HABITAT in nemoribus *Cuchero* et *Chinchao* locis umbrosis.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

OHIGGINSIA.

CHARACTER GENERICUS.

CAL. *Perianthium* quadridentatum: *denticulis* acutis, brevibus; superum, persistens.

COR. infundibuliformis. *Tubus* brevis. *Limbus* quadripartitus, patens: *laciniis* lanceolatis.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevissima, linearia, plana, fauci inserta. *Antherae* lineares, basi bifidae, biloculares, incumbentes.

PIST. *Germen* oblongum, obtusè tetragonum. *Stylus* filiformis, corollae longitudine. *Stigmata* duo, oblonga, exserta.

PER. *Bacca* oblonga, obtusè tetragona, bisulca, calyce coronata, umbilicata, bilocularis. *Dissepimentum* contrarium.

SEM. numerosa, minima, oblonga. *Receptaculum* dissepimento utrinque adnatum, bialatum; alis brevibus.

CHARACTER DIFFERENTIALIS.

COR. infundibuliformis; limbo quadripartito. *Cal.* quadridentatus. *Bacca* bilocularis, bisulca, umbilicata, polysperma.

Obs. Genus *Bertierae* et *Hameliae* affine.

Genus dicatum Ex.^{mo} D. D. Ambrosio O-Higgins, de Vallenar, Ossorno Marchioni, in Peruviani Regni Proregi, viro apprime erudito, qui cum esset Chilensi Regno Praefectus ad Araucanorum fines, summâ nos humanitate, et liberalissimis officiis prosequutus est, et itinera Botanica instituentes comitatus.

HABITUS.

Plantae fruticosa. Caules erecti, obtusè tetragoni. Folia opposita aut verticillata. Petiolus et Nervus subtus utrinque sulcatus. Stipulae interfoliaceae. Pedunculi axillares, aggregati, aut solitarii, multiflori.

OHIGGINSIA AGGREGATA. ICON. LXXXIII.

Fig. b.

1. O. foliis oppositis lanceolatis, pedunculis aggregatis verticillatis.

PLANTA fruticosa, tripedalis, glabra.

CAULIS erectus, parum ramosus, obtusè tetragonus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, patentia, petiolata, lanceolata, integerrima, venosa.

PETIOLUS et Nervus subtus utrinque sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, parvae, ovatae, acutae, caducae.

PEDUNCULI axillares, aggregati, in verticillos digesti, breves, inaequales, uniflori, ferè quatuordecim ex singula axilla.

FLORES patentes.

CALYX parvus, quadridentatus.

COROLLA purpureo-lutescens.

PISTILLUM: *Germen* inferum. *Stylus* filiformis. *Stigmata* quatuor, acuta, longitudine ferè corollae.

PERICARPIUM: *Bacca* ovalis subrotundaque, obsoletè tetragona, quadrilocularis.

SEMINA oblonga, numerosa, minima: *Receptacula* quatuor, dissepimento adnata.

Obs. Numerus Stigmatum et Baccae loculamentorum quaternus, quibus notis à *O. verticillatâ* et *obovatâ* dissentit, ceteris autem notis genericis et habitu convenit. Rarissimos Flores pentandros offendimus, qui numerum retinebant in reliquis fructificationis partibus.

HABITAT in nemoribus *Cuchero*, *Chinchao* et *Muña*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa cum staminibus. 2 Stamina aucta. 3 Pistillum cum calyce. 4 Bacca. 5 Eadem per medium secta. 6 Semina.

OHIGGINSIA VERTICILLATA. ICON. LXXXV.

Fig. a.

2. O. foliis ternis lanceolatis, pedunculis solitariis dependentibus subquadrifloris.

PLANTA fruticosa, tripedalis.

CAULIS erectus, parum ramosus, obtusè tetragonus.

RAMI teretes, scabri, superne tomentosi.

FOLIA verticillato-terna, petiolata, lanceolata, integerrima, supra nitida, subtus leviter pubescentia, venosissima, deflexa.

PETIOLI et Nervi subtus utrinque sulcati.

STIPULAE tres, interfoliaceae, minimae, denticuliformes, supra sulcatae, deciduae.

PEDUNCULI axillares, solitarii, filiformes, foliis dimidio breviores, tri-quinqueflori, rarius septemflori, purpurei, ad basim foliosi, dependentes.

FLORES pedicellati, alterni.

CALYX purpureus.

COROLLA punicea. *Tubus* tetragonus, calyce longior.

BACCAE albo-purpurascentes, oblongae, tetragonae, biloculares.

HABITAT in *Muña* nemoribus per runcationes, vernaculè *Carpales* dictas.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx cum pistillo. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Bacca. 6 Eadem transversim secta. 7 Semina.

OHIGGINSLA OBOVATA. ICON. LXXXV.

Fig. b.

3. O. foliis oppositis obovatis acuminatis, pedunculis aggregatis multifloris inaequalibus.

PLANTA fruticosa, quadripedalis.

CAULIS erectus, obtusè tetragonus, parum ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, petiolata, patentia, lata, obovata, acuminata, integerrima, venosissima, utrinque glabra: nonnulla oblonga.

PETIOLUS et *Nervus* subtus utrinque sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, minimae, ovatae, caducae.

PEDUNCULI axillares, 4 ad 7 aggregati, inaequales, patentes, petiolorum ferè longitudine, multiflori, purpurei.

FLORES breviter pedicellati, secundi.

CALYX minimus, quadridentatus.

COROLLA incarnata. *Tubus* brevis. *Limbus* patens.

BACCAE oblongae, purpureae.

HABITAT in umbrosis locis *Muña*.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla. 3 Eadem scissa cum staminibus, 4 Pistillum cum calyce. 5 Bacca. 6 Eadem transversim secta. 7 Semina.

GONZALAGUNIA. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 12. ICON. III.

GONZALAGUNIA. DEPENDENS. ICON. LXXXVI. Fig. a.

1. G. foliis ovatis-acutis, ramis dependentibus.

FRUTEX biorgyalis, incanus.

CAULIS erectus, ramosus, secundum articulationes compressus.

RAMI dependentes, tetragoni, lanuginosi, longissimi.

FOLIA opposita, petiolata, ovata, acuta, obsoletè crenata, subtus lanuginosa; supra rugosa, nitida, glabra.

STIPULAE interfoliaceae, oppositae, subulatae, persistentes.

RACEMI terminales, longissimi, lanuginosi, ad basim squamis subulatis, sparsis.

PEDUNCULI recurvi, bi-quadriflori, breves.

PEDICELLI *bracteolis* subulatis, persistentibus suffulti.

CALYX lanuginosus.

COROLLA purpureo-rosacea, lanuginosa.

BACCAE nigrae, utrinque depressae, lanuginosae.

COCCULAE fulvescentes.

SEMINA fusca.

HABITAT in *Chinchao* nemoribus, ad *Pati* praedium.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla scissa cum staminibus. 3 Pistillum cum calyce. 4 Bacca. 5 Eadem transversim secta. 6 Cocculae. 7 Coccula transversim secta. 8 Semina.

HEDYOTIS. LINN. Gen. pl. p. 66.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quadripartitum: *laciniis* lanceolatis, erectis: superum, persistens.

COR. infundibuliformis. *Tubus* oblongus, calyce longior.

Limbus quadripartitus: *laciniis* ovato-lanceolatis, patentibus, aequalibus.

STAM. *Filamenta* quatuor, brevia, filiformia, erecta, tubo infra incisuras inserta. *Antherae* oblongae, incumbentes.

PIST. *Germen* obcordatum. *Stylus* filiformis, longitudine ferè staminum. *Stigmata* duo.

PER. *Capsula* obcordata, didyma, calyce coronata, bilocularis, bivalvis; apice rimâ transversali dehiscens, *valvulis* bifidis. *Dissepimentum* contrarium.

SEM. pauca, oblonga, hinc convexa, inde concava, angulata. *Receptaculum* oblongum, dissepimento utrinque adnatum.

Obs. Calyx in fructu semiinferus.

HABITUS.

Plantae fruticosae aut herbaceae. *Caulis* erectus vel procumbens, ramosissimus, tetragonus aut teres. *Rami* confertissimi. *Folia* opposita. *Stipulae* interfoliaceae. *Pedunculi* terminales, solitarii, terni, quaterni, uni-quinqueflori.

HEDYOTIS THYMIFOLIA. ICON. LXXXVIII. Fig. a.

1. H. foliis linearibus, marginibus revolutis, floribus corymbosis.

PLANTA fruticosa, bipedalis.

RADIX ramosa.

CAULIS erectus, teres, infernè nudus, ramosissimus.

RAMI erecti, obtusè tetragoni, hispiduli.

FOLIA sessilia, linearia, marginibus revolutis, glabra.

STIPULAE duae, interfoliaceae, bipartitae; *laciniis* dentiformibus, adpressis.

FLORES terminales, corymbosi.

PEDUNCULI bi-quinqueflori.

COROLLA alba.

CAPSULA obcordata, bilocularis, bivalvis: *valvulis* bifidis.

SEMINA nigra, octo in singulo loculamento.

HABITAT in collibus altis *Tarmae* et *Caxatambo* Provinciarum.

FLORET Aprili, Majo et Junio.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Capsula cum calyce. 3 Capsula aperta. 4 Semina.

HEDYOTIS SETOSA. ICON. LXXXVIII. Fig. b.

2. H. foliis ovatis acutis cum acumine petiolatis, floribus terminalibus ternis.

PLANTA fruticosa, quadripedalis.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres.

RAMI confertissimi, vaginulis stipularum veluti articulati.

FOLIA breviter petiolata, ovata, acuta, cum acumine minimo, obsolete serrulata, glabra, subtus bilineata, coriacea.

STIPULAE interfoliaceae, membranaceae, connatae, ovatae, acutae, supernè multisetae.

PEDUNCULI terminales, terni, aliquando quaterni, uniflori, breves.

FLORES erecti.

COROLLA purpurea.

CAPSULA bilocularis, bivalvis; *valvulis* bifidis.

SEMINA nigra.

HABITAT in Andium montibus ad Churupallana et Huasahuassi tractus.

FLORET Novembri, et Decembri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Capsula cum calyce aperta. 7 Semina. 8 Folium auctum. 9 Stipula aucta.

HEDYOTIS FILIFORMIS. ICON. LXXXVII. Fig. b.

3. H. foliis linearibus acuminatis, caule ramosissimo filiformi repente, floribus solitariis terminalibus.

PLANTA herbacea, depressa, diffusa, (habitu *Galii*).

CAULIS ramosissimus, filiformis, tetragonus, repens.

RAMI consimiles.

FOLIA sessilia, linearia, setâ terminata, integerrima, leviter ciliata, subtus striata.

STIPULAE interfoliaceae, subulatae, ciliatae.

PEDUNCULI terminales, solitarii, uniflori.

COROLLA alba. *Limbus* patens, tandem reflexus.

STAMINA quatuor, corollae longitudine.

SEMINA orbiculata, angulata, nigra.

HABITAT in montibus frigidis Pillao ad Torrehuassi, Sillcai, Saria et Achapatumam.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Eadem scissa. 5 Pistillum. 6 Capsula cum calyce. 7 Eadem aperta. 8 Semina. 9 Folium auctum. 10 Stipula aucta.

HEDYOTIS CONFERTA. ICON. LXXXVII. Fig. a.

4. H. foliis linearibus acuminatis, caule ramosissimo repente, floribus terminalibus solitariis.

PLANTA suffruticosa.

CAULIS ramosissimus, tetragonus, repens.

RAMI confertissimi, obtusè tetragoni, repentes: *teneri* ad coelum spectantes.

Tom. I.

FOLIA connato-vaginantia, confertissima, parva, linearia, acuminata, glabra, plana, integerrima.

STIPULAE interfoliaceae, oppositae, subulatae.

PEDUNCULI terminales, solitarii, uniflori.

COROLLA alba.

ANTHERAE faucem claudentes, oblongae.

CAPSULA globosa, emarginata.

SEMINA subrotunda, nigra, angulata.

HABITAT in alpihus *Cantae* et *Tarmae* ad *Hacaybamba* et *Collquihirca*; et in *Collis Fodinâ*, vulgò *Mineral* del Cerro de *Yauricocha*. Ubi centum Argenti Mineræ molendina exercentur.

FLORET Aprili, et Majo.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Pistillum cum calyce. 6 Capsula cum calyce. 7 Eadem aperta. 8 Semina. 9 Folium auctum. 10 Stipula aucta.

HEDYOTIS JUNIPERIFOLIA. ICON. LXXXVII. Fig. c.

5. H. foliis linearibus margine revolutis, caule ramosissimo, floribus terminalibus ternis.

PLANTA suffruticosa, procumbens.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULES plures, semipedales, ramosissimi, tetragoni.

RAMI consimiles, conferti.

FOLIA linearia, parva, (*Juniperi* foliis similia) glabra, marginibus revolutis.

STIPULAE duae, interfoliaceae, ovatae, acutae.

PEDUNCULI terminales, triflori.

SEMINA oblonga, angulata, nigra.

HABITAT in *Tarmae* et *Cantae* altis frigidis, vernaculè *Punas* dictis, versus *Palcamayo*, *Casacamcha* et *Lauricocha*, ex qua lacu *Marañon fluvius* effluit.

FLORET Martio, et Aprili.

Explic. Icon. 1 Capsula cum calyce. 2 Eadem aperta. 3 Capsula à calyce libera, aperta. 4 Semina. 5 Folium auctum posticè visum.

OLDENLANDIA. LINN. Gen. pl. p. 83.

OLDENLANDIA UNIFLORA.

1. O. fructibus hispidis, pedunculis unifloris, caule repente, foliis ovatis.

OLDENLANDIA (*uniflora*) pedunculis simplicissimis lateralibus, fructibus hirtis, foliis subovatis acutis. LINN. *Sp. pl.* p. 337.

PLANTA herbacea.

CAULES plures, ramosissimi, repentes, filiformes, conferti.

RAMI consimiles, oppositi.

FOLIA subpetiolata, ovata, integerrima, nitida, glabra.

PETIOLI connati.

PEDUNCULI solitarii, uniflori.

CALYCES, *Germina Capsulae*que hirsutae.

FAUX corollae barbata.

SEMEN unicum in singulo loculamento.

HABITAT in *Regni Chilensis* locis humidis et scaturiginibus prope *Conceptionis* urbem, ad *Nonguen*, *Andalien* et *Palomares* tractus.

FLORET Febuario, et Martio.

MANETTIA. LINN. *Gen. pl. p. 75.*

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* 4-5 partitum : *laciniis* lanceolato-subulatis, patentibus ; superum, persistens.

COR. infundibuliformis, calyce duplò longior. *Tubus* cylindricus, basi clavatus. *Faux* barbâ clausa. *Limbus* quadri-quinquepartitus ; *laciniis* lanceolatis, reflexis.

STAM. *Filamenta* 4-5, brevissima, subulata, medio tubi inserta, hirsuta. *Antherae* lineares, erectae, basi bifidae, inclusae.

PIST. *Germen* obovatum, inferum. *Stylus* filiformis, longitudine tubi. *Stigma* bifidum : *laciniis* obtusis.

PER. *Capsula* oblongo-obovata, didyma, compressiuscula, 8-10 nervis, bilocularis, bivalvis : *valvulis* duplicatis, bifidis. *Dissepimentum* contrarium.

SEM. numerosa, minima, orbiculata, plana, compressa, alâ membranaceâ, inaequaliter crenato-dentatâ cincta, receptaculo oblongo, dissepimento utrinque adnato imbricata.

Obs. 1. *Plantae Portlandiis* nimis affines, et praesertim calyce, pericarpio, seminibus et receptaculis. Differunt *Portlandiae* à *Manettiis* corollâ ad medium quinquepartitâ, limbo magno ; *filamentis* ad basim corollae insertis, longitudine tubi ; *antheris* longissimis, exsertis, stigmate lineari, leviter bifido.

Obs. 2. Ad hoc Genus referenda est *Nacibea Aublet Guyan. tab. 37.* quod jam fecit Schreberus in suis Generibus plantarum. *Nectarium* Manettiae, sive *Margo* receptaculum ambiens, nihil aliud esse videtur, quàm vestigium corollae : *Capsula* verè bilocularis.

HABITUS.

Plantae volubiles, aut scandentes. *Caules* ramosissimi, teretes. *Folia* opposita, petiolata, integerrima. *Stipulae* interfoliaceae cum petiolis in vaginam connatae. *Pedunculi* axillares, solitarii, uni-multiflori, bracteati.

MANETTIA UMBELLATA. ICON. XC. Fig. a.

1. M. foliis ovatis subcordatisque, stipulis connatis acuminatis, pedunculis umbellatis multifloris.

PLANTA scandens, glabra, nitida.

CAULIS ramosus, scandens, teres, nitidus.

RAMI consimiles.

FOLIA petiolata, ovata subcordataque, deflexa, integerrima, supra nitida : *alia* acuta ; *alia* acuminata.

STIPULAE interfoliaceae, cum petiolis connatae, acuminatae, adpressae, persistentes.

PEDUNCULI axillares, umbellati, involucrati.

UMBELLA multiflora.

INVOLUCRUM bi-quadriphyllum : *foliolis* lanceolatis, connatis.

CALYX superus, quadripartitus : *laciniis* lanceolatis.

COROLLA caerulea. *Limbus* quadripartitus. *Faux* *Limbus*-que barbatus.

STAMINA quatuor.

STIGMA exsertum.

CAPSULAE glaucae, obovatae, didymae, biloculares, apice bivalves.

SEMINA compressa, alâ membranaceâ cincta, minima : *Receptaculo* oblongo, dissepimento contrario, utrinque adnato, imbricata.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Muñia* vicum.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Capsula cum calyce. 6 Eadem aperta. 7 Semen.

MANETTIA RACEMOSA. ICON. LXXXIX. Fig. a.

2. M. foliis ovatis oblongisque acuminatis, stipulis semicircularibus, pedunculis bi-multifloris.

PLANTA volubilis, pubescens.

CAULIS bi-quadrilunaris, teres, ramosus.

RAMI tetragoni, longissimi.

FOLIA petiolata, ovata oblongaque, acuminata, integerrima, venosa, secunda.

PETIOLI foliis duplò breviores.

STIPULAE interfoliaceae, cum petiolis connatae, semicirculares, acuminatae, adpressae, ciliatae, persistentes.

PEDUNCULI axillares, 2-12 flori, racemosi.

PEDICELLI bracteolis lineari-subulatis, oppositis sustentati.

CALYX 4-5 partitus, saepe 8-10 partitus.

COROLLA purpurascens, hirsuta.

CAPSULA ovalis, pubescens.

HABITAT in nemoribus *Cuchero* et *Chinchao*, ad *Cassape*, *Macora*, *Marimarchahua* et *Hualqui* praedia.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Obs. Calyx plerumque quadri-quinquepartitus, saepe octo-decempartitus : numerus frequens quinarius in calyce, corollâ et staminibus.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Pistillum. 4 Capsulae dimidia pars cum receptaculo aperta. 5 Semen. 6 Semen auctum.

MANETTIA ACUTIFOLIA. ICON. LXXXIX. Fig. b.

3. M. foliis lanceolatis acutissimis, stipulis connatis acuminatis, pedunculis uni-trifloris.

PLANTA volubilis, glabra.

CAULIS ramosissimus, teres.

RAMI filiformes.

FOLIA petiolata, lanceolata, acutissima, integerrima.

STIPULAE interfoliaceae, connatae cum petiolis in vaginae formam, acuminatae.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uni-triflori, involucrati bracteâ vaginante, bifidâ, acutâ.

CALYX quadridentatus, acutus.

COROLLA purpurea, quadrifida, ferè hypocrateriformis, extus fauceque villosa.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, brevissima, fauci inserta. *Antherae* lineares, corollâ breviores, erectae.

STIGMA bilobum, antherarum longitudine.

CAPSULA bilocularis, bivalvis: *valvulis* duplicatis, bifidis.

SEMINA orbiculata, compressa, margine membranaceo cincta.

HABITAT in Provinciae *Panatahuarum* nemoribus inter *Acomayo* vicum et *Pati* praedium.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Pistillum. 4 Capsula aperta. 5 Semen. 6 Semen auctum.

GALIUM. LINN. Gen. pl. p. 69.

GALIUM HIRSUTUM.

1. G. foliis quaternis lanceolatis aequalibus, caule ramosissimo, pedunculis unifloris, fructibus scabris.

PLANTA herbacea, hirsuta, procumbens.

CAULES plures, diffusi, ramosissimi, tetragonales, pedales.

RAMI consimiles, filiformes.

FOLIA quaterna, approximata, sessilia, lanceolata, integerrima, aequalia, reflexa, parva.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uniflori, breves.

INVOLUCRA tetraphylla.

BACCAE parvae, scabrae.

HABITAT in *Canta* Provinciae umbrosis ad *Culluay* et *Obrajillo* vicos.

FLORET Majo, et Junio.

GALIUM CORYMBOSUM.

2. G. foliis quaternis lanceolato-oblongis ciliatis, ramulis corymbosis, pedunculis unifloris, fructibus glabris.

PLANTA herbacea, pumila.

RADIX fibrosa.

CAULIS filiformis, tenuissimus, ad genicula ramosus, repens.

RAMI alternantes, erecti, pollicares, ramosi: *Ramuli* oppositi, in corymbum ferè digesti, supernè dichotomi, tetragoni.

FOLIA quaterna, sessilia, approximata, lanceolato-oblonga, integerrima, obsolete ciliata, utrinque glabra.

INVOLUCRA tetraphylla.

FLORES terminales, solitarii, breviter pedunculati.

BACCAE glabrae.

HABITAT in alpibus *Tarmae* ad *Bombom*.

FLORET Martio, et Aprili.

Obs. Radices, et Caules post desiccationem inter papyros adservati, rubro colore eas tingunt.

GALIUM CILIATUM.

3. G. foliis quaternis lanceolatis ciliatis aequalibus reflexis, pedunculis tetraphyllis unifloris, fructibus glabris.

PLANTA herbacea, glabra.

RADIX ramosa, fibrillosa, rubra.

CAULES ramosissimi, procumbentes, diffusi, tetragoni.

RAMI consimiles, alternantes.

FOLIA quaterna, subpetiolata, reflexa, lanceolata, integerrima, ciliata, aequalia, setâ terminata.

PEDUNCULI axillares, solitarii, alterni oppositique, uniflori, filiformes, tetraphylli.

COROLLA alba, rotata; *laciniis* acutis, apice purpureis, setâ unâ alterâve terminatis.

BACCAE nutantes.

HABITAT in collibus aridis *Tarmae*, *Chancay*, et *Cheuchin*.

FLORET Januario, Febuario et Martio.

GALIUM OVALE.

4. G. foliis quaternis oblongo-ovalibus acuminatis aequalibus, caule diffuso, pedunculis unifloris, fructibus glabris.

PLANTA herbacea, hirsuta, scandens.

CAULIS diffusus, filiformis, ramosus, hirsutus, tetragonus, scaber.

RAMI alterni, consimiles.

FOLIA quaterna, brevissimè petiolata, oblongo-ovalia, acuminata, venosa, integerrima, aequalia, patentia, tandem reflexa: *floralia* quaterna, patentia.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uniflori, filiformes, foliis paulò breviores.

COROLLA alba, parva.

BACCAE cernuae, glabrae, rubrae.

HABITAT in versuris et ruderatis *Chancay*, *Huanuci* et *Lima* ad *Surco* viam.

FLORET Febuario, et Martio.

GALIUM LAPPACEUM.

5. G. foliis quaternis hispidis oblongis acuminatis, pedunculis unifloris, fructibus lappaceis.

PLANTA herbacea, subscandens.

CAULIS ramosissimus, tetragonus.

RAMI consimiles, villosi, oppositi, superne dichotomi; *terminales* terni.

FOLIA quaterna, breviter petiolata, oblonga, saepe oblongo-obovata, acuminata, utrinque hispida, integerrima; *superiora* quadruplò minora; *terminalia* terna, oblongo-lanceolata.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uniflori.

BACCAE duae, lappaceae; altera aliquando abortit.

HABITAT in circuitu *Huanuci* urbis ad *Puelles* collem.

FLORET Majo, et Aprili.

GALIUM CROCEUM.

6. G. foliis quaternis linearibus ciliatis subtus scabriusculis, pedunculis unifloris, fructibus glabris rubris.

PLANTA herbacea.

CAULIS prostratus, ramosus.

RAMI palmares, debiles, tetragoni.

FOLIA quaterna, linearia, nitida, ciliata, subtus scabriuscula.

PEDUNCULI axillares, oppositi, breves, uniflori.

INVOLUCRUM tetraphyllum.

COROLLA quadrifida, rarius trifida.

BACCAE glabrae, rubro-croceae.

HABITAT in declivibus aridis *Tarmae* oppidi, et *Huanuci* urbis, passim ad *Rondos* vicum, et *Nauyan* praedium.

FLORET Januario, et Febuario.

GALIUM MUCRONATUM.

7. *G.* foliis quaternis linearibus mucronatis aequalibus, corollis quadrifidis, fructibus glabris lacteis.

PLANTA herbacea.

CAULES diffusi, tetragoni, laeves, graciles, ramosi.

RAMI consimiles.

FOLIA quaterna, linearia, mucronata, glabra, aequalia, supra lucida.

PEDUNCULI duo, oppositi, axillares, solitarii, uniflori, breves.

COROLLA alba, quadrifida.

BACCAE glabrae, lactis colore.

HABITAT in aridis *Curis* ad *Tarmam*.

FLORET Febuario, et Martio.

NERTERIA. SMITH. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil.*
p. 17. ICON. XXXIII.

NERTERIA REPENS. ICON. XC. Fig. b.

1. *N.* foliis ovatis subrotundisque, caule repente.

GOMOZIA (granadensis). LINN. *fil. supp.* p. 129.

NERTERIA (depressa). GAERTNER. *Sem.* p. 124. t. 26.

NERTERIA (depressa). SMITH. *Fasc.* 2. p. 28. Ic. 28.

PLANTA herbacea, glabra, succosa, tenera, procumbens.

RADIX fibrosa, fibrillis tenuissimis.

CAULES ramosissimi, filiformes, teretes, repentes.

RAMI axillares, breves, assurgentes.

FOLIA opposita, petiolata, ovata, subrotunda, integerrima, patentia: aliqua cordata.

PETIOLI supra sulcati, foliorum ferè longitudine.

FLORES in apicibus ramulorum, solitarii, sessiles, parvi, bracteolis duabus, minimis, caducis suffulti.

CALYX: *Margo* minimus, superus.

COROLLA alba, quadrifida: *laciniis* patentibus, postremo reflexis.

BACCA rubra, nitida, grani piperis magnitudine, puncto obsoleto umbilicata, tenera.

SEMINA lutea.

HABITAT in scaturiginibus *Huassahuassi* et *Muña*, inter muscos, et ad rivulorum margines apud *Conceptionem Chile*.

FLORET à Decembri ad Majum.

Obs. Cum *Nerteriae* nomen *plantam depressam* significet, triviale nomen *depressa* ab Smith impositum, in *repens* mutavimus.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Stamina. 6 Pistillum. 7 Bacca. 8 Eadem transversim secta. 9 Semina.

SPERMACOCE. LINN. *Gen. pl.* p. 66.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* quadripartitum: *laciniis* acutis: superum, persistens.

COR. infundibuliformis. *Tubus* calyce paulò longior. *Limbus* quadrifidus: *laciniis* ovatis, acutis, aequalibus, intus villosis.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, infra incisuras corollae inserta. *Antherae* lineares, incumbentes, basi bifidae, corollae longitudine.

PIST. *Germen* obovatum, didymum. *Stylus* filiformis, erectus, longitudine tubi corollae. *Stigmata* duo, erecta, oblonga.

CAPS. obovata, didyma, bilocularis, calyce coronata, bivalvis; *valvulis* bifidis.

SEM. solitaria, oblonga, extus convexa, intus concava.

HABITUS.

Plantae suffruticosae, aut herbaceae. *Caules* erecti, aut procumbentes. *Rami* tetragoni. *Folia* connato-vaginantia, nervoso-lineata, plicata. *Vaginae* ciliatae. *Flores* axillares terminalesque, verticillati, capitati, vel corymbosi.

SPERMACOCE CORYMBOSA. ICON. XCI. Fig. a.

1. *S.* foliis lanceolatis nervosis plicatis, floribus dichotomo-corymbosis terminalibus.

PLANTA suffruticosa.

CAULIS bipedalis, erectus, ramosus, teres, subferrugineus, cortice exteriori secedente.

RAMI alterni, tetragoni.

FOLIA connato-vaginantia, lanceolata, nervosa, plicata, integerrima, erecta, supra nitida, glabra.

VAGINAE ciliatae, ciliis longis, subulatis.

CORYMBI multiflori, terminales, dichotomi.

HABITAT in *Peruviae* montibus ad *Muña* vicum, in rudetis et runcationibus *Cormillá* et *Rinconadâ*.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum cum calyce. 5 Capsula calyce coronata. 6 Eadem aperta. 7 Semina.

SPERMACOCE ASSURGENS. ICON. XCII.
Fig. c.

2. *S.* foliis lanceolatis lineatis, margine scabris, verticillis parvis.

ANONYMOS americana foliis parietariae scabris, floribus albis, ad foliorum ortum vix conspicuis. FLUK. *Alm.* 33. tab. 136. f. 4.

PLANTA perennis.

CAULES plures, assurgentes, sesquipedales, purpurascens, ramosi, tetragoni, angulis retrorsum scabris.

FOLIA connato-vaginantia , lanceolata , lineata , integerrima ,
margine retrorsum scabra.

VAGINAE ciliatae.

FLORES verticillati , sessiles.

VERTICILLI parvi , multiflori.

CALYCES purpurei.

COROLLA albo-purpurascens.

SEMINA nigra , obovata.

HABITAT in ruderatis *Limae* , *Chancay* et *Huanuci*.

FLORET per totum annum.

VERNACULE in *Huanuco* appellatur *Uspica*.

Obs. *Anonymos americana* Plukenet potius cum hac plan-
ta convenit quam cum *Sperm. tenuiori* Linnaei et cum
Spermacoce verticillis tenuioribus Dillenii *Hort. Elth.*
p. 370. t. 277. f. 359. ideoque cum *Spermacoce nos-
tra* conjungenda videtur.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum
staminibus scissa. 5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem aper-
ta. 8 Semina.

SPERMACOCE CAPITATA. ICON. XCI. Fig. b.

3. S. foliis lanceolatis , verticillis globosis.

PLANTA suffruticosa.

CAULES plures , procumbentes , teretes , ramosi.

RAMI assurgentes , tetragoni , purpurascens , villosi.

FOLIA connato-vaginantia , sessilia , lanceolata , integerrima ,
margine retrorsum scabra , lineato-plicata , striata ,
utrinque glabra , horizontalia , tandem deflexa ; *termina-
lia* quaterna , quorum duo opposita breviora ; sub verti-
cillis inferioribus interdum sena octonaque , inaequalia.

VAGINAE ciliatae : *ciliis* longis , apice incrassato.

FLORES in verticillos capitatos , sessiles , numerosi.

COROLLA alba.

STAMINA longitudine corollae. *Antherae* incumbentes , sub-
violaceae.

STIGMA capitatum , obsolete emarginatum.

SEMINA solitaria , linearia , hinc convexa , inde sulcata , fulva.

HABITAT in declivibus montium , *Pillao* ad *Iscutunam*.

FLORET Augusto , Septembri et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteolis. 2 Stamina. 3 Pistillum.
4 Capsula cum calyce hians. 5 Eadem à calyce libera , aper-
ta. 6 Semina.

SPERMACOCE GRACILIS. ICON. XCII. Fig. a.

4. S. foliis lanceolatis angustis , ramis inferioribus oppositis ,
superioribus dichotomis , verticillis minimis.

PLANTA herbacea , semipedalis , glabra.

RADIX fibrosa.

CAULIS erectus , solitarius , tetragonus , gracilis , ramosus.

RAMI inferiores oppositi ; superiores dichotomi , inaequales ,
tetragoni.

FOLIA connato-vaginantia , lanceolata , angusta , integerrima ,
margine scabra , venosa ; venis alternis.

Tom. I.

VAGINAE ciliatae.

FLORES axillares , sessiles , verticillati.

VERTICILLI multiflori , minimi.

COROLLA alba , minima.

CAPSULAE et *Calyces* obsolete hispiduli.

HABITAT in *Huanuci* montium declivibus.

FLORET per totum annum.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Capsula. 3 Eadem aperta. 4 Semina.

KRAMERIA. LINN. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil.*
p. 14. ICON. III.

KRAMERIA TRIANDRA. ICON. XCIII.

1. K. foliis oblongis obovatisque acuminatis , floribus trian-
dris , corollis tetrapetalis.

PLANTA suffruticosa.

RADIX horizontalis , longissima , valde ramosa ; cortice cras-
so , extus atro-rubicundo , interius rubro , sapore intensè
stiptico , amaro.

CAULIS procumbens , ramosissimus , teres.

RAMI diffusi , bi-tripedales , infernè nudi , atri ; *teneri* seri-
cei , incani : *centralis* erectus.

FOLIA sparsa , sessilia , oblonga obovataque , acuminata ,
integerrima , utrinque sericea , incana.

FLORES ex axillis superioribus , solitarii , pedunculati ; *folio-
lis duobus* oppositis ad apicem , lanceolatis.

COROLLA extus sericea , intus glaberrima , nitida , laccae co-
loris.

NECTARIUM tetraphyllum : *foliola duo superiora* sejuncta ,
spathulata : *lateralia duo* subrotunda , intus concava , ex-
tus veluti squamata.

STAMINA tria , incarnata. *Antherae* urceolatae , pube peni-
cilli instar brevissimo terminatae.

STYLUS ruber.

DRUPA sicca , hirsuta , lappis obscure rubentibus obsita.

HABITAT in *Peruviae* declivibus montium argillosis , areno-
sis , et aridis , per *Huanuci* , *Tarmae* , *Cantae* , *Xauxae* ,
Huaroheri , *Caxatambo* et *Huamalies* Provincias , copio-
sè prope *Huanuci* urbem , ad *Puelles* collem.

FLORET per totum ferè annum , sed praesertim Octobri , et
Novembri.

VERNACULE *Ratanhia* in *Huanuco* dicitur. Tarmenses *Pu-
macuchu* , id est Calyptram Leonis , et *Mapato* , id est Plan-
tam tomentosam , nuncupant. Hispani tandem *Raiz para
los dientes* appellant.

VIRE ET USUS: Experientia in dies confirmat , specificum stip-
ticum hujus plantae radicem esse ad sanguinis fluxus sis-
tendos , et dysenterias corrigendas. Ad ulcera gingivarum
detergenda maximè opitulatur , ideoque dentes firmat , et
ob suam amaritudinem stomachum roborat. Extractum ef-
ficaciores vires habet , quam infusio aut decoctum radicum ,
quibus Incolae ad dentes detergendos utuntur. Dosis Ex-
tracti *Ratanhiae* in adultis drachma una.

Explic. Icon. 1 Foliola superiora et inferiora nectarii. 2 Pis-

tillum cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Drupa per medium secta, et Nucleus.

KRAMERIA PENTAPETALA. ICON. XCIV.

Fig. a.

2. K. foliis lineari-subulatis, floribus tetrandris, corollis pentapetalis.

PLANTA suffruticosa.

RADIX ramosa, longissima, horizontalis, extus atra, intus purpurea.

CAULIS procumbens, ramosissimus, teres.

RAMI alterni, filiformes, graciles: *teneri* suboppositi, assurgentes, villosi.

FOLIA alterna, sessilia, lineari-subulata, integerrima, subtus magis villosa.

PEDUNCULI ex axillis superioribus, solitarii, uniflori, filiformes, tomentosi: *foliolis duobus* ad medium oppositis, subulatis.

COROLLA pentapetala, subpapilionacea, extus villosa, intus obscure purpurea.

NECTARIUM triphyllum: *foliolo superiori* trifido, pedicellato, purpurascens: *laciniis* ovatis, membranaceis: *duabus lateralibus* subrotundis, concavis, crassis, marginatis, parum reflexis, lutescentibus.

STAMINA quatuor.

DRUPA sicca, hirsuta, glochidibus hamosis obvallata.

HABITAT in collibus argillosis ad *Panatahuarum* Provinciam.

FLORET Novembri, et Decembri.

Explic. Icon. 1 Flos cum foliolis floralibus. 2 Idem lateraliter visus. 3 Nectarium, Stamina et Pistillum. 4 Nectarii foliola tria. 5 Pistillum.

EMBOTHRIUM. LINN. *Gen. pl. p. 62. Fl. Per. et Chil. p. 15.* ICON. III.

EMBOTHRIUM LANCEOLATUM. ICON. XCVI.

1. E. foliis lanceolato-linearibus integerrimis.

FRUTEX biorgyalis, glaberrimus.

CAULIS erectus, ramosus, infernè nudus.

RAMI erecti, teretes, supernè foliosi.

FOLIA sparsa, petiolata, lanceolato-linearia, integerrima, supra nitida.

RACEMI terminales è ramulis teneris, simplices, multiflori, erecti.

FLORES gemini, punicei.

COROLLA usque ad medium quadrifida, infernè longitudinaliter fissa, tandem in quatuor petala disjuncta: *lacinae*, sive *petala* aequalia, lineari-spathulata.

GLANDULA unica sub germine.

FOLLICULUS oblongus, longo acumine, parum compressus.

Obs. Cum corolla spontè decidit, in quatuor partes aequales dividitur, ideoque corolla tetrapetala est.

HABITAT in *Regni Chilensis* collibus et montibus altis inter *Conceptionis* urbem et *Arauci* Arcem, praesertim ad *Villagra* collem.

FLORET Septembri, et Novembri.

Obs. Anno M.DCC.LXIX. et M.DCC.LXX. quo tempore Indi Araucani adversus Hispanos rebellarunt, Hispani milites ab iisdem Indis in *Villagra* colle circumventi hujus plantae semina colligere, et placentis ex eorum farina paratis et coctis vesci ob cibarium inopiam coacti sunt.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Semen.

EMBOTHRIUM EMARGINATUM. ICON. XCV.

2. E. foliis oblongis emarginatis integerrimis.

FRUTEX biorgyalis, glaberrimus.

CAULIS erectus, ramosus.

RAMI teretes, granulosi.

FOLIA sparsa, oblonga, petiolata, emarginata integerrimaque cum brevi acumine, exsucca, coriacea, supra nitida, subtus cinerea.

PETIOLI intus trisulci.

RACEMUS terminalis, simplex, magnus, erectus, multiflorus.

FLORES gemini, *bracteola* subulatâ, deciduâ stipati.

PEDUNCULI corollâ duplò breviores.

COROLLA tubulosa, incurva, infernè longitudinaliter fissa, rosacea: *Limbus* quadripartitus; *laciniis* ovatis, concavis.

GLANDULAE nullae sub germine.

FOLLICULI sesquipalmes, ferè cylindrici, cinerei, dependentes, stylo acuminati.

SEMINA alâ longâ terminata.

HABITAT in collibus frigidis Provinciae *Tarmae*, *Huanuci*, *Panatahuarum* et *Huamalies*.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE in *Tarma* dicitur *Catas*, et *Machinparrani*, in *Huanuco* *Picahuai*.

VIRE ET USUS: Folia contusa dolores dentium sedant. Indi ad Tempia et Simulacra diebus festis decoranda florum racemis utuntur.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx cum pedunculo. 3 Pistillum auctum. 4 Semen. 5 Folliculus apertus cum seminibus.

EMBOTHRIUM DENTATUM. ICON. XCIV. Fig. b.

3. E. foliis obovatis dentatis, marginibus revolutis.

FRUTEX triorgyalis, totus glaberrimus praeter corollam et germen.

CAULIS erectus, ramosus.

RAMI teretes, granulosi.

FOLIA alterna, obovata, petiolata, supernè dentata, supra nitida, subtus albicantia, marginibus revolutis.

RACEMI axillares, multiflori.

PEDUNCULI graciles, flexuosi, quatuor-sex fasciculati.

COROLLA tetrapetala, alba, extus pubescens.

GLANDULAE tres sub germine.

GERMEN pubescens. *Stigma* peltatum.

FOLLICULI purpurascentes.

SEMINA plura.

HABITAT in nemoribus, et silvis *Regni Chilensis* ad Provinciam *Rere*, aliàs *Estancia del Rey*.

FLORET Decembri, et Januario.

VERNACULE *Piñol* vocatur.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Semina.

EMBOTHRIUM OBLIQUUM. ICON. XCVII.

4. E. foliis ovatis serratis glabris, petalis apice obliquis.

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS erectus, ramosus.

RAMI teretes.

FOLIA alterna, petiolata, ovata, coriacea, è medio ferè ad apicem serrata, glabra, saepe basi inaequali.

RACEMI axillares terminalesque.

FLORES gemini, pedicellati; *bracteolâ* unicâ, ovatâ, acutâ, concavâ, deciduâ sustentati.

PEDICELLI villosi.

COROLLA alba, tetrapetala, patens, extus hirsuta. *Petala* spathulata; apice obliquo, reflexo, acuto: *duo* remotiora; *omnia* infernè leviter cohaerentia.

GLANDULAE tres sub germine.

FOLLICULUS oblongus, obliquus, sessilis, polyspermus.

HABITAT in *Conceptionis Chile*, et *Puchacay* Provinciarum montibus, ad *Nonguen* et *Carcamo* tractus.

FLORET à Majo ad Octobrem.

VERNACULE nomen *Raral* habet.

Explic. Icon. 1 Semen.

EMBOTHRIUM MONOSPERMUM. ICON. CXVIII.

5. E. foliis ovatis serratis lanuginosis, folliculis monospermis.

ARBOR triorgyalis, frondosa.

TRUNCUS erectus, teres.

RAMI erecto-patentes, teretes, granulosi: *teneri* lanuginosi, ferruginei.

FOLIA alterna, simplicia, petiolata, ovata, subtus magis lanuginosa, ferruginea, è medio ad apicem serrata: *tenuiora* integra; *seniora* ultra medium versus basim serrata.

RACEMI axillares, simplices, bipalmes, lanuginosi, ferruginei.

FLORES gemini, breviter pedicellati; *bracteolâ* ovatâ, minimâ, deciduâ suffulti.

COROLLA: *Petala* quatuor, spathulata, revoluta, caduca, alba.

GLANDULAE quatuor sub germine.

ANTHERAE lineares.

STIGMA oblongum.

FOLLICULUS brevis, monospermus; rariùs dispermus.

HABITAT in *Peruviae* montibus frigidis prope *Panao* vicum ad *Portachuelo* declivia.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE *Pacopaco de la Sierra*.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Pistillum. 3 Semen.

EMBOTHRIUM PINNATUM. ICON. XCIX. Fig. a.

6. E. foliis simplicibus pinnatisque.

ARBOR quadriorgyalis, frondosa.

TRUNCUS erectus, cortice foetido (odore *Cestri nocturni* similissimo) fusco.

RAMI patentes, teretes, granulis adpersi: *teneri* ferruginei, lanuginosi.

FOLIA alterna, petiolata, venosissima, coriacea, supra glabra, nitida, subtus pubescentia: *juniora* simplicia et impari-pinnata; *simplicia* ovato-lanceolata, serrata, lanuginosa; *pinnata* foliolis obliquè ovatis, acutis, subrhombeis, supernè serratis, intermedio obovato-rhombeo, serrato, aliquando eroso: *seniora* simplicia, obovata oblongaque, è medio serrata.

RACEMI axillares, solitarii, erecti, simplices, subspicati, foliis duplò longiores.

FLORES gemini, breviter pedicellati.

COROLLA parva, rubra, tetrapetala.

GLANDULAE quatuor sub germine.

GERMEN tomentosum.

FOLLICULI acinaciformes, breves, acuminati, dispermi, breviter pedicellati, tomentosi.

HABITAT in *Muña* ruderatis et versuris.

FLORET Aprili, et Majo.

VERNACULE *Pacopaco*.

Explic. Icon. 1 Glandulae in receptaculo. 2 Pistillum cum glandulis receptaculo insidens. 3 Pistillum. 4 Folliculus apertus. 5 Semina.

Obs. 1. Genera *Embothrium*, et *Quadria* aliquam affinitatem quoad floris partes praeseferunt, siquidem nihil aliud discriminis intercedit praeterquam *Quadriae* petalum superius erectum, et tria petala, multo magis reflexa et approximata, quàm *Embothrii* specierum petala quatuor, quae sanè omnia lateralia sunt, et eandem directionem servant in cunctis speciebus, infernè etiam adeo invicem remota, ut corollam subirregularem aemulentur. Adde in *Quadriae* receptaculo nullas inveniri *Glandulas* secus ac in quinque *Embothrii* Speciebus: Pericarpia itidem diversa apparent.

Obs. 2. Floris *Roupalae* Generis partes, quemadmodum Aubletius Auctor eas describit, et in icone exhibet pag. 83. t. 32. cum *Emboth.* omnino conveniunt, et praeterea in ejus receptaculo *Glandulae* observantur: quare *Roupala Embothrii* Generis species nobis esse videtur, quod tutius determinari poterit, cum pericarpium, quod Aubletius haud vidit, introspectiatur.

QUADRIA. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 16.
ICON. XXXIII.

QUADRIA HETEROPHYLLA. ICON. XCIX.
Fig. b.

1. Q. foliis pinnatis bipinnatisque, racemis simplicibus, pedunculis bifloris.

NEBU subrotundo Fraxini folio. FEWILL. tom. 3. p. 46. *planch. 33.*

GUEVINA Avellana. MOL. *Comp. Hist. Chil.* p. 198.

ARBOR sexorgyalis, ramosissimus, sempervirens.

TRUNCUS erectus.

RAMI teretes, striati.

FOLIA alterna, impari-pinnata bipinnataque: *foliola* opposita, breviter petiolata, ovata cordataque, basi inaequalia, duplicato-serrata, glabra, nitida: *impari* saepe trilobo.

PETIOLI leviter striati, pubescentes.

RACEMI axillares, solitarii, simplices.

PEDICELLI biflori, pubescentes.

COROLLA alba, extus pubescens.

DRUPA parum carnosa, matura rubicundo-nigra. *Nucleus* dulcis, *Avellanae* sapore.

HABITAT copiosè in silvis, et collium radicibus *Conceptionis* Chile, *Itatae*, *Maule*, *Rere*, *Puchacay*, et *Arauco*.

FLORET Febuario, et Martio.

VERNACULE ab Indis *Nebú*, vulgò *Avellano* à reliquis incolis nominatur.

VIRE ET *USUS*: Incolae *fructus* decerpunt, atque per paucos dies sole, aëreque siccatos Peruvianis frequenter in ea loca affluentibus magno lucro vendunt. *Nuclei* jucundi sunt gratique saporis, quos etiam saccharo incrustare solent. *Lignum* ob duritiem et flexibilitatem optimum est ad asses, remos, variaque alia utensilia formanda. *Fructuum cortices* ob suam adstringentiam loco corticum Granatorum subrogari merentur. *Oleum* per expressionem ex nucleis extrahi potest.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Petala. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Drupa per medium secta. 6 Nucleus.

CISSUS. LINN. *Gen. pl.* p. 79.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* monophyllum, minimum, quadridentatum: *denticulis* obtusis, patentibus; inferum, persistens.

COR. *Petala* quatuor, ovato-oblonga, concava, deflexa.

Nectar. Discus planus, tetragonus, germen cingens, persistens.

STAM. *Filamenta* quatuor, subulata, longitudine petalorum, inter discum et corollam inserta. *Antherae* cordato-ovatae, incumbentes.

PIST. *Germen* conicum. *Stylus* subulatus, brevis. *Stigma* simplex, obtusum.

PER. *Bacca* bilocularis, bi-tetrasperma, stylo acuminata.

SEM. trigona, extrorsum convexa, umbilicata, rugosa.

CISSUS STRIATA. ICON. C. Fig. b.

1. C. foliis digitatis; foliolis oblongo-lanceolatis serratis, caule striato flexuoso, cymis coarctatis.

PLANTA frutescens.

CAULIS scandens, ramosissimus, striatus, flexuosus.

RAMI consimiles; *teneri* pubescentes.

FOLIA alterna, petiolata, digitata: *foliola* 3-4, saepius 5, oblongo-lanceolata, glabra, supernè serrata; serraturis acuminatis; *intima* minora.

PETIOLI foliis breviores, pubescentes.

STIPULAE ovatae, acutae, semiamplexicaules, obliquae.

CIRRHII oppositifolii, bifurcati, spirales.

CYMAE oppositifoliae terminalesque, dichotomae, multiflorae, foliorum longitudine.

PEDUNCULI, et *Pedicelli* pubescentes; *bracteolis* ovatis, minimis, acutis, concavis sustentati.

PETALA lutea.

BACCAE purpureo-nigrae, *Pisi* magnitudine.

HABITAT in silvis *Conceptionis* Chile.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE *Voqui* dicitur.

Obs. Voqui aut *Vochi* nomen non solum omni plantae scandenti, sed metaphoricè etiam obtrectatoribus Chilenses applicant.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Petala. 4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Bacca. 7 Semina anticè et posticè visa.

CISSUS GRANULOSA. ICON. CI. Fig. a.

2. C. caule angulato granuloso, foliis quinatis; foliolis obovatis dentatis, cymis patentibus.

PLANTA frutescens, glabra.

CAULIS scandens, ramosissimus, leviter tetragonus, granulatus.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, quinata: *foliola* obovata, supernè dentata: *intima* minora.

PETIOLI foliis duplò breviores, granulosi.

CIRRHII oppositifolii, bifurcati, spirales, granulati, striati.

CYMAE oppositifoliae terminalesque, dichotomae, patentes.

COROLLA lutea.

BACCAE nigrae, *Ciceris* magnitudine.

HABITAT in praeruptis *Huassahuassi*.

FLORET Decembri, et Januario.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Petala. 4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Bacca. 7 Semen posticè et anticè visum.

CISSUS COMPRESSICAULIS. ICON. C. Fig. a.

3. C. foliis cordatis acutè serratis, floribus umbellatis; pedunculis dichotomis.

PLANTA pubescens.

CAULIS scandens, ramosus, tetragonus, compressus, geniculatus, cum procumbit, radicans.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, cordata, obtusa acuminataque, acutè serrata, venosissima, supra nitidiuscula; *nonnulla* subtriloba.

PETIOLI teretes, contorti.

STIPULAE oppositae, lunulatae, marcescentes.

CIRRHII oppositifolii, simplices, filiformes, spirales, ad medium squamis duabus oppositis, linearibus.

PEDUNCULI oppositifolii, solitarii, petiolis longiores.

UMBELLA quadri-septemradiata.

INVOLUCRUM foliolis totidem ovatis.

PEDUNCULI inaequales, dichotomi, *bracteolis* duabus, ovatis stipati.

FLORES umbellati, ex dichotomiis solitarii, totidem *bracteolis* ovatis suffulti.

PETALA quatuor, apice concava, lutea, caduca.

BACCA subrotunda, disperma, rudimento styli acuminata, ovato-trigona, purpureo-nigra.

HABITAT in Provinciae *Chançay* ruderatis, in *Pillao* ad *Chacahuassi*, et in *Limae* versuris.

FLORET à Junio ad Octobrem.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Petala. 4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Bacca cum calyce. 7 Semina anticè et posticè visa.

CISSUS OBLIQUA. Icon. CI. Fig. b.

4. C. foliis binatis ternatisque serratis, lateralibus cordatis obliquis, intermedio ovali, floribus umbellato-corymbosis.

PLANTA scandens.

CAULIS ramosus, tetragonus, striatus.

RAMI consimiles; *teneri* pubescentes.

FOLIA alterna, longè petiolata, binata ternataque, acutè serrata, venosa, supra pilosa; *lateralia* cordata, obliqua, acuta; *intermedium* ovale, acuminatum, majus.

STIPULAE oppositae, ovatae, latiusculae, marcescentes.

PEDUNCULI oppositifolii, solitarii, foliorum ferè longitudine.

UMBELLA tri-quadriradiata, involucrata.

INVOLUCRUM foliolis totidem ovatis.

PEDICELLI inaequales, dichotomi, *bracteolis* duabus sustentati.

COROLLA lutea.

HABITAT in praeruptis *Huanuci* et *Tarmae* ad *Huariaca*, *Rondos*, *Chaulan* et *Chaucha* vicos.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Petala. 4 Stamina. 5 Pistillum.

RIVINA. LINN. Gen. pl. p. 87.

RIVINA SECUNDA. Icon. CII. Fig. a.

1. R. foliis ovatis acuminatis obsoletè denticulatis ciliatis, racemis longis, calyce bipartito bilabiato.

PLANTA suffruticosa.

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULIS bipedalis, erectus, infernè teres, glaber, superne angulatus, parum ramosus, leviter pubescens.

FOLIA alterna, petiolata, ovata oblongaque, acuminata, integerrima, utrinque glabra, margine denticulato-ciliata.

Tom. I.

PETIOLI canaliculati, purpurei, leviter pubescentes.

RACEMI axillares terminalesque, solitarii, simplices, in flore laxi, breves; in fructu erecti, longi.

FLORES initio sparsi, postea secundi.

PEDICELLI bracteolâ subulatâ, basi concavâ suffulti, ad apicem squamis ovatis, minimis, caducis.

CALYX in flore albus, in fructu viridis, irregularis, bipartitus: *laciniâ superiori* breviori, ovatâ, concavâ, integrâ: *inferiori* semitrifidâ; *laciniis* ovatis; *intermediâ* productiori, concavâ.

STAMINA: *Filamenta* quatuor, aequalia, setacea, receptaculo affixa, erecta. *Antherae* ovato-sagittatae.

GERMEN superum, lentiforme, vix pedicellatum. *Stylus* brevis, filiformis. *Stigma* simplex, acutum.

CALYX germine crescens, semen continens, patens.

SEMEN unicum, lentiforme, exsuccum, nigrum, nitidum, farinosum.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Pozuzo*, *Chacahuassi* et *Cuchero* prope fluvii portum, id est, *Embarcadero*.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Fructus in calyce. 6 Semen.

DORSTENIA. LINN. Gen. pl. p. 84.

DORSTENIA TUBICINA. Icon. CII. Fig. b.

1. D. scapis radicalibus, foliis cordato-oblongis denticulatis, receptaculis ovalibus basi subcompressis.

PLANTA acaulis, lactaria.

RADIX tuberosa, obovata, undique fibrillosa, fulvescens, odorata.

FOLIA radicalia, prostrata, petiolata, cordato-oblonga cordato-ovataque, duplicato-denticulata, venosissima, rugosa, aspera, subtus villosiuscula.

SCAPI 2-3-4, radicales, longitudine ferè petiolorum, curvati, simplicissimi: *singulus* receptaculo florum terminatus in tubae formam.

RECEPTACULUM in flore violaceum, in fructu album, parum carnosum, patens.

CALYX: *Receptaculum commune* ovale, margine denticulato-crenatum, magnum, favosum, tectum numerosis *flosculis masculis* et *femineis*, ex distinctis alveolis ortis, minimis.

Perianthium proprium nullum: nisi pro eo sumas singulum alveolum, tetragono-cubicum.

COROLLA nulla.

STAMINA: *Filamenta* duo è singulo alveolo masculo, filiformia, hyalina. *Antherae* didymae, erectae, biloculares.

PISTILLUM: *Germen* ovatum, alveolo femineo immersum, membranâ tectum. *Stylus* subulatus, exsertus. *Stigma* bifidum, longitudine staminum, acutum.

PERICARPIUM: *Receptaculum commune* semina fovens.

SEMEN unicum in singulo alveolo femineo, ovatum.

Obs. Flores omnes masculos diandros et totidem femineos

monogynos in eodem receptaculo offendimus : ideoque haec Species, et fortasse reliquae ad *Monoeciam* referendae sunt.

HABITAT in silvis *Chinchao* per *Mesapata* et *Macora* runcationes, vernaculè *Carpales* dictas.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

USUS: Radix ob fragrantiam, quam post desiccationem, spirat, loco *Dorsteniae Contrayerbae* radice adhiberi potest.

Explic. Icon. 1 Receptaculum commune floris. 2 Flosculus masculus. 3 Feminus. 4 Receptaculum fructus. 5 Semen stylo persistenti.

ISNARDIA. LINN. Gen. pl. p. 84.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* ovatum, octangulare, plicatum, ore coarctato, clauso, quadridentato: inferum, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* quatuor, filiformia, longitudine ferè calycis, cui infra medium inserta, inclusa. *Antherae* incumbentes, subrotundae, utrinque emarginatae, didymae, biloculares.

PIST. *Germen* subrotundum, obscurè tetragonum. *Stylus* brevissimus. *Stigma* capitatum, obsolete tetragonum, persistens.

PER. *Bacca* globosa, calyce obvoluta, quadrilocularis, tenui epidermide nitidâ, tandem lacerâ.

SEM. numerosa, minima, obovata, angulata. *Receptaculum* tetrapterum, vix carnosum.

ISNARDIA SUBHASTATA. ICON. LXXXVI. Fig. b.

1. I. foliis semiamplexicaulibus hastato-lanceolatis, floribus axillaribus solitariis sessilibus.

PLANTA suffruticosa, glabra, saepius purpurascens.

RADIX ramoso-fibrosa, horizontalis, fibrillis numerosis, capillaribus.

CAULIS bipedalis, erectus, tetragonus, infernè radicans, ramosus.

RAMI consimiles, brachiati, aliquando gemini, tuncque breviores, debiliores, supernè sulcati.

FOLIA opposita, sessilia, hastato-lanceolata, acuta; angulis posticis parum exsertis, obtusis, integerrima, subavenia, vix carinata.

FLORES axillares, solitarii, sessiles.

CALYX viridi-purpurascens, in fructus maturitate dilaceratus.

BACCA purpurea, ferè exsucca, in maturatione dilacerata.

HABITAT in locis stagnatis et paludosis *Chancay* Provinciae, in *Torreblanca*, *Esquibel* et *Retes* praediis.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Idem scissus cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Eadem transversim secta. 7 Receptaculum. 8 Semen auctum.

ACAENA. LINN. Gen. pl. p. 87.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* 4-5phyllum; foliolis ovatis, lineatis, concavis, patulis, aequalibus; superum, persistens.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* 2-4-5, capillaria, receptaculo inserta, calyci opposita. *Antherae* erectae, subrotundae, didymae, biloculares, post explicationem tetragono-alatae.

PIST. *Germen* obovatum, echinatum. *Stylus* filiformis, brevis. *Stigma* peltatum, dilacerato-penicilliforme.

PER. *Drupa* sicca, obovata, 3-4-5 gona, hamis 2-3-4-5 numerosis, glochidatis.

SEM. *Nux* ejusdem figurae. *Nucleus* oblongus.

Obs. In *Acaena* cylindristachyâ *Nux* rariùs bilocularis.

HABITUS.

Plantae suffruticosae, aut perennes. *Caules* plures, diffusi, aut *Scapi* erecti, teretes. *Folia* sparsa, impari-pinnata. *Petiolis* semivaginantibus. *Flores* capitati, spicati, aut laxè racemosi, *bracteis* duabus, parvis distincti.

ACAENA LAPPACEA. ICON. CIII. Fig. a.

1. A. caule erecto, foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis obovatisque serratis, racemis paucifloris.

PLANTA suffruticosa, villosa: in hortis foliola glabra promit.

RADIX ramosa, horizontalis, repens, lignosa.

CAULES plurimi, erecti, teretes, pedales, simplices, parum ramosi.

FOLIA conferta, impari-pinnata: foliola breviter petiolata, oblonga obovataque, profundè serrata; intima minora; nonnulla alterna.

PETIOLUS communis, semivaginantibus, membranaceus, basi utrinque auriculatus.

PEDUNCULI axillares, filiformes, teretes, quinque-septem flori, erecti, foliis quadruplò longiores.

FLORES laxè racemosi.

PEDICELLI bractea lanceolata, integrâ, trifidâque, solitaria suffulti; ad medium bracteolâ unâ alterâve lineari.

FRUCTUS cernui.

CALYX 4-5phyllus, viridis: foliolis ovatis, concavis, patentibus, persistentibus.

STAMINA: *Filamenta* 4-5, calyce breviora. *Antherae* subrotundae, didymae, erectae, biloculares, post explicationem tetragono-alatae.

GERMEN inferum, lappaceum. *Stylus* brevis. *Stigma* peltatum, dilacerato-penicilliforme.

DRUPA oblonga, tetragona, saepe trigona, undique lappacea, monosperma: *lappis* retrorsum glochidatis.

HABITAT in locis calidis, et praeruptis *Tarmae* oppidi ad *Curis* et in *Acobamba*, *Picoy* et *Tapu* vicis.

FLORET Junio et Julio, quibus mensibus etiam in Reg. Hort. Matritensi floridam observavimus.

Explic. Icon. 1 Flos. 2 Stamen. 3 Pistillum. 4 Drupa.
5 Eadem per medium secta. 6 Nucleus.

ACAENA ARGENTEA. ICON. CIII. *Fig. b.*

2. A. caule repente, foliis impari-pinnatis; foliolis ovato-oblongis, spicis globosis.

PROQUIN. FEWILL. *tom. 3. pag. 55. planch. 41.*

PLANTA perennis, sarmentosa, sericea, argentea.

CAULIS repens, ramosissimus, teres, tenuis, purpurascens, villosus.

RAMI consimiles, bipedales.

FOLIA alterna, petiolata, impari-pinnata: *foliola* sessilia, ovato-oblonga, basi inaequalia, serrata, utrinque lucida, supra glabra, subtus sericea, argentea; *intima* minora, aliquando alterna, foliolo uno alterove minimo interrupta.

PETIOLUS semiamplexicaulis; basi utrinque membranâ stipulaeformi, acutâ alatus.

PEDUNCULI axillares terminalesque, solitarii, foliis duplò longiores, erecti, teretes, villosi, canescentes; *foliolis* 2-3, alternis, distantibus, trifidis vestiti.

FLORES numerosi, sessiles, in capitulum globosum, *bracteis duabus* linearibus distincti.

CALYCES virides, tetraphylli, rariùs pentaphylli: *foliolis* patentibus, lineatis, exterius villosis.

STAMINA duo, saepe quatuor. *Antherae* obscuro-purpureae, erectae, didymae, subtetragonae, post deflorationem quadrangulo-alatae.

DRUPA obovata, tetragona, angulis duobus oppositis productionibus, villosa, terminata mucronibus 2-3 aut 4, totidem hamis sive glochidibus ad singulorum apicem.

HABITAT abundè in locis uliginosis et arvis *Conceptionis Chile, Itatae* et *Puchacay* Provinciarum, ad *Nipas, Yeguaracui, Collico, Chequen, Loicaca, Pelchoquin* et *Chaymavida* praedia.

FLORET à Majo ad Septembrem.

VERNACULE *Broquin*, non *Proquin* ut Fewill. scripsit.

VIRES ET USUS: Decoctum à Chilensibus praestantissimum diureticum et aperiens reputatur: hujus succo ad ulcera oris sananda utuntur. Pulvis ad ulcera exsiccanda valet. Decoctum aut infusio in lue venereâ opem fert.

Explic. Icon. 1 Flos cum duobus staminibus et bracteis. 2 Idem auctus cum quatuor. 3 Stamen. 4 Pistillum. 5 Drupa lappis duabus. 6 Eadem lappis quatuor.

ACAENA OVALIFOLIA. ICON. CIII. *Fig. c.*

3. A. caule repente, foliis impari-pinnatis: foliolis ovalibus profundè serratis lineatis, spicis globosis.

PLANTA perennis, sarmentosa, stolonifera, villosa.

RADIX fibrosa.

CAULIS valde ramosus, teres, repens.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, impari-pinnata; *foliola* ovalia, profundè

serrata, lineata, supra glabra, basi inaequalia, sessilia; nonnulla obovata; *intima* minora, subcuneiformia, triquinquefida; *terminale* petiolatum.

PETIOLI ad basim utrinque membranâ stipulaeformi alati.

PEDUNCULI axillares terminalesque, longi, teretes, foliolo uno alterove trifido.

FLORES numerosi in capitulum globosum, *bracteis* duabus linearibus, tenuissimis distincti.

CALYX viridis, tetraphyllus: *foliola* lineata; *duo interiora* exterioribus superimposita.

STAMINA: *Filamenta* duo, capillaria. *Antherae* subrotundo-tetragonae, didymae, post deflorationem quadrangulo-alatae, purpureae.

PISTILLUM: *Germen* obovatum. *Stylus* unicus. *Stigma* dilacerato-penicilliforme.

DRUPA obovata, unilocularis, monosperma, supernè tetragona, pilosa: mucronibus 2-4, divaricatis, purpureis, apice glochidibus 2-3-4.

HABITAT in *Peruviae* locis umbrosis et humidis prope *Pillao, Acobamba, Palca* et *Huassahuassi* vicos.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos cum bracteis. 2 Stamen auctum. 3 Pistillum auctum. 4 Drupa lappis duabus. 5 Eadem lappis quatuor.

ACAENA TRIFIDA. ICON. CIV. *Fig. c.*

4. A. caulibus erectis, foliis impari-pinnatis, foliolis cuneiformibus trifidis, spicis globosis.

PLANTA perennis, densè villosa, canescens.

RADIX lignosa.

CAULES plures, erecti, teretes, obsolete striati, leviter flexuosi, inaequales; *intermedius* longior, pedalis.

FOLIA alterna, impari-pinnata: *foliola* cuneiformia, trifida; nonnulla quadri-quinquefida; *infima* minora, saepe integerrima.

PETIOLI ad basim utrinque dilatati, membranacei.

FLORES terminales, et in axillis superioribus, sessiles, in capitula globosa digesti: singuli *bracteolis* linearibus distincti.

CAPITULUM terminale, magnum.

CALYX tetra-pentaphyllus, patens.

STAMINA 2 ad 5. *Antherae* obtusae, tetragonae, post explicationem quadrialatae.

STIGMA dilacerato-penicilliforme.

DRUPA obovata, monosperma, densè villosa, 4-5 gona: mucronibus totidem acutis ad angulos, retrorsum hamosis.

Obs. *Stamina* Mucronesque saepius 4, rariùs 6-7-8.

HABITAT in *Regni Chilensis* pascuis, campis et collibus *Rere, Itatae* et *Conceptionis* Provinciarum, ad *Huilquilemu, Culenco, Penco, Talcahuano, Hualpen* et *Carmeno* tractus.

FLORET Febuario, Martio et Aprili.

VULGO: *Amor seco* Incolae nuncupant, quoniam fructus transeuntium vestibis adhaerent.

Explic. Icon. 1 Flos anticè et posticè visus cum bracteis. 2 Stamina. 3 Pistillum. 4 Drupa. 5 Eadem per medium secta. 6 Nucleus. Omnia haec aucta.

ACAENA CYLINDRISTACHYA. ICON. CIV. Fig. a.

5. A. scapis prostratis, foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis argutè serratis, spicis cylindricis.

PLANTA perennis, prostrata, tomentoso-sericea.

RADIX bi-quadripartita.

SCAPI plures, teretes, incani, uni-tripalmes; foliolis 2 ad 5, remotis, simplicibus, serratis vestiti.

FOLIA radicalia, numerosa, impari-pinnata: foliola sessilia, oblonga, obtusa, argutè serrata, utrinque lineato-plicata, subtus incana, argentea; intima minora.

PETIOLI canaliculati, basi utrinque dilatati, membranacei.

SPICA cylindrica, coarctata, amentiformis, semipollicaris.

FLORES sessiles, bracteolis tribus, linearibus distincti.

CALYX tetraphyllus: foliolis oblongis, patentibus, intus purpurascens, striatis.

STAMINA: Filamenta duo, capillaria. Antherae obtusae, tetragonae, purpureae, post deflorationem tetragono-alatae.

STIGMA dilacerato-penicilliforme.

DRUPA obovata, tetragona, coronata, mucronibus quatuor, inaequalibus, apice hamosis, saepius unilocularis, rarius bilocularis.

SEMEN unicum, oblongum, rarius duo.

HABITAT in collibus frigidis Tarmae Provinciae ad Rondos vicum, et prope Chacilla.

FLORET à Decembri ad Martium.

Explic. Icon. 1 Bracteolae. 2 Flos anticè et posticè visus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Drupa. 6 Eadem transversim secta. 7 Nucleus. 8 Drupa bilocularis per medium secta. Omnia haec aucta.

ACAENA PINNATIFIDA. ICON. CIV. Fig. b.

6. A. scapis erectis, foliis impari-pinnatis: foliolis obovatis pinnatifidis, spicis longis interruptis.

PLANTA perennis, incana.

RADIX perpendicularis, lignosa.

SCAPI plures, erecti, inaequales, ferè bipedales, teretes, obsolete striati, pilosi, infernè uno alterove foliolo, superne squamis distantibus, trifidis integerrimis, subulatis.

FOLIA omnia ferè radicalia, patentia, subtus densè villosa, argentea, superne leviter pilosa, nitidiuscula, impari-pinnata: foliola opposita; nonnulla subopposita, sessilia, obovata, pinnatifida, basi inaequalia; intima minora; laciniis linearibus; terminale petiolatum.

PETIOLI basi utrinque in membranulam dilatati, pilosi.

SPICA densè villosa, composita capitulis parvis, sessilibus, alternantibus; superioribus confertis, inferioribus distantibus, bractea subulatâ, concavâ, ferrugineâ, extus villosâ suffultis.

FLORES sessiles, bracteolis duabus, linearibus distincti.

CALYCES 4-5 phylli, patentes, externè virides, internè purpurascens.

STAMINA quatuor, quinque. Antherae obtusae, tetragonae, purpureae, post explicationem quadrangulo-alatae.

STIGMA dilacerato-penicilliforme.

DRUPA monosperma, mucronibus 6-7-8, retrorsum hamosis; tribus superioribus majoribus.

HABITAT in apricis et collibus Conceptionis Chile, per Puntilla, Gavilan et Hualpen tractus.

FLORET Februario, et Martio.

VULGO Pimpinela cimarrona, et Amores secos, eo quod fructus transeuntium vestibis adhaerent.

Explic. Icon. 1 Bracteae. 2 Flos tetrandrus. 3 Idem pentandrus. 4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Drupa. 7 Eadem transversim secta. 8 Nucleus. Omnia haec aucta.

ALCHEMILLA. LINN. Gen. pl. p. 88.

ALCHEMILLA TRIPARTITA.

1. A. foliis tripartitis, laciniis cuneiformibus multifidis.

PLANTA perennis, villosa.

RADIX fibrosissima.

CAULES plurimi, pedales, diffusi, repentes, teretes, filiformes, ramosi.

FOLIA alterna, breviter petiolata, tripartita; laciniis cuneiformibus, multifidis.

PETIOLI vaginantes.

VAGINAE multifidae, stellatae.

PEDUNCULI axillares terminalesque, dichotomo-corymbosi, vaginis multifidis fulcrati.

FLORES parvi, sessiles.

CALYCES virides.

FILAMENTA duo.

PISTILLUM: Germina duo in fundo calycis inclusa. Styli duo, filiformes, longitudine staminum. Stigmata globosa, hyalina.

SEMINA duo in fundo calycis.

HABITAT in montibus frigidis et scaturiginibus Pillao et Tarmae ad Huassahuassi Arcem.

FLORET per totum ferè annum.

Obs. Tres nostrae Alchemillae Species diandrae et digynae sunt. Quosdam etiam flores gemellos et nonnullos monogynos monospermosque in tribus Speciebus observavimus.

ALCHEMILLA ORBICULATA.

2. A. foliis orbiculato-reniformibus lobatis serratis, floribus spicato-corymbosis.

PLANTA perennis, stolonifera, villosa.

RADIX fibrosa.

CAULIS ramosissimus, sarmentosus, teres, filiformis, repens.

RAMI consimiles, hirsuti: teneri rubicundi.

FOLIA radicalia, sparsa, longè petiolata, orbiculato-reni-

formia , plicata , tri-undecimlobata , inciso-serrata , supra glabra , subtus villosa , argentea , venosissima.
 PETIOLI teretes , hirsuti.
 PEDUNCULI axillares , foliis duplò longiores , subcorymbosi , dichotomi , multiflori.
 VAGINAE perfoliatae , multifidae.
 PEDICELLI breves , uniflori.
 CALYX viridis , campanulatus , octopartitus : *laciniis* ovatis , acutis , patentibus ; *alternis* minoribus : persistens.
 COROLLA nulla.
 FILAMENTA duo , filiformia , erecta , fauci calycis insidentia , brevia. *Antherae* reniformes.
 GERMINA duo , ovata , intra tubum calycis inclusa. *Styli* duo , filiformes , longitudine staminum , ad basim germinum inserti. *Stigmata* capitata , hyalina.
 PERICARPIUM : *Calyx* in fundo semina continens.
 SEMINA duo , ovata , intus plana , extus convexa.
 HABITAT in Provinciae *Panatahuarum* montibus frigidis et humidis , ad *Panao* , *Chacalla* et *Pillao* vicos.
 FLORET per totum ferè annum.

ALCHEMILLA PINNATA.

3. A. foliis pinnatis , pinnulis bi-trifidis.
 PLANTA stolonifera , pilosa.
 RADIX fibrosa.
 CAULIS ramosus , teres , sarmentosus , repens.
 RAMI consimiles.
 FOLIA *radicalia* petiolata , pinnata : *pinnis* bi-quinquefidis , cuneiformibus , sessilibus : *caulina* amplexicaulia.
 PEDUNCULI axillares , breves.
 CALYCES virides.
 STAMINA duo.
 GERMINA duo. *Styli* duo. *Stigmata* capitata.
 SEMINA duo.
 HABITAT in Provinciae *Tarmae* et *Panatahuarum* montibus altis , frigidis et humidis ad *Huassahuassi* , *Huariaca* , *Payanchacra* , *Rondos* , *Chaulan* et *Pillao* vicos.
 FLORET Septembri , et Octobri.

DIGYNIA.

CUSCUTA. LINN. *Gen. pl.* p. 90.

CUSCUTA ODORATA. ICON. CV. Fig. a.

1. C. floribus congestis sessilibus , corollis campanulatis patentibus pentandris , nectarii squamis fimbriatis.
 PLANTA parasitica , aphylla , per frutices et Medicaginem sativam se se extendens.
 CAULIS ramosissimus , volubili-scandens , filiformis , teres , repens , pallidus , lineolis nonnullis purpurascentibus maculatus , aphyllus , tenerrimus , succosus , hyalinus , hinc inde punctis exasperatus.
 RAMI consimiles , capillares , intertexti.
 SQUAMAE minimae , ovatae , solitariae , ad ramorum divisiones.

Tom. I.

FLORES ex ramorum divisionibus , in capitula congesti , sessiles , fragrantis , stipati squamis ovatis , concavis.
 CALYX albus , punctis purpureis maculatus , cyathiformis , basi carnosâ , quinquefidus : *laciniis* subrotundis , obtusis : inferus , persistens.
 COROLLA alba , campanulata , semiquinquefida , calyce duplò longior : *laciniis* ovatis , acutis , patentibus reflexis.
Nectarium squamis quinque , ovatis , per marginem fimbriatis , ad basim staminum corollae adnatis , conniventibus.
 STAMINA : *Filamenta* quinque , subulata , infra divisuras corollae inserta eâque breviora. *Antherae* erectae , ovatae , acutae , biloculares , longitudinaliter utrinque dehiscentes.
 PISTILLUM : *Germen* subrotundum. *Styli* duo , erecti , staminibus breviores. *Stigmata* capitata.
 PERICARPIUM : *Capsula* subrotunda , bilocularis , circumscissa , calyce et corollâ carnosâ obvoluta.
 SEMINA bina , orbicularia , hinc convexa , inde concava.
 HABITAT in *Limae* et *Pillao* segetibus , et versuris.
 FLORET per totum annum.
 VULGO *Cabellos de Angel*.
 Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Eadem scissa cum staminibus et nectarii squamis. 5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem aperta. 8 Semina.

CUSCUTA CORYMBOSA. ICON. CV. Fig. b.

2. C. floribus pedunculatis corymbosis , corollis ovatis quadrifidis tetrandris , nectario nullo.
 PLANTA parasitica , aphylla , succosa , hyalina , tenerrima , super frutices et Medicaginem sativam diffusa.
 CAULIS volubili-scandens , diffusus , ramosissimus , filiformis , teres , hinc inde rugosus , luteo-croceus , hyalinus , laevis.
 RAMI consimiles , capillares , intertexti.
 SQUAMAE ovatae , concavae , solitariae , ad ramorum divisiones.
 PEDUNCULI ex ramorum divisionibus.
 FLORES corymbosi.
 PEDICELLI *bracteis* ovatis , concavis , solitariis fulcrati.
 CALYX quadrifidus albus : *laciniis* oblongis , obtusis.
 COROLLA alba , ovata , calyce duplo longior : ore parvo , quadrifido.
 STAMINA : *Filamenta* quatuor , corollâ breviora. *Antherae* ovatae.
 SEMINA solitaria aut bina , hinc convexa , inde concava.
 HABITAT in *Peruviae* cultis , praesertim supra Medicaginem sativam.
 FLORET per totum annum.
 VULGO *Cabellos de Angel*.
 VIRE ET USUS : Planta in Cataplasmatibus formam redacta , et in ustionibus applicita , ardores sedat , sanitatemque restituit.
 Explic. Icon. 1 Flos. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem aperta. 8 Semina. 9 Semen auctum.

S

TETRANDRIA TETRAGYNIA.

TETRAGYNIA.

TILLAEA. LINN. *Gen. pl.* p. 93.*TILLAEA connata*. ICON. CVI. *Fig. a.*1. *T.* caule erecto, foliis connatis linearibus, carnosis, floribus tetrapetalis, axillaribus.

PLANTA annua, glabra, tenera.

RADIX fibrosa.

CAULIS palmaris, erectus, teres, glaber, ramulosus, rubicundus.

RAMULI brachiati, altero saepe breviori.

FOLIA connata, linearia, carnosa, concava, integerrima, in ramulis conferta.

PEDUNCULI axillares, uniflori, breves.

FLORES minimi, tetrapetali.

CALYX quadripartitus; *laciniis* acuminatis.HABITAT in collibus *Chancay* supra saxa inter muscos.

FLORET Junio, et Julio.

Obs. Affinis *Tillaeae perfoliatae*. LINN.*Explic. Icon.* 1 Flos semiapertus. 2 Idem apertus. 3 Stamina. 4 Pistilla. 5 Capsulae. 6 Capsula aperta. 7 Semina.RIQUEURIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil.* p. 18.*RIQUEURIA avenia*.1. *R.* foliis oblongis *aveniis*, racemis terminalibus.

FRUTEX procumbens, triorgyalis.

CAULIS ramosus.

RAMI infernè nudi.

FOLIA opposita, petiolata, oblonga, integerrima, glabra, *avenia*.

RACEMI breves, terminales.

PEDICELLI brachiati, triflori.

COROLLA lutea, carnosa.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* et *Cuchero* vicos, praesertim juxta *Cassape* et *Cassapillo* praedia.

FLORET Julio, et Augusto.

POTAMOGETON. LINN. *Gen. pl.* p. 92.*POTAMOGETON striatum*. ICON. CVI. *Fig. b.*1. *P.* foliis linearibus, striatis, caule compresso, floribus spicatis.

PLANTA fluitans.

RADIX fibrosa.

CAULIS alternatim dichotomus, compressus, striatus.

RAMI consimiles.

FOLIA vaginantia, linearia, longitudinaliter striata, obtusa, cum brevissimo acumine, alterna; nonnulla ex superioribus opposita.

VAGINA membranacea, ad basim fissilis.

PEDUNCULI axillares, longi, solitarii, pauciflori, spicati.

PETALA albo-lutescentia.

SEMINA olivacei coloris.

HABITAT in aquis vivis *Chancay*, et *Limae* Provinciarum; abunde in *Lurin* lacubus et paludibus.

FLORET Augusto, et Septembri.

CATALOGUS AUCTORUM, QUIBUS IN HOC OPERE PRAESERTIM USI SUMUS.

AUBLET (Fusée). *Hist. Plant. Guyan.*

BROWNE (Patrick). *Hist. Nat. Jamaic.*

CAVANILLES (Ant. Joseph.). *Desc. et Icon. Plantar.*
Monadelph. Dissert.

DILLENIIUS (Joann. Jacob). *Hort. Elthamensis.*

FEWILLEUS (P. Ludov.). *Journal des Observations.*

FORSTER (Joann. Reinold. et Georg.). *Characteres Ge-*
nerum Plantarum.

GMELIN (Jo. Frid.). *Systema Vegetabilium.*

JACQUIN (Nicol. Joseph.) *Collectanea.*
Flora Austriaca.

Hortus Vindobonensis.

Miscellanea Austriaca.

Observationes Botanicae.

Plantar. Americanar. Pictur.

JUSSIEU (Ant. Laur.). *Gener. Plantar.*

L'HERITIER (Carol. Ludovic.). *Stirpes novae. Fascic. 1-5.*

LINNAEUS (Carol.). *Flor. Lapponic.*
Zeylanica.

Hortus Cliffortianus.

LINN. (Filius). *Supplement. Plantar.*

LOEFLING (Petr.). *Iter hispanic.*

MILLER (Philippus). *Icones Plantar.*

MOLINA (Joann. Ignatius). *Comp. Hist. Natur. Regn.*
Chil.

MURRAY (Andreas). *Systema Vegetabilium.*

ORTEGA (Casimir. Gomez). *Decades Plantar.*

PLUKENETIUS (Leonard.). *Opera omnia Botanica.*

PLUMIER (Carolus). *Gener. Plantar. Americ.*
Plant. American. per Burman.

RHEDE (Hénricus Van). *Hortus Malabaricus.*

RUMPHIUS (Georg. Everhardus). *Herbarium Amboinense.*

SCHREBER (Jo. Christianus Dan.). *Genera Plantarum.*

SLOANE (Hans). *Histor. Natur. Jamaic.*

SMITH (Jacob. Eduardus). *Icones Plantarum. Fascic. 1-3.*

TOURNEFORT (Jos. Pitt.). *Instit. R. H.*

VANDELLI (Dominicus). *Flor. Lusitanic. et Brasil. Spe-*
cimen.



M E N D A T Y P O G R A P H I C A .

<u>Pagin.</u>	<u>lin.</u>			
3	44	concacava	<i>lege</i>	concava
4	13	stamina		stamen
8	40	suffultus		suffulti
21	39	semifida		semibifida
4	27	<i>Canguenes</i>		<i>Cauquenes</i>

INDEX

GENERUM ET SPECIERUM.

A

	Pag.	Icon.
A CAENA argentea.	67	103
cylindristachya.	68	104
lappacea.	66	103
ovalifolia.	67	103
pinnatifida.	68	104
trifida.	67	104
ACOSTA aculeata.	5	6
AEGIPHILA multiflora.	50	76
ALCHEMILLA pinnata.	69	
orbiculata.	68	
tripartita.	68	
ALLIONIA incarnata.	49	
AMOMUM racemosum.	2	1
thyrsoideum.	2	2
ANTHODON decussatum.	45	74

B

BOERHAAVIA hirsuta.	4	
scandens.	4	
BRIZA media.	48	
BUDDLEJA americana.	53	82
connata.	52	81
diffusa.	53	80
globosa.	52	83
incana.	52	80
occidentalis.	53	82
spicata.	53	81

C

C ALCEOLARIA alba.	19	27
angustiflora.	17	28
bicolor.	16	25
biflora.	16	20
bicrenata.	15	23
corymbosa.	14	20
cuneiformis.	19	27
deflexa.	18	30
dentata.	18	29
flexuosa.	17	26
glauc.	17	27
heterophylla.	16	21
inflexa.	16	25
involuta.	15	23
linearis.	19	
oblonga.	15	24

Tom. I.

CALCEOLARIA perfoliata.

	Pag.	Icon.
pinnata.	15	21
pulverulenta.	14	19
punicea.	19	
rugosa.	15	24
salicifolia.	19	28
scabra.	18	19
sessilis.	19	29
tomentosa.	18	
trifida.	15	22
tripartita.	17	26
uniflora.	14	22
verticillata.	16	20
virgata.	17	
viscosa.	20	31

CALLICARPA cordifolia.

globiflora.	17	30
-------------	----	----

CALLISIA repens.

ovata.	50	77
--------	----	----

CALYXHYMENIA expansa.

prostrata.	49	77
------------	----	----

viscosa.	45	73
----------	----	----

CANNA indica.

iridiflora.	45	75
-------------	----	----

paniculata.	46	75
-------------	----	----

CISSUS compressicaulis.

granulosa.	1	1
------------	---	---

obliqua.	64	100
----------	----	-----

striata.	64	101
----------	----	-----

COLUMELLIA oblonga.

obovata.	65	101
----------	----	-----

COMMELINA fasciculata.

gracilis.	64	100
-----------	----	-----

hispida.	64	101
----------	----	-----

nervosa.	64	100
----------	----	-----

CONDALIA lanceolata.

obovata.	28	8
----------	----	---

repens.	28	12
---------	----	----

sessilis.	44	72
-----------	----	----

COSTUS argenteus.

laevis.	44	72
---------	----	----

scaber.	43	73
---------	----	----

CUSCUTA corymbiflora.

odorata.	44	
----------	----	--

striatus.	69	105
-----------	----	-----

striatus.	69	105
-----------	----	-----

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

striatus.	47	
-----------	----	--

INDEX

	Pag.	Icon.		Pag.	Icon.
DIANTHERA ciliata.	12	14	K		
hirsuta.	11	13	KRAMERIA pentapetala.	62	94
multiflora.	10	14	triandra.	61	93
mucronata.	11	16			
repens.	10	15	M		
secundiflora.	11	15			
DORSTENIA tubicina.	65	102			
			MANETTIA acutifolia.	58	89
E			racemosa.	58	89
EMBOTHRIUM dentatum.	62	94	umbellata.	58	90
emarginatum.	62	95	MARANTA capitata.	3	5
lanceolatum.	62	96	lateralis.	4	
monospermum.	63	98	MARGYRICARPUS setosus.	28	8
obliquum.	63	97	MILIUM nigricans.	47	
pinnatum.	63	99	MOLLUGO radiata.	48	
G			N		
GALIUM ciliatum.	59		NERTERIA repens.	60	90
corymbosum.	59				
croceum.	59		O		
hirsutum.	59		OHIGGINIA aggregata.	55	83
lappaceum.	59		obovata.	56	85
mucronatum.	60		verticillata.	55	85
ovale.	59		OLDENLANDIA uniflora.	57	
GONZALAGUNIA dependens.	56	86			
GRATIOLA peruviana.	6		P		
GUNNERA scabra.	29	44			
			PALTORIA ovalis.	54	84
H			PANICUM purpureum.	48	
HEDYOTIS conferta.	57	87	PASPALUM purpureum.	47	
juniperifolia.	57	87	PEPEROMIA acuminata.	32	51
filiformis.	57	87	alata.	31	48
setosa.	57	88	concava.	31	46
thymifolia.	56	88	crystallina.	30	
HETERANTHERA reniformis.	43	71	dependens.	33	48
HIPPOCRATEA viridis.	44	74	emarginata.	33	49
			filiformis.	31	47
I			foliiflora.	30	45
JARAVA Ichu.	5	6	inaequalifolia.	30	46
JASMINUM lanceolatum.	6	7	monostachya.	33	
grandiflorum.	6		obliqua.	32	51
JOVELLANA punctata.	13	18	pilosa.	32	50
scapiflora.	13	18	pubescens.	31	
ISNARDIA subhastata.	66	86	purpurea.	32	49
JUSTICIA lineolata.	9	13	rhombea.	31	46
longistaminea.	8	10	scandens.	32	51
mucronata.	8	10	scutellaeifolia.	29	44
racemosa.	9	11	secunda.	30	45
sericea.	9	9	septemnervis.	31	47
spicata.	8	9	striata.	32	52
tenuiflora.	9	12	tetragona.	31	47
			trinervis.	32	50

75

	Pag.	Icon.		Pag.	Icon.
variegata.	33	52	SALVIA longiflora.	23	40
umbilicata.	30	45	mitis.	27	
PINGUICULA involuta.	20	31	nodosa.	25	41
PIPER.	33		oppositifolia.	26	43
acutifolium.	38	64	plumosa.	26	37
angustifolium.	38	57	procumbens.	27	39
asperifolium.	37	56	punctata.	27	39
callosum.	34	53	racemosa.	25	
carponya.	37	63	rhombifolia.	26	36
churumayu.	35	58	sagittata.	23	35
crocatum.	35	55	violacea.	26	43
curvatum.	36	54	SANCHEZIA oblonga.	7	8
dichotomum.	35	60	ovata.	7	8
excavatum.	34	54	SARMIENTA repens.	8	7
gracile.	35	59	SCABIOSA sympaganthera.	49	76
granulosum.	38	64	SCHIZANTHUS pinnatus.	13	17
heterophyllum.	34	56	SCIRPUS fragrans.	47	
lanceolatum.	36	61	SCOPARIA dulcis.	50	
lineatum.	35	60	SPERMACOCE assurgens.	60	92
longifolium.	37	61	capitata.	61	91
mite.	37	58	corymbosa.	60	91
obliquum.	37	63	gracilis.	61	92
obovatum.	36	53			
peltatum.	38	59	T		
punctatum.	36	62			
scabrum.	34	55	TILLAEA connata.	70	106
secundum.	36	62			
ungiculatum.	34	57	V		
PLANTAGO congesta.	51	79			
hirsuta.	51	78	VALERIANA coarctata.	40	68
hispidula.	51	78	connata.	39	67
sericea.	51	79	cornucopiae.	41	
POTAMOGETON striatum.	70	106	crispa.	41	
			decussata.	42	70
Q			globiflora.	43	65
QUADRIA heterophylla.	63	99	hyalinorrhiza.	41	67
			interrupta.	42	67
R			laciniata.	42	69
RIQUEURIA avenia.	70		oblongifolia.	40	65
RIVINA secunda.	65	102	officinalis.	41	
			paniculata.	41	70
S			phu.	41	
SALVIA acuminata.	24	37	pilosa.	39	66
acutifolia.	24	38	pinnatifida.	40	69
biflora.	24	38	rigida.	39	65
cuspidata.	23	40	serrata.	40	68
excisa.	25	36	spathulata.	40	68
galeata.	27	42	tenuifolia.	39	65
incurvata.	24	42	virgata.	42	66
integerrima.	26	35	VERBENA clavata.	21	33
revoluta.	28	41	corymbosa.	22	33
			cuneifolia.	22	32
			dichotoma.	23	34
			hispida.	22	34


	A		Pag.	MAIZ de Guinea.	47
				MAIZILLO.	48
A	CHIRA		I	MANCAPAQUI.	14
	cimarrona.		I	MAPATO.	61
	de monte.	2	4	MACHINPARRANI.	62
AMOR seco.			67	MOHO-MOHO.	38
AMORES secos.			68	MORADILLA.	27
ARGUENILLA.			13		
ARGUENITA.		15	19	N	
AÑASCCACHU.			27		
ARVEJILLA.			42		
AVELLANO.			64	NALCAS.	29
				NEBU.	64
	B			O	
BROQUIN.			67		
	C			OCSSA.	5
				P	
CABELLOS de Angel.			69		
CAIHUA-CAIHUA.		10	11	PACHACÇA.	18
CAIMITO de monte.			5	PACOPACO.	63
CARPUNYA.		34	37	PACOPACO de la sierra.	63
CATAS.			62	PAGNHIN.	52
CHACHAUL.			19	PALQUIN.	52
CHENCHELCOMA.			26	PANGUE.	29
CHUCUMPA.			9	PANKE.	29
CHURUMAYU.			35	PEGAJOSA.	5
CONGONA.			30	PEGAPEGA.	46
CONGONITA cimarrona.			30	PICAHUAI.	62
	E			PIMPINELA cimarrona.	68
ESCOBILLA.			51	PIÑOL.	63
	H			PROQUIN.	67
HUARITURU.			40	PUMACUCHU.	61
	I J			PURUMPIÑA.	3
ICHU.			5	PUSSCA.	12
JAZMIN.			6	Q	
	M			QUISOAR.	52 53
				QUISUAR.	52
				QUINTI.	54
				R	
				RAGUAYES.	29
MACAE.			42	RAIZ para los dientes.	61
Tom. I.				V	



Isidorus Galvez Exped. Peruv. Delin. fecit.


Franciscus Suria incidit.

a CANNA paniculata.*b* AMOMUM racemosum.



Is. Galvez del. et inc.

AMOMUM *thyrsoideum*.







I. Gálvez del.

MARANTA *capitata*.

Mich. Gamberino incid.



Isid. Galvez del.

Jos. M. Bonifaz inc.

a ACOSTA aculeata.

b JARAVA Ichu.





a SARMIENTA repens.

b JASMINUM lanceolatum.

a COLUMELLIA oblonga.

VIII.

b SANCHEZIA oblonga.



I. Gálvez del.

c SANCHEZIA ovata.

d MARGYRICARPUS setosus.

Jac. Quenl' incid.





Isid. Calderon del.

a *JUSTICIA spicata*.b *JUSTICIA sericea*.

Mich. Camborinus sc.



Joseph. Rubio del.

a JUSTICIA longistaminea.

P. Nolasc. Gascó incid.

b JUSTICIA mucronata.



J. Brancato et Fr. Pulgar del.

J. Rubio minuit.

Vinc. Enquidanes inc.

a DIANTHERA *appendiculata*.

b JUSTICIA *racemosa*.



Isid. Galvez del.

a JUSTICIA tenuiflora.

T. Lopez Enquid. inc.

b COLUMELLIA obovata.



Isid. Galvez del.

^a JUSTICIA lincolata.

^b DIANTHERA hirsuta.

Vinc. Enquidano sculpsit.



J. Rubio del.

a DIANTHERA *ciliata*.

Franc. Marti incid.

b DIANTHERA *multiflora*.





T. Gálvez del.

Vinc. Pasq. Perz. inc.

a DIANTHERA secundiflora.

b DIANTHERA repens.



Jos. Brunete et Fran. Pulgar del.

J. Salas inc.

a DIANTHERA mucronata.

b DIANTHERA acuminata.



SCHIZANTHUS *pinnatus*.





a JOVELLANA punctata.

b JOVELLANA scapiflora.





I. Galvez del.

a CALCEOLARIA *pinnata*.

Vinc. L. Enguadanos inc.

b CALCEOLARIA *salicifolia*.





a CALCEOLARIA *biflora*. *b* CALCEOLARIA *corymbosa*. *c* CALCEOLARIA *uniflora*.

Is. Galvez del. et inc.





Jos. Bruner et J. Rubio del.

a CALCEOLARIA *perfoliata*.

Narciso. Cobo inc.

b CALCEOLARIA *heterophylla*.



Isid. Galvez del.

a CALCEOLARIA tripartita.

Emman. Navarro inc.

b CALCEOLARIA tomentosa.



Isid. Galvez del.

a CALCEOLARIA involuta.

Vinc. Mariani inc.

b CALCEOLARIA bicrenata.



Fr. Pulgar del.

Isid. Galvez pinxit.

Jos. Maria Benjara inc.

a CALCEOLARIA *punicea**b* CALCEOLARIA *oblonga*



J. Rubio del.

Marian Brandt inc.

a CALCEOLARIA *inflexa*.b CALCEOLARIA *bicolor*.



Isid. Calceolaria del.

Jos. Rico incidit.

a CALCEOLARIA crenata.

b CALCEOLARIA trifida.





J. Rubio del.

Nörr. Cols. inc.

a CALCEOLARIA *alba*. *b* CALCEOLARIA *cuneiformis*. *c* CALCEOLARIA *glauca*.






I. Gálvez del.

Franc. Sarria inc.

a CALCEOLARIA *angustiflora*.*b* CALCEOLARIA *rugosa*.



Isid. Galvez del.

Guillelm. Orygon inc.

a CALCEOLARIA *scabra*.*b* CALCEOLARIA *dentata*.





Jos. Rubio del.

a CALCEOLARIA *viscosa*.

Idem Rubio inc.

b CALCEOLARIA *deflexa*.



J. Brunet, F. Pulgar et J. Rubio del.

E. Guerin fecit.

a *CALCEOLARIA virgata.*
 c *PINGUICULA involuta.*

b *UTRICULARIA unifolia.*
 d *UTRICULARIA aphylla.*





Ls. Galvez del.

Fel. Prieto inc.

a VERBENA *cuneifolia*.*b* VERBENA *virgata*.



Fr. Pulgar et Jos. Rubio del.

Pinman. Navarro inc.

a VERBENA corymbosa.

b VERBENA clavata.

c VERBENA multifida.




J. Rubio del.

J. Fonseca inc.

a VERBENA hispida.

b VERBENA dichotoma.



Fr. Pulgar et Jos. Rubio del.

a SALVIA sagittata.

b SALVIA integrifolia.

Petr. Gasco inc.



Fr. Pulgar del.

J. Rubio minute.

Vinc. Albarracin inc.

a SALVIA excisa.

b SALVIA rhombifolia.





Isid. Calvez del.

Vinc. P. Perez inc.

a *SALVIA plumosa.*

b *SALVIA acuminata.*







T. Calvez del.

a SALVIA *procumbens*.

b SALVIA *punctata*.

Jud. Calvo Replum.



Is. Galvez del.

a SALVIA longiflora.

b SALVIA cuspidata.

Franc. Ugena inc.



L. Gálvez del.

Ferdin. Selma inc.

a SALVIA *nodosa*.

b SALVIA *linearis*.




J. Brunete et F. Pulgar del.

J. Rubio minuit.

Fr. Perez inc.

a SALVIA *galeata*.

b SALVIA *incurvata*.



Fr. Pulgar del.

Is. Calvez minuit.

J. Rodriguez inc.

a SAINVIA *oppositiflora*.

b SAINVIA *violacea*.





J. Galvez del.

Fr. Suria inc.

a *GUNNERA scabra*.

b *PEPEROMIA scutellaeifolia*.



I. Galvez del.

^a PEPEROMIA secunda.

^b PEPEROMIA umbilicata.

^c PEPEROMIA soliflora.

Cyprianus Mart. incid.



L. Gálvez del.
a PEPEROMIA *inaequalifolia.* *b* PEPEROMIA *rhombica.* *c* PEPEROMIA *concava.* *Jav. Salas incid.*



J. Brunetti et Fr. Pulgar del.

J. Rubio minuit.

Joann. Rodriguez inc.

a PEPEROMIA tetragona.

b PEPEROMIA filiformis. *c* PEPEROMIA septemnervia.

1000



1000



J. Brunete del.

J. Rubio minuit

Em. Navarro inc.

a PEPEROMIA *dependens*.

b PEPEROMIA *alata*.





J. Brunetti et Fr. Pulgar del.

J. Brunetti inc.

a PEPEROMIA emarginata.

b PEPEROMIA purpurea.



Is. Galvez del.

a PEPEROMIA pilosa.

b PEPEROMIA trinervis.

Vinc. Albarraán inc.



L. Gálvez del.

J. Castro inc.

a PEPEROMIA *acuminata*.

b PEPEROMIA *scandens*.

c PEPEROMIA *obliqua*.



I. Gálvez del.

Marianus Brandi incid.

a PEPEROMIA *variegata*.

b PEPEROMIA *striata*.



L. Galvez del.

F. M. Torre inc.

a PIPER *callosum*.

b PIPER *obovatum*.



a PIPER *curvatum*.

b PIPER *excavatum*.



Is. Gálvez del.

Fr. Riberá inc.

a *PIPER crocatum*.

b *PIPER scabrum*.





Isid. Galvez del.

J. Brunetti inc.

a PIPER *heterophyllum*.

b PIPER *asperifolium*.






Franc. Pulgar et Jov. Rubio del.

a PIPER *angustifolium*.

b PIPER *unguiculatum*.

Fr. Ugena inc.





L. Gálvez del.

a PIPER *mité*.

b PIPER *churumayu*.

Jos. Castro incid.



Isid. Galvez del.

a PIPER *peltatum*.

Vinc. L. Engstrand inc.

b PIPER *gracile*.



J. Brunetti et J. Rubio del.

a PIPER *lineatum*.

b PIPER *dichotomum*.

J. Vega inc.



E. Pulgar et J. Rubio del.

a PIPER *longifolium*.

b PIPER *lanceolatum*.

V.P. Perez inc.



Isid. Galvez del.

Franc. Mollera inc.

a PIPER punctatum.

b PIPER secundum.





Isid. Galvez del.

a PIPER *obliquum*.

b PIPER *carpuuya*.

Fr. Suria inc.





Jos. Rubio del.

a PIPER *acutifolium*.

Jos. Mar. Benítez inc.

b PIPER *granulosum*.



b. Gálvez del.

V. Alvaracin inc.

a VALERIANA oblongifolia. *b* VALER. globiflora. *c* VALER. rigida. *d* VALER. tenuifolia.





J. Rubio del.

a VALERIANA pilosa.

Vinc. Enguidanos inc.

b VALERIANA virgata.





J. Rubio del.

Joann. Bequaer inc.

a VALERIANA interrupta. b VALERIANA hyalinorrhiza. c VALERIANA connata.





Is. Galvez del.

Vinc. P. Perez inc.

a VALERIANA coarctata. *b* VALERIANA spathulata. *c* VALERIANA serrata.



J. Gálvez del.

Fr. Puyf. inc.

a VALERIANA laciniata.

b VALERIANA pinnatifida.






J. Rubio del.

V. Enguidanos inc.

a VALERIANA paniculata.

b VALERIANA decussata.









Isid. Galvez del.

a *COMMELINA gracilis*

Fr. Suria inc.

b *COMMELINA fasciculata*



Franc. Pulgar et Jos. Rubio del.

a *COMMELINA hispida.*

Franc. Suria inc.

b *CALLISIA repens.*




Isid. Gálvez del.

a HIPPOCRATEA *viridis*.

b ANTHODON *decussatum*.

Cyp. Marc' inc.



L. Galvez del.

Pon. Garce inc.

^a *CALYXHYMENIA expansa*. ^b *CALYXHYMENIA ovata*. ^c *CALYXHYMENIA prostrata*.



L. Walp. del.

J. Salas int.

a SCABIOSA *sympagantha*.

b AEGIPHILA *multiflora*.



J. Bracte et Fr. Pulgar del.

J. Robio minuit.

Marc Cole inc.

a *CALLICARPA cordifolia.*

b *CALLICARPA globiflora.*





L. Galvez del.

a PLANTAGO hirsuta.

Franc. Ugena inc.

b PLANTAGO hispidula.



a *PLANTAGO congesta*.

b *PLANTAGO sericea*.



Ind. Galea: del.

a BUDDLEJA *diffusa*.

Vinc. Engstrand: inc.

b BUDDLEJA *incana*.



E. Poirar del.

J. Rube minuit.

Em. Nacarro inc.

a BUDDLEJA *spicata.*

b BUDDLEJA *connata.*



J. Brunetti, et F. Pulgar del.

J. Rubio minuit.

Faust. M. Torre inc.

a BUDDLEJA occidentalis.

b BUDDLEJA americana.





a BUDDLEJA *globosa*.

b O-HIGGINSLA *aggregata*.






I. Galvez del.

a *CONDALIA repens.*

b. *PALTORIA ovalis.*

Jos. Salas incid.



J. Brando et J. Galvez del.

Nicol. Bezancon inc.

a OHIGGINIA *verticillata*.

b OHIGGINIA *obovata*.





Isid. Galv. del.

a GONZALAGUNIA *dependens*.

b ISNARDIA *subhastata*.

Cypr. Marc. inc.





Isid. Galvez del.

a *HEDYOTIS conferta*.

b *HEDYOTIS filiformis*.

Joann. Brunetti in.

c *HEDYOTIS juniperifolia*.

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875



J. Brunete del.

J. Rubio minuit.

Vinc. Enguidanos inc.

a HEDYOTIS *thymifolia*.

b HEDYOTIS *setosa*.






Jos. Rubio del.

a MANETTIA racemosa.

b MANETTIA acutifolia.

Jos. Querol inc.






a



b





Is. Gálvez et J. Brunete del.

Fr. Perez inc.

a SPERMACOCE *corymbosa*.*b* SPERMACOCE *capitata*.






Isid. Galvez del.

J. Rodriguez inc.

a SPERMACOCE *gracilis*.

b SPERMACOCE *affurgens*.



J. Galtzer del.

Per. Gascé inc.

KRAMERIA triandra.




L. Gálvez et Jos. Rubio del.

F. Ugena inc.

a *EMBOTHRIUM dentatum.*

b *KRAMERIA pentapetala.*





EMBOTHRIUM *emarginatum*.





EMBOTHRIUM *lanceolatum*.





EMBOTHRIMUM *obliquum*.







Jos. M. Vega inc.

J. Rubio minuit.

Jos. M. Vega inc.

a *QUADRIA heterophylla*.

b *EMBOTHRIUM pinnatum*.

C.





J. Brunetti et J. Rubio del.

Marion. Liatava inc.

a *CISSUS compressicaulis.*

b *CISSUS striata.*




J. Rubio del.

Jul. Calvo Rosal inc.

a Cissus granulosa.

b Cissus obliqua.





J. Brunetti et I. Calvez del.

*a RIVINA secundata.**b DORSTENIA tubicina.*

J. M. Bonifaz inc.





Tad. Cuatrecasas del.

a ACAENA *lappacea*.*b* ACAENA *argentea*.*c* ACAENA *ovalifolia*.

Vinc. P. Perez inc.



L. Galvez del.

Nicol. Bosanzen inc.

a *ACAENA cylindristachya*.*b* *ACAENA pinnatifida*.*c* *ACAENA trifida*.




J. Brunetti et J. Rubio del.

Vinc. Albarracín inc.

a CUSCUTA odorata.

b CUSCUTA corymbosa.





J. Brunete del.

J. Rubio minuit.

V. Albarazin inc.

a *TILLAEA connata.*

b *POTAMOGETON striatum.*







64

100